

Maxalt® 10 mg tabletter

rizatriptan

0136955907

Maxalt® er et registreret varemærke, som tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Maxalt® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Maxalt® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Maxalt®
3. Sådan skal De bruge Maxalt®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ved migræne udvider blodkarrene sig i hjernen. Maxalt® trækker blodkarrene sammen, og smerten letter.

De kan bruge Maxalt® til behandling af migræneanfald. De kan **ikke** bruge Maxalt® til at forebygge migræne. Maxalt® virker også mod kvalme, opkastning og overfølsomhed over for lys og lyde ved migræne.

Lægen kan have givet Dem Maxalt® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE MAXALT®

Brug ikke Maxalt® hvis De:

- er overfølsom over for rizatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- bruger medicin mod depression (MAO-hæmmere). De må tidligst tage Maxalt® 2 uger efter ophør af behandling med MAO-hæmmere.
- har en meget dårligt fungerende nyre eller lever.
- tidligere har haft hjerneblødning/blodprop i hjernen eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen.
- har moderat til svært forhøjet blodtryk eller ubehandlet let forhøjet blodtryk.
- har forkalkning af hjertets kranspulsårer, har anfald af bryst smerter (angina pectoris) i hvile eller ved anstrengelse.
- har haft karsygdom i arme eller ben.
- bruger anden migræne medicin (f.eks. triptaner, ergotamin eller methysergid).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Maxalt®

Fortæl lægen om Deres symptomer. Lægen vil fastslå, om De har migræne. De må ikke bruge Maxalt® til at behandle hovedpine, der kan være forårsaget af andre, evt. mere alvorlige lidelser.

Tal med lægen, inden De bruger Maxalt®, hvis De:

- ikke tidligere har fået stillet en migrænediagnose, eller Deres anfald af migræne er anderledes, end det plejer.
- har fået at vide, at De har en særlig form for migræne (med lammelser eller andre alvorlige symptomer).
- har øget risiko for hjertesygdomme, f.eks. hvis De har forhøjet blodtryk, sukkersyge, er ryger eller bruger medicin til rygeafvænnning, er en mand over 40 år, en kvinde efter overgangsalderen, eller har hjertelidelser i familien.

Maxalt® kan give forbigående symptomer, f.eks. trykken og smerter for brystet. Smerterne kan være kraftige og trække op i halsen (se afsnittet "Bivirkninger"). De bør kontakte Deres læge for at få undersøgt, om De har en sygdom i hjertets kranspulsårer.

Hvis De får hævelser af ansigt, læber og tunge skal De straks kontakte læge eller skadestue.

Hvis De har et langvarigt forbrug af smertestillende medicin mod hovedpine, kan dette resultere i kronisk hovedpine. Kontakt lægen hvis De har mistanke herom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Dette gælder især, hvis De bruger:

- medicin mod forhøjet blodtryk (propranolol). Der bør gå mindst 2 timer mellem De tager propranolol og Maxalt®.
- naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).
- visse typer medicin mod depression (MAO-hæmmere, SSRI/SNRI-midler).
- anden medicin mod migræne (triptaner, ergotamin eller lignende medicin inkl. methysergid). De bør vente mindst 6 timer efter brug af Maxalt® før De tager migrænemedicin af ergotamintypen (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin eller methysergid). Omvendt bør der gå mindst 24 timer efter De har indtaget ergotaminin-holdig medicin, før De igen må bruge Maxalt®.

Hvis De bruger Maxalt® sammen med medicin mod depression (SSRI/SNRI-midler) eller anden migrænemedicin (triptaner) kan De risikere at få et såkaldt serotonin syndrom. Det viser sig ved feber, muskelstivhed, hurtig vejtrækning, svedtendens, forvirring og uro. Det kan udvikle sig livstruende.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Maxalt®, og Maxalt® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Maxalt® sammen med mad og drikke

Virkningen af Maxalt® kan muligvis forsinkes, hvis De tager Maxalt® sammen med mad eller på fuld mave.

Synk tabletterne hele med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Maxalt® efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis De ammer, må De kun bruge Maxalt® efter aftale med lægen.

Hvis De har taget Maxalt®, må De ikke amme i 24 timer efter indtagelsen. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migræne i sig selv eller behandling med Maxalt® kan give søvnighed og svimmelhed. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Maxalt®

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, inden De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE MAXALT®

Brug altid Maxalt® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge Maxalt® 10 mg tabletter til alle de anførte doseringer eller anvendelsesområder.

De må ikke bruge Maxalt® til forebyggelse af migræne. Tag Maxalt®, når De har et anfald.

Overdreven brug af migrænemedler kan medføre kronisk, daglig hovedpine eller forværring af eksisterende hovedpine. Følg lægens anvisninger.

Den sædvanlige dosis er

Voksne fra 18 år: 1 tablet (10 mg).

Hvis migrænen vender tilbage inden for 1 døgn, kan De tage 1 tablet til – dog tidligst 2 timer efter første tablet. De bør ikke tage mere end 2 tabletter Maxalt® i døgnet.

Ved manglende effekt: Hvis 1. dosis ikke virkede på startanfaldet bør De **ikke** forsøge med en dosis mere.

Hvis De er i behandling med propranolol, er det nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Børn og unge op til 17 år: De må kun bruge Maxalt® til denne aldersgruppe efter lægens anvisning.

Ældre: Sikkerhed og effekt hos personer over 65 år er ikke undersøgt. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Maxalt® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere af Maxalt® end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: Besvimelse, langsom puls, opkastning, svimmelhed, besvær med at holde på vandet, eventuelt forhøjet blodtryk, hjertestop.

4. BIVIRKNINGER

Maxalt® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Åndenød, angst, brystmerter med udstråling til hals eller arme pga. hjertestop. Ring 112.
- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning/blodprop i hjernen. Ring 112.
- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hævelse i ansigtet, hævet tunge, hævelse i svælget), det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Feber, muskelstivhed, hurtig vejrtrækning, svedtendens, forvirring og uro (serotonin-syndrom). Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Hjerteranken, hurtig puls, kan være eller blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød. Kan blive alvorligt. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis De får vejrtrækningsproblemer. Ring evt. 112.
- Hedeture.
- Ubehag i svælget.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Hovedpine, nedsat følesans, nedsat opmærksomhed, rysten.
- Svimmelhed, kraftesløshed/træthed.
- Kvalme, tør mund, opkastning, diaré, rødmen, svedtendens.
- Tyngdefornemmelse, smerter i mave eller bryst.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- Usikre bevægelser
- Desorientering, søvnløshed, nervøsitet, sløret syn.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget for højt blodtryk er alvorligt.
- Tørst, fordøjelsesbesvær med mavesmerter, sure opstød og halsbrand.
- Kløe, nældefeber.
- Tyngde og trykken overalt i kroppen.
- Nakkestivhed, stivhed og muskelsvaghed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Smagsforstyrrelser/dårlig smag i munden.
- Hvæsende vejrtrækning.
- Udslæt.
- Ansigtssmerter.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Overfølsomhedsreaktioner.
- Utilstrækkelig iltforsyning af væv.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Maxalt® skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Maxalt® ved over 30°C.
- Brug ikke Maxalt® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Maxalt® 10 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Rizatriptan 10 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat 60,5 mg, mikrokrySTALLinsk cellulose, prægelatineret majsstivelse, magnesiumstearat og rød jernoxid (E 172).

Maxalt®s udseende og pakningsstørrelser:

Maxalt® 10 mg tabletter er en aflang rosa tablet der er mærket MAXALT® på den ene side og MSD 267 på den anden side.

Maxalt® 10 mg tabletter findes i pakningsstørrelserne 6 stk. og 12 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2009