



**Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.**

De kan få Idotyl uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Idotyl.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De ikke inden 7 dage får det bedre, eller De får det værre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen**

1. Idotyls virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Idotyl
3. Sådan skal De tage Idotyl
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Idotyl
6. Yderligere oplysninger

**1. IDOTYLS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL**

Idotyl er et middel mod smerter.

Idotyl dæmper betændelseslignende symptomer fra muskler, led eller bindevæv. De kan tage Idotyl

- Mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruations-smerter og tandpine.
- Mod gigtsygdomme.

Lægen kan have givet Dem Idotyl til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

**2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE IDOTYL**

**Tal ikke Idotyl hvis De:**

- er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende lægemidler mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- har blødende mavesår (blodige opkastninger og/eller sort afføring).
- har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader.
- har meget dårligt hjerte.
- har dårlig lever.
- har dårlige nyrer.
- er gravid i 7. - 9. måned.

Børn under 15 år med feber må ikke få Idotyl.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Idotyl**

Tal med lægen inden De tager Idotyl, hvis De:

- har astma eller allergiske lidelser.
- har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks. mavesår.
- har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- tager anden medicin mod smerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol).
- skal vaccineres mod skoldkopper.

**BØRN ELLER UNGE  
I HJEMMET?**

Læs advarslen og vær omhyggelig med, hvordan du opbevarer denne medicin.

**Vær opmærksom på følgende:  
Advarsel**

Hvis De tager en større dosis, end der er angivet i denne information eller lægen har angivet, kan De få en livsfarlig forgiftning. Hvis De mener, De har taget for mange Idotyl, skal De straks søge læge.

Hvis De er over 65 år, skal De undgå langvarig

brug af Idotyl på grund af risiko for blødning i mave eller tarm. Tal med lægen.

De må ikke tage Idotyl i dagene før en operation. Tal med lægen.

Hvis De tager Idotyl mod hovedpine i længere tid, kan Deres hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt Deres læge, hvis De får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Idotyl. Det kan have betydning for resultaterne.

**Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med Deres læge, hvis De bruger medicin mod

- for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
- sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
- for højt blodtryk (enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og diltiazem).
- dårligt hjerte (quinidin, metoprolol, atenolol og propranolol).
- smerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- urinsur gigt (probenecid).
- visse former for gigt og kræft (methotrexat).
- grøn stær (acetazolamid).
- epilepsi (valproat og acetazolamid).
- gigt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).

Samt

- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og clopidogrel).
- vandrivende medicin (furosemid, spironolacton).
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo Biloba.
- hvis De skal vaccineres mod skoldkopper.

**Brug af Idotyl sammen med mad og drikke**

De kan tage Idotyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

**Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

**Graviditet:**

De må ikke tage Idotyl i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

De må kun tage Idotyl i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

**Kvinder der ønsker at blive gravide:**

Hvis De ønsker at blive gravid, skal De enten holde op med at tage Idotyl eller kun tage Idotyl i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Idotyl kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling.

**Amning**

Idotyl går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade Deres barn. Tal med lægen, hvis De har spørgsmål.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Idotyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Idotyl**

Denne medicin indeholder 15 mmol natrium (355 mg) pr. tablet. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal De tage hensyn hertil.



### 3. SÅDAN SKAL DE TAGE IDOTYL

Hvis Deres læge har ordineret Idotyl til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. De skal opløse brusetabletterne i et glas vand, - så får De en klar opløsning med neutral smag.

#### Den sædvanlige dosis er

##### Smerter

Voksne: 1 - 2 tabletter på 500 mg højst 4 gange daglig.

Børn over 2 år: Dosis afhænger af barnets vægt.

Børn må få 50 mg/kg i døgnet fordelt på 2 - 3 doser.

Børn må højst få Idotyl i 2 døgn.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 1 tablet på 500 mg 3 gange i døgnet i højst 2 døgn.

##### Gigtsygdomme

Voksne: 6 - 8 tabletter på 500 mg (3000 - 4000 mg) fordelt på 2 - 3 doser.

Børn over 2 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Børn må få 50 - 100 mg/kg i døgnet.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 3 - 6 tabletter på 500 mg (1500 - 3000 mg) i døgnet.

De må kun bruge Idotyl til børn under 2 år efter lægens anvisning. Børn under 15 år med feber må ikke få Idotyl.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

#### Hvis De har taget for mange Idotyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Idotyl, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være svimmelhed, susen for ørerne, døvhed, lavt blodtryk, svedudbrud, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, feber, rastløshed, forstyrrelse af kroppens syre-base balance (påvirket vejrtrækning, lavt blodtryk, kvalme, opkastning). Svær forgiftning kan medføre koma, kollaps, svigtende vejrtrækning og eventuelt nyresvigt.

#### Hvis De har glemt at tage Idotyl

De må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

#### Hvis De holder op med at tage Idotyl

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.

### 4. BIVIRKNINGER

Idotyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodmangel med træthed og bleghed på grund af blødning fra mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue.

**Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.
- Feber, træthed, sløvhed pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.

**Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.

- Leverbetændelse med gulsot og hudkløe. Kontakt straks læge.
- Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

**Meget almindelige bivirkninger** (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Blodet er længere tid om at størkne.
- Mavesmerter, halsbrand, sure opstød.

**Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kvalme, irritation, smerter eller ubehag fra den øvre del af maven. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
- Tendens til blødninger fra hud og slimhinder.
- Hovedpine, søvnløshed.
- Opkastning, forstoppelse, diaré, nældefeber.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Svimmelhed, sløvhed.
- Susen for ørerne (tinnitus), astma.
- Udslæt, svedtendens.
- Snue, træthed.

**Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Idotyl kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet. Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker oplysninger om disse bivirkninger. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk).

### 5. SÅDAN OPBEVARER DE IDOTYL

Opbevar Idotyl utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Idotyl ved almindelig temperatur. Brug ikke Idotyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke hælde medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

### 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Idotyl 500 mg, brusetabletter indeholder**

Aktivt stof: acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumhydrogencarbonat, kaliumbenzoat, povidon.

#### Udseende og pakningsstørrelser

##### Udseende

Idotyl er en plan, hvid brusetablet med dele-kærv på den ene side.

##### Pakningsstørrelser

1 x 20 og 4 x 20 brusetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ferrosan A/S

Sydmarken 5

2860 Søborg.

Tel.: 39 69 21 11 - fax.: 39 56 50 26

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2007.

**Ferrosan**



= Pantone 485



= Black

**Size:** 135 x 300 mm

**Quality:** 50 g/m2 Luminicens

**Old Articiel No.:**  
4538285