

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glucosamin Ferrosan 400 mg filmovertrukne tabletter

Glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

De kan få Glucosamin Ferrosan uden recept. Tag altid Glucosamin Ferrosan nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet Dem.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre i løbet af 30 dage.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Glucosamin Ferrosan
3. Sådan skal De tage Glucosamin Ferrosan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Glucosamin Ferrosan anvendes til behandling af slidgigt hos voksne over 18 år.

Glucosamin Ferrosan lindrer symptomerne og forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt.

Kontakt lægen hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre i løbet af 30 dage.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE GLUCOSAMIN FERROSAN

Tag ikke Glucosamin Ferrosan

- hvis De er allergisk over for glucosaminsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
- hvis De er overfølsom over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.
- hvis De er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet inden behandling med Glucosamin Ferrosan for at udelukke ledsygdomme, der kræver anden behandling.
- De bør være opmærksom på, at der er forekommet forhøjet kolesterolindhold hos få patienter, der er i behandling med glucosamin.
- Hvis De har diabetes, bør De kontakte lægen, før behandling med Glucosamin Ferrosan. Det kan være nødvendigt at kontrollere Deres blodsukker-niveau i begyndelsen af behandlingen.
- De bør være forsigtig med at tage glucosamin sammen med andre lægemidler, da det ikke kan udelukkes, at virkningen af enten Glucosamin Ferrosan eller det andet lægemiddel påvirkes.
- Glucosamin Ferrosan bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Glucosamin Ferrosan

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Børn og unge

Glucosamin Ferrosan bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år

Brug af anden medicin sammen med Glucosamin Ferrosan

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, hvis De tager:

- blodfortyndende medicin (warfarin eller acenocoumarol). De bør følges nøje af lægen.

Brug af Glucosamin Ferrosan sammen med mad og drikke

Glucosamin Ferrosan tabletter kan tages sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonale til råds, før De tager Glucosamin Ferrosan. De må kun tage Glucosamin Ferrosan efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucosamin Ferrosan forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE GLUCOSAMIN FERROSAN

Tag altid Glucosamin Ferrosan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre

3 tabletter dagligt svarende til 1200 mg glucosamin. De kan enten tage 1 tablet 3 gange dagligt eller 3 tabletter 1 gang dagligt.

Symptomlindring ses sædvanligvis inden for 4 uger efter behandlingens start.

Børn og unge

Glucosamin Ferrosan bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se pkt. 2).

Hvis De har taget for mange Glucosamin Ferrosan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Glucosamin Ferrosan tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at tage Glucosamin Ferrosan

Hvis De har glemt at tage tabletterne, skal De tage dem, så snart De kommer i tanke om det og fortsætte behandlingen som før.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. BIVIRKNINGER

Glucosamin Ferrosan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarre, forstoppelse, kvalme, hovedpine og døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Udslæt, kløe og rødmen af huden.

Inberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Glucosamin Ferrosan utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Glucosamin Ferrosan ved over 30°C.

Opbevar Glucosamin Ferrosan i original emballage, da lægemidlet er følsomt over for fugt.

Brug ikke Glucosamin Ferrosan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glucosamin Ferrosan tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Glucosamin
1 tablet indeholder 640 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid svarende til 509 mg glucosaminsulfat svarende til 400 mg glucosamin.
- Øvrige indholdsstoffer: Prægelatineret majsstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, titandioxid (E 171), jernoxid, gult (E 172), hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyethylenglycol.

Udseende og pakningstørrelser

Glucosamin Ferrosan er en aflang, råhvid, filmovertrukket tablet.

Glucosamin Ferrosan fås i tabletbeholder med 90, 270, 360, 540, 2 x 270, 1000 eller 2 x 540 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ferrosan A/S
Sydmarken 5
2860 Søborg

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2013.