

Multikett size:
90 x 180 mm

G	L	U	C	O	S	A	M	I	N
●● ●● ○○	●○ ●● ○○	●○ ○○ ●●	●● ○○ ○○	●○ ○○ ○○	○● ●● ○○	●○ ○○ ○○	●● ○○ ●○	○● ○○ ○○	●● ○○ ○○
L	E	D	F	L	E	X			
●○ ●○ ●○	●○ ○○ ○○	●● ○○ ○○	●● ○○ ○○	●○ ○○ ●○	●○ ○○ ○○	●● ○○ ●●			



Standard Material Specifikation:
4536437 - Ref. No.: 8

Old Articel No.:
4536384

-  = Pantone 201
-  = Black
-  = Pantone 877
-  = Braille

435 mm

13 mm

Hvis De har glemt at tage Glucosamin Ledflex

Hvis De har glemt at tage tabletterne, skal De tage dem, så snart De kommer i tanke om det og fortsætte behandlingen som før. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4.BIVIRKNINGER

Glucosamin Ledflex kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarre, forstoppelse, kvalme, hovedpine og døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Udslæt, kløe og rødmen af huden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.SÅDAN OPBEVARER DE GLUCOSAMIN LEDFLEX

Opbevar Glucosamin Ledflex utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Glucosamin Ledflex ved over 30°C. Opbevar Glucosamin Ledflex i original emballage, da lægemidlet er følsomt over for fugt. Anvend ikke Glucosamin Ledflex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6.YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glucosamin Ledflex tabletter indeholder:

- Aktivt stof: glucosamin. 1 tablet indeholder 640 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid svarende til 509 mg glucosamin-sulfat svarende til 400 mg glucosamin.
- Øvrige indholdsstoffer: Prægelatineret majsstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose, crospovidon, stearinsyre, titandioxid (E 171), jernoxid, gult (E 172), hydroxypropymethyl-cellulose (E464), polyethylenglycol.

Glucosamin Ledflex's udseende og pakningstørrelse

Glucosamin Ledflex er en aflang, råhvid, filmovertrukket tablet. Glucosamin Ledflex fås i tabletbeholder med 90, 270, 360, 540, 2 x 270, 1000 eller 2 x 540 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markeds-ført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Ledflex ApS
Kongevejen 66
3480 Fredensborg

Fremstiller og dansk repræsentant

Ferrosan A/S
Sydmarken 5
2860 Søborg

Denne indlægsseddel blev senest opdateret februar 2008.



Abnes her

5

139 mm

6

140 mm

Front

143 mm

422 mm

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Glucosamin Ledflex uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Glucosamin Ledflex.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre inden 30 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Glucosamin Ledflex's virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Glucosamin Ledflex
3. Sådan skal De tage Glucosamin Ledflex
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Glucosamin Ledflex
6. Yderligere oplysninger

1. GLUCOSAMIN LEDFLEX'S VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Glucosamin Ledflex anvendes til behandling af slidgigt. Glucosamin Ledflex lindrer symptomerne og forbedrer bevægeligheden i de angrebne led hos patienter med let til moderat slidgigt.

2.DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE GLUCOSAMIN LEDFLEX

Tag ikke Glucosamin Ledflex

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for glucosaminsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De er overfølsom over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.
- hvis De er gravid eller ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Glucosamin Ledflex

- Inden behandling med Glucosamin Ledflex bør De kontakte Deres læge for at udelukke ledsygdomme, der kræver anden behandling.
- De bør være opmærksom på, at der er forekommet forhøjet kolesterolinhold i blodet hos få patienter, der er i behandling med glucosamin.
- Hvis De har diabetes, bør De kontakte lægen, før behandling med Glucosamin Ledflex. Det kan være nødvendigt at kontrollere Deres blodsukker-niveau i begyndelsen af behandlingen.
- De bør være forsigtig med at tage glucosamin sammen med andre lægemidler, da det ikke kan udelukkes, at virkningen af enten Glucosamin Ledflex eller det andet lægemiddel påvirkes.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, hvis De tager:

- blodfortyndende medicin (warfarin eller acenocoumarol). De bør følges nøje af lægen.

Brug af Glucosamin Ledflex sammen med mad og drikke

Glucosamin Ledflex tabletter kan tages sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

De må kun tage Glucosamin Ledflex efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucosamin Ledflex forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Glucosamin Ledflex

Dette lægemiddel indeholder lactose.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.SÅDAN SKAL DE TAGE GLUCOSAMIN LEDFLEX

Tag altid Glucosamin Ledflex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og ældre: 3 tabletter dagligt svarende til 1200 mg glucosamin. De kan enten tage 1 tablet 3 gange dagligt eller 3 tabletter 1 gang dagligt. Symptomlindring ses sædvanligvis inden for 4 uger efter behandlingens start.

Børn: De må kun bruge Glucosamin Ledflex til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis De har taget for mange Glucosamin Ledflex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Glucosamin Ledflex tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.