

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Multi-tabs® ACD-dråber, 300 mikrogram / 35 mg / 10 mikrogram, orale dråber, emulsion

Vitamin A / Vitamin C / Vitamin D3

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Multi-tabs® ACD-dråber er et stærk vitaminpræparat. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Multi-tabs® ACD-dråber.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis du registrerer bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her, eller hvis barnet får det værre

Den nyeste indlægsseddel for dette stærke vitaminpræparat kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at give Multi-tabs® ACD-dråber
3. Sådan skal du give Multi-tabs® ACD-dråber
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Multi-tabs® ACD-dråber er et stærkt vitaminpræparat til brug ved forebyggelse og behandling af ACD-vitaminmangel.

Hvis din læge har sagt, at du skal give Multi-tabs® ACD-dråber til dit barn for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT GIVE MULTI-TABS® ACD-DRÅBER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Multi-tabs® ACD-dråber

- hvis dit barn er overfølsom (allergisk) over for vitamin A, vitamin C og/eller vitamin D3 eller et af de øvrige indholdsstoffer i Multi-tabs® ACD-dråber (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Multi-tabs® ACD-dråber.

Vær ekstra forsigtig med at give Multi-tabs® ACD-dråber

Korrekt dosering er vigtig.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder alkohol. Hvis dit barn er i behandling med metronidazol (mod betændelse), må du ikke give Multi-tabs® ACD-dråber uden først at tale med lægen eller apoteket.

Multi-tabs® ACD-dråber må ikke anvendes sammen med andre vitamin D præparater, med mindre lægen har anbefalet det.

Brug af Multi-tabs® ACD-dråber sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Multi-tabs® ACD-dråber sammen med mad. Du kan give Multi-tabs® ACD-dråber i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Produktet er til børn.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Multi-tabs® ACD-dråber.

Graviditet

Multi-tabs® ACD-dråber kan anvendes af gravide.

Amning

Multi-tabs® ACD-dråber kan anvendes i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Multi-tabs® ACD-dråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder saccharose, ricinusolie og alkohol

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie. Kan give mavebesvær og diarré.

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder sacharrose. Kontakt lægen før du giver denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at dit barn ikke tåler visse sukkerarter.

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis. Hvis dit barn er i behandling med metronidazol (mod betændelse), må du ikke give Multi-tabs® ACD-dråber uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. SÅDAN SKAL DU GIVE MULTI-TABS® ACD-DRÅBER

Hvis din læge har sagt, at du skal give en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er:

For tidligt fødte børn i alderen 1 uge til 3 måneder: 1 ml = 1 pipette dagligt.

Til oral anvendelse.

Giv 1 pipette dagligt. Dråberne kan gives med en ske eller blandes i barnets mad. Af hygiejniske årsager bør man ikke stikke pipetten direkte i barnets mund. Dråberne bør ikke opblandes i anden medicin. Den daglige dosis bør ikke overskrides, med mindre lægen anbefaler det.

Hvis du har givet for mange Multi-tabs® ACD-dråber

Kontakt læge, skadestue eller apoteket, hvis du har givet flere Multi-tabs® ACD-dråber, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag emballagen med.

Der er enkelte rapporter om forhøjet kalkindhold i blodet (hypercalcæmi) ved overdosering hos børn.

Hvis du har glemt at give Multi-tabs® ACD-dråber

Giv aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at give en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Multi-tabs® ACD-dråber utilgængeligt for børn.

Før åbning: Du kan opbevare Multi-tabs® ACD-dråber ved almindelig temperatur.

Efter åbning: Opbevar Multi-tabs® ACD- dråber i køleskab (2°C-8°C). Bør anvendes inden 2 måneder.

Brug ikke Multi-tabs® ACD-dråber efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Multi-tabs® ACD-dråber indeholder:

- Aktive stoffer: Vitamin A (som retinol palmitat), Vitamin C (som askorbinsyre) og Vitamin D3 (som cholecalciferol)
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, polyoxylet hydrogenet ricinusolie, natriumhydrogencarbonat, natriumhydroxid (eller koncentreret saltsyre), citronsyremonohydrat, α -tocopherol, ethanol 96 %, rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Multi-tabs® ACD-dråber er en klar, gullig til brunlig væske.

Pakningsstørrelse

30 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ferrosan A/S

Sydmarken 5

2860 Søborg

Tlf: 39 69 21 11 - Fax.: 3969 6518

E-mail: info@ferrosan.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2012.