



Aeropax® 10 mg/ml oral emulsion

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

I denne information er der oplysning om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Aeropax®
3. Sådan skal du tage Aeropax®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Aeropax® er et hvidt, skumdæmpende middel. Aeropax® virker ved at hindre skumdannelse i maven og tarmene.

Du kan tage Aeropax® ved:

- for meget luft i maven og tarmene
- røntgenundersøgelse af maven og tarmen
- gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesæk og tolvfingertarm)
- spædbarnskolik, kun efter lægens anvisning

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER AEROPAX®

Tag ikke Aeropax® hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof dimeticon eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Aeropax®.

Særlige forholdsregler

Du må kun bruge Aeropax® til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Du bør ikke tage Aeropax® sammen med afføringsmidler, der indeholder mineralolie (paraffin), da en blanding af disse vil reducere virkningen.

Brug af Aeropax® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Aeropax® sammen med mad og drikke.

Ved spædbarnskolik, skal du give Aeropax® et kvarter før et måltid.

Vigtig information om de øvrige indholdsstoffer i Aeropax®

Aeropax® indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Aeropax® under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Aeropax®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aeropax® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE AEROPAX®

Dosering

Mod for meget luft i maven og tarmene:

Voksne: 80-120 mg (8-12 ml) 3-4 gange dagligt.

Før røntgen- og kikkertundersøgelse:

Spørg eventuelt lægen eller sygeplejersken inden undersøgelsen

Røntgenundersøgelse af tarmen:

40 mg (4 ml) 4 gange dagligt dagen før undersøgelsen og 40 mg (4 ml) på selve undersøgelsesdagen blandet i en udrensende opløsning samt 160-200 mg (16-20 ml) blandet i bariumkontrastmiddel.



Gastroskopi:

80-160 mg (8-18 ml) fortyndes med vand til 100 ml (1 dl) 15 minutter før undersøgelse.

Røntgenundersøgelse af mavesækken:

80 mg (8 ml) blandet i bariumkontrastmiddel.

Børn:

Du må kun bruge Aeropax® til børn under 15 år efter lægens anvisning

Mod spædbarnskolik: 40 mg (4 ml) et kvarter før måltid.

Du skal omryste Aeropax® omhyggeligt før brug.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Har du taget for meget Aeropax®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aeropax®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Aeropax®?

Fortsæt behandlingen, når det er tid for næste dosis. Du skal ikke tage dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Aeropax® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Åndedrætsbesvær og hævelser (ødem) i ansigt eller tunge. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hududslæt og kløe.

Hyppigheden er ukendt: Kvalme og forstoppelse.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Fortæl læge eller apotek, hvis bivirkningerne bliver ved og er generende. Bivirkningerne kan også indberettes direkte til Lægemiddelstyrelsen. Læs mere under bivirkninger på hjemmesiden: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Aeropax® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Aeropax® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Aeropax® 10 mg/ml oral emulsion indeholder:

Det aktive indholdsstof i Aeropax® er dimeticon.

De øvrige indholdsstoffer i Aeropax® er:

Glycerolmonostearat 40-50; macrogolstearat 2000; sorbinsyre (E 200); pebermynteolie; cellulose, mikrokrySTALLinsk; methylcellulose; carmellosenatrium; vand, rensat.

Aeropax 10 mg/ml oral emulsion fås i en 300 ml flaske.

Sødemidler: Sorbitol, flydende (E420); saccharinnatrium.

Markedsføring i Danmark:

Orion Corporation
Orionintie 1
Espoo
Finland

Repræsentant i Danmark:

Orion Pharma A/S
Møllevej 9
DK-2990 Nivå
Tlf. 4912 6600
opdk@orionpharma.com

Revideret april 2006



112309-7 - JAAKKOO-TAARA OY



	JAAKKOO-TAARA OY	☐	APPROVED WITH CHANGES	☐	NEW PROOF
COLORS OF THE PROOF					
138533					
112309-7		☐	APPROVED FOR PRINTING		
30.05.2006					
DOTSIZE 8					
SIZE 150 x 240 mm					
	Black		PMS 2935	____ / ____ 200 _	
	DIE CUT	COLORS ARE REFERENTIAL			

