

Der kan opstå astma og betændelse i næseslimhinden efter indånding. Dampene må ikke indåndes. Præparatet skal påføres i fri luft eller på et sted med tilstrækkelig ventilation. Præparatet kan være giftigt ved indtagelse. Kontakt med det behandlede område skal undgås, og børn må ikke lege med behandlede kæledyr, før påføringsstedet er tørt. Undlad at spise, drikke eller ryge under administrationen. Der kan i sjældne tilfælde opstå overfølsomhed (allergi) over for thiamphenicol. Personer med kendt overfølsomhed over for thiamphenicol skal undgå kontakt med præparatet. Vask hænderne efter brugen. Præparatet leveres i en trykbeholder, og det er ekstremt brændbart. Der må ikke sprøjtes på eller i nærheden af åben ild eller andre antændelige materialer. Præparatet skal anvendes væk fra ild og antændelsesklider, gnister, varme og elektriske apparater. **Brug under drægtighed eller diegivning:** Anvendelsen af produktet under drægtighed og laktation er ikke blevet vurderet. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Ingen kendte. **Overdosis:** Ingen kendte. **Uforligneligheder:** Ingen kendte. **Særlige opbevaringsforhold:** Opbevares utilgængeligt for børn. Ekstremt brændbar aerosol. Beholder under tryk: kan sprænges ved opvarmning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Undgå rygning under anvendelse af præparatet. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på beholderen. Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:** Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holland. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark. **Markedsføringstilladelsens nummer:** 53417 **Dato for seneste revision af tekst:** 24. november 2014 **Pakningsstørrelser:** 50 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml og 400 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Til dyr - kræver recept.

Batch/EXP: Se beholders bund.
GIN: 01046261705004

615706




Vnr 17 05 00

TAF Vet.

28,5 mg/g

Kutanspray, opløsning Thiamphenicol



150 ml
210 3e



Dechra

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer: 1 g indeholder: Aktivt stof: Thiamphenicol 28,5 mg; Hjælpestof: Curcumin (E100) 0,5 mg
Lægemiddelform: Kutanspray, opløsning. Klar gul opløsning. **Dyrearter:** Hest, kvæg, ged, får, svin, mink, kanin. **Indikationer:** *Hos alle dyrearter, som lægemidlet er beregnet til:* Behandling af overfladiske sårinfektioner forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for thiamphenicol. **Hos kvæg, ged og får:** Behandling af klov- og hovinfektioner som f.eks. klovsyge, interdigital dermatitis (klovspalte- og balleførrådelse), digital dermatitis (betændelse i huden omkring klovene) forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for thiamphenicol. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes i kendte tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Se også pkt. 'Tilbageholdelsestid'. **Bivirkninger:** Ingen kendte. Hvis De/du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt på denne etiket, bedes De/du kontakte Deres/din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted. www.sst.dk **Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej samt oplysninger om korrekt anvendelse:** Til kutan anvendelse. Beholderen skal omrystes grundigt for sprøjtning. Sprøjt opløsningen på det ramte område i 3 sekunder (svarende til cirka 45 mg thiamphenicol) én gang dagligt. Afhængig af helingsprocessen kan behandlingen gentages op til 3 på hinanden følgende dage. Beholderen skal holdes i en afstand af cirka 15-20 cm fra det område, der skal behandles. For optimale resultater skal sårene rengøres for påføringen. Sprayflasken kan benyttes både opretstående og på hovedet. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. **Tilbageholdelsestid:** Slagtning: Hest, kvæg, ged, får, kanin: 0 dage; Svin: 14 dage; Mælk: 0 timer. Må ikke anvendes på yveret på diegivende dyr, hvis disses mælk er bestemt til menneskeføde. **Særlige advarsler:** **Særlige advarsler for hver dyreart:** Det ramte område skal rengøres grundigt for påsprøjtning. Efter administration af produktet skal dyret holdes på tør grund i mindst én time. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Beskyt øjnene ved påsprøjtning i nærheden af hovedet. Dyret skal forhindres i at slikke det behandlede område eller behandlede områder på andre dyr. Anvendelse af præparatet skal baseres på følsomhedstest og tage højde for officielle og lokale antibiotikapolitikker. Brug af produktet som afviger fra instruktionerne på denne etiket kan øge forekomsten af resistente bakterier. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** I tilfælde af utilsigtet øjenkontakt kan dette præparat give anledning til irritation. Det anbefales at benytte øjenværn (som f.eks. sikkerhedsbriller). Hvis der opstår irritation, skal der søges lægehjælp, og etiketten skal vises til lægen.