

INDLÆGSSEDDEL

Locoidol® creme

Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g og chlorquinaldol 30 mg/g

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis De har flere spørgsmål.
- Lægen har ordineret Locoidol til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Locoidol
3. Sådan skal De bruge Locoidol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Locoidol indeholder hydrocortisonbutyrat og chlorquinaldol. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. Chlorquinaldol er et antibiotikum, som hæmmer nogle bakterier og svampe.

De kan bruge Locoidol ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis, som er betændt med bakterier eller svampe.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER LOCIDOL

Brug ikke Locoidol hvis

- De er overfølsom over for hydrocortisonbutyrat eller chlorquinaldol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoidol.
- Deres hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe, som Locoidol ikke virker på. Hvis cremen ikke hjælper i løbet af få dage, skal De kontakte lægen.

Brug ikke Locoidol mod

- virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
- rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
- betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.
- hudtuberkulose.
- sår eller udslæt, som skyldes syfilis.

Særlige forholdsregler

- Hvis cremen ikke hjælper i løbet af få dage, kan Deres hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe, som cremen ikke virker på. Tal med lægen.
- De må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.
- Hvis De har brugt cremen i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få Deres hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
- De må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt Dem det. Pas på at cremen ikke kommer i øjnene.

- De må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Locoidol. Fortæl lægen, at De bliver behandlet med Locoidol, hvis De får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoidol sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Locoidol efter lægens anvisning.

Amning:

De kan amme, selv om De bruger Locoidol.

Hvis De smører cremen på brystet eller brystvorten, skal De vaske cremen af, inden De ammer Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoidol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoidol creme

Locoidol creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE LOCOIDOL

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Voksne:

- Smør Locoidol på de angrebne steder i et tyndt lag 1-3 gange daglig.
- Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som De behandler.
- Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
- Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.

Børn:

De skal følge lægens anvisning.

De må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen pludseligt, især hvis De har brugt Locoidol i lang tid.

Har De brugt for meget Locoidol?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Locoidol, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Det sker normalt kun, hvis De har brugt Locoidol på store områder igennem lang tid.

Har De glemt at bruge Locoidol?

Smør Locoidol på, så snart De kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Locoidol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De må kun smøre Locoidol i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbindelse efter aftale med Deres læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner, se særlige forholdsregler.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Tynd hud, der let går i stykker.
- Udvidelse af de små blodkar i huden med rødme og hævelse. Små blodudtrædninger. Lyse streger i huden. Ændring i pigmentet i huden (f.eks. lyse pletter).
- Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden. Bumser (akne). Kontakteksem.
- Skægvækst. Tynde, bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.
- Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når De stopper behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

- Opbevar Locoidol utilgængeligt for børn.
- Opbevar Locoidol ved stuetemperatur 15-25 °C.
- Brug ikke Locoidol efter den udløbsdato, som står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Locoidol indeholder

- De aktive stoffer er hydrocortisonbutyrat og chlorquinaldol. 1 g creme indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat og 30 mg chlorquinaldol.
- De øvrige indholdsstoffer er cetostearylalkohol; makrogolcetostearylether; tynd paraffinolie; hvid, blød paraffin; vandfri natriumcitrat; vandfri citronsyre; rensset vand.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: Beige/råhvid creme.

Pakningsstørrelse: Tube 30 g.

Markedsføring og fremstilling**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Astellas Pharma a/s

Naverland 4

2600 Glostrup

Danmark

Fremstiller

Astellas Pharma Europe B.V.

P.O. Box 108

2350 AC Leiderdorp, Holland

Revideret november 2006