Dermipred® Vet

5mg - 10mg - 20mg

DK Dermipred Vet 5 mg tabletter til hunde - Dermipred Vet 10 mg tabletter til hunde - Dermipred Vet 20 mg tabletter til hunde.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelse:
Ceva Animal Health A/S, Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle, Danmark
Fremstiller ansvarlig for batch frigivelse
Ceva Santé Animale - Boulevard de la communication - Zone Autoroutière - 53950 Louverné - Frankrig

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Dermipred Vet 5 mg tabletter til hunde - Dermipred Vet 10 mg tabletter til hunde - Dermipred Vet 20 mg tabletter til hunde.
Prednisolon

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Dermipred Vet 5 mg
Hver tablet indeholder: **Aktivt stof:**
Prednisolon ..... 5,0 mg
Aflang, beige til lysebrun tablet, med delekærv på den ene side. Tabletterne kan deles i halve.
Dermipred Vet 10 mg
Hver tablet indeholder: **Aktivt stof:**
Prednisolon ..... 10,0 mg
Rund, beige til lysebrun tablet, med to delekærve på den ene side. Tabletterne kan deles i halve og kvarte.
Dermipred Vet 20 mg
Hver tablet indeholder: **Aktivt stof:**
Prednisolon ..... 20,0 mg
Rund, beige til lysebrun tablet, med to delekærve på den ene side. Tabletterne kan deles i halve og kvarte.

INDIKATIONER

Til symptomatisk behandling eller som understøttende behandling af inflammatorisk og immunmedieret dermatitis hos hunde.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til dyr med: Virale, mykotiske eller parasitære infektioner som ikke kontrolleres ved passende behandling, Diabetes mellitus , Hyperadrenocorticisme, Osteoporosis, Hjertelidelse, Svær nyreinsufficiens, Cornea-sår, Gastro-intestinal ulceration, Glaucoma.
Må ikke anvendes samtidig med attenuerede, levende vacciner.
Må ikke anvendes i tilfælde med kendt overfølsomhed for aktivstoffet, andre kortikosteroider eller ét eller flere af hjælpestofferne.
Se også afsnittene "Anvendelse under drægtighed og diegivning" og "Interaktioner med andre lægemidler eller andre former for interaktioner".

BIVIRKNINGER

Anti-inflammatoriske kortikosteroider, som f.eks. prednisolon, vides at have en række bivirkninger. Mens en enkelt høj dosis normalt tolereres godt, kan langvarigt brug medføre alvorlige bivirkninger.
Den betydelige dosisafhængige kortisolsuppression som ses i behandlingsforløbet skyldes undertrykkelse af hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Efter afslutning af behandlingsforløbet kan der opstå symptomer på binyreinsufficiens, og dette kan efterlade dyret ude af stand til at reagere hensigtsmæssigt på stressfulde situationer.
Den betydelige stigning af triglycerider som kan ses, skyldes muligvis opståen af iatrogen hyperadrenokorticisme (Cushing's sygdom) der involverer en betydelig påvirkning af fedt-, kulhydrat-, protein- og mineralmetabolismen, bl.a. i form af en omfordeling af kropsfedt, forøgelse af legemsvægten, muskelsvækkelse, øgede affaldsprodukter og osteoporosis. Kortisolsuppression og en stigning af triglycerider i plasma er en meget almindelig bivirkning efter behandling med kortikosteroider (mere end 1 ud af 10 dyr).
Ændringer i biokemiske, hæmatologiske og leverparametre som sandsynligvis skyldes brug af prednisolon var betydningsfulde virkninger, der kunne aflæses på alkalisk fosfatase (stigning), laktat-dehydrogenase (fald), albumin (stigning), eosinofile lymfocyter (fald), segmenterede neutrofile granulocyter (stigning) og hepatiske enzymer i serum (stigning). Et fald i aspartat transaminase kan også ses.
Systemisk behandling med kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi, i særdeleshed i starten af behandlingsforløbet. Visse kortikosteroider kan forårsage natrium- og vand-retention samt hypokalæmi ved langtidsbehandling. Systemiske kortikosteroider har medført deponering af calcium i huden (calcinosis dermis).
Brug af kortikosteroider kan forsinke sårheling og den immunosuppressive effekt kan svække modstandskraften over for – eller forværre eksisterende - infektioner.
Gastrointestinal ulceration er rapporteret hos dyr behandlet med kortikosteroider, og eksisterende gastrointestinale ulcerationer kan forværres af steroider hos dyr der behandles med nonsteroide-antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) og hos dyr med rygmarvstraumer.
Andre bivirkninger som kan forekomme er: nedsat longitudinal vækst af knogler; hudatrofi; diabetes mellitus; adfærdsændringer (excitation eller depression), pancreatitis, fald i dannelsen af thyreoideahormon; stigning i dannelsen af parathyreoideahormon. Se også afsnittet "Anvendelse under drægtighed og diegivning".
Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.lmst.dk

DYREARTER: Hunde.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.
Dosering og behandlingens varighed fastsættes af dyrlægen i hvert enkelt tilfælde afhængig af symptomernes omfang.
Initialdosis:
- til dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg legemsvægt 2 gange dagligt.
- til dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg legemsvægt 2 gange dagligt.
Længerevarende behandling:
Når den ønskede effekt er nået efter en periode med daglig dosering, bør dosis reduceres, indtil man når den laveste effektive dosis. Reduktion af dosis bør ske ved behandling hveranden dag og/eller ved halvering af dosis med intervaller på 5-7 dage indtil den laveste effektive dosis er nået.
Eksempel:
Antal tabletter ved en dosering på 1 mg/kg/dag opdelt i to ens doser – svarende til den anti-inflammatoriske dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt:

Legemsvægt (kg) 0.5mg/kg	Dermipred Vet 5 mg Antal tabletter (2x dagligt)	Dermipred Vet 10 mg Antal tabletter (2x dagligt)	Dermipred Vet 20 mg Antal tabletter (2x dagligt)
3 – 5	½	¼	
6 – 10	1	½	¼
11 – 15		¾	
16 – 20		1	½
21 – 25		1 ¼	
26 – 30			¾
31 – 40			1

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Lad dyret spise tabletten spontant eller placér tabletten på tungeroden.

TILBAGEHOLDELSESTID: Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke opbevares over 30°C
Alle ubrugte dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen og anvendes ved den følgende behandling.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette veterinærlægemiddel må ikke anvendes efter udløbsdatoen anført på blisterkortet og papæsken efter "EXP". Udløbsdatoen refererer til månedens sidste dag.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Kortikosteroider anvendes til at reducere kliniske symptomer snarere end en egentlig helbredelse. Behandlingen bør kombineres med en behandling af den grundlæggende lidelse og/eller kontrol af omgivelserne.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

I tilfælde hvor der findes en bakteriel infektion bør lægemidlet anvendes sammen med en passende antibiotisk behandling. Anvendelse af farmakologisk aktive doser kan medføre adrenal insufficiens. Dette bliver især synligt, efter behandling med kortikosteroider er stoppet. Dette forhold kan modvirkes ved nedtrapning af produktet, hvis det er praktisk muligt. Doseringen bør reduceres gradvist for til sidst helt at ophøre for at undgå adrenal insufficiens (se afsnittet: "Dosering, indgivelsesvej(e) og administrationsmåde").
Kortikosteroider som prednisolon, fremmer protein katabolisme. Produktet bør derfor anvendes med forsigtighed til ældre eller underernærede dyr.
Kortikosteroider som prednisolon, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hypertension, epilepsi, forbrændinger, tidligere steroid myopati, til immunokompromitterede dyr og til unge dyr, da kortikosteroider kan medføre nedsat vækst.
Behandling med dette veterinærlægemiddel kan interferere med virkningen af vaccinationer. Ved anvendelse af attenuerede, levende vacciner, bør behandling ikke ske i 2 uger før og efter vaccination.
Særlig overvågning er påkrævet for dyr med nyreinsufficiens. Må kun bruges efter en omhyggelig vurdering af fordele og ulemper af den ansvarlige dyrlæge.
Tyggetabletterne er tilsat smagsstoffer. For at undgå indtagelse ved et uheld bør tabletterne opbevares utilgængeligt for dyrene.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af indtagelse ved et uheld, søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.
Personer med kendt overfølsomhed overfor prednisolon eller andre kortikosteroider, eller et eller flere af hjælpestofferne bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.
Kortikosteroider kan forårsage misdannelser hos fostre; det anbefales derfor, at gravide kvinder undgår kontakt med veterinærlægemidlet.
Vask hænder grundigt straks efter håndtering af tabletterne.
Drægtighed og diegivning:
Kortikosteroider anbefales ikke til drægtige dyr. Anvendelse i begyndelsen af drægtigheden er kendt som årsag til fosterskader hos laboratoriedyr. Anvendelse i slutningen af drægtigheden kan forårsage tidlig fødsel eller abort.
Glucokortikoider udskilles i mælk, og kan påvirke væksten hos diende unge dyr. Som en konsekvens heraf, må produktet kun anvendes til lakterende tæver efter den ansvarlige dyrlæges grundige vurdering af fordele og ulemper.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan fremme den metaboliske udskillelse af kortikosteroider og herved reducere niveauet i blodet og den fysiologiske virkning.
Samtidig brug af dette veterinærlægemiddel og non-steroide, antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) kan forøge risikoen for ulcerationer i gastro-intestinalkanalen.
Anvendelsen af prednisolon kan inducere hypokalæmi og derved øge risikoen for forgiftninger med hjerteglykosider. Risikoen for hypokalæmi kan øges hvis prednisolon anvendes sammen med kaliumudskillende diuretika. Nødvendige forholdsregler skal tages ved samtidig brug af insulin.
Overdosering:
En overdosering forårsager ingen andre virkninger end beskrevet under "Bivirkninger".
Der findes ingen specifik antidot.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Alle ikke anvendte veterinære lægemidler og affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN: 16.08.2016

ANDRE OPLYSNINGER

Dermipred 5 mg: Papæske med 20 tabletter, 24 tabletter eller 120 tabletter.
Dermipred 10 mg: Papæske med 16 tabletter eller 96 tabletter.
Dermipred 20 mg: Papæske med 20 tabletter eller 100 tabletter.
Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

SE Dermipred Vet 5 mg tabletter till hund - Dermipred Vet 10 mg tabletter till hund - Dermipred Vet 20 mg tabletter till hund

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Ceva Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 22764 Lund, Sverige
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Ceva Santé Animale - Boulevard de la communication - Zone Autoroutière - 53950 Louverné - Frankrike

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Dermipred Vet 5 mg tabletter till hund - Dermipred Vet 10 mg tabletter till hund - Dermipred Vet 20 mg tabletter till hund
prednisolon

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Dermipred Vet 5 mg
1 tablett innehåller:
Aktiv substans: Prednisolon ..... 5 mg
Avlång, beige till ljusbrun tablett med en skåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.
Dermipred Vet 10 mg
1 tablett innehåller:
Aktiv substans: Prednisolon ..... 10 mg
Rund, beige till ljusbrun tablett med en krysskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar.
Dermipred Vet 20 mg
1 tablett innehåller:
Aktiv substans: Prednisolon ..... 20 mg
Rund, beige till ljusbrun tablett med en krysskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För symtomatisk behandling eller som understödjande behandling vid inflammatorisk och immunmedierad hudinflammation hos hund.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till djur med: virus-, svamp- eller parasitinfektioner som inte är under kontroll med lämplig behandling, diabetes mellitus, hyperadrenokorticism (Cushings sjukdom, förhöjd insöndring av binjurebarkshormon), benskörhet, hjärtsvikt, allvarlig njursvikt, hornhinnesår, sår i mag-tarmkanalen, glaukom (grön starr, ökat tryck i ögat).
Använd inte samtidigt med försvagade levande vacciner.
Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, mot andra kortikosteroider eller mot något (några) hjälpämne(n).
Se även avsnitt 12 under rubrikerna 'Dräktighet, digivning' samt 'Andra läkemedel och Dermipred.'

BIVERKNINGAR

Antiinflammatoriska kortikosteroider kan vid lång tids användning orsaka allvarliga biverkningar.
Dessa biverkningar visar sig som hyperadrenokorticism (förhöjd insöndring av binjurebarkshormon, även kallat Cushings sjukdom) vilken ger omfördelning av kroppsfett, ökning av kroppsvikt, muskelsvaghet, förkalkningar och osteoporos (benskörhet).
En minskad kortisolproduktion och en ökning av blodfetter är en mycket vanlig biverkning vid medicinering med kortikosteroider (fler än 1 av 10 djur drabbas).
De tydliga förändringar i blod- och levervärden som sågs och som sannolikt berodde på användning av prednisolon var bland annat en ökning av leverenzymer i blodet, ökning av neutrofiler (vita blodkroppar) eller en minskning av lymfocyter (vita blodkroppar).
Kortikosteroider som tillförs kroppen via munnen eller via injektion kan orsaka ökad urinproduktion, hunger och törst, särskilt tidigt under i behandlingen. Vissa kortikosteroider kan orsaka natrium och vattenretention (salt och vatten hålls kvar i kroppen) samt kaliumbrist vid lång tids användning.
Användning av kortikosteroider kan orsaka fördröjd sårläkning och dess immundämpande effekt kan försvaga motståndet mot eller förvärra existerande infektioner.
Sårbildningar i mag-tarmkanalen hos djur behandlade med kortikosteroider har rapporterats och sår i mag-tarmkanalen kan förvärras av steroider hos djur som ges icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och hos djur med ryggmärgsskada.
Andra biverkningar som kan uppkomma är: hämning av längdtillväxten av ben, hudförtvining, diabetes mellitus, beteenderubbningar (upphetsning, nedstämdhet), inflammation i bukspottskörteln, minskad bildning av tyreoideahormoner, ökad bildning av paratyreoideahormoner.
Efter avslutad behandling kan tecken på binjuresvikt uppkomma och det kan göra djuret oförmöget att reagera normalt i stressande situationer.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

DJURSLAG: Hund

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Ges via munnen.
Dos och total behandlingstid bestäms av veterinär i varje individuellt fall beroende på symtomens allvarlighetsgrad. Lägsta effektiva dos skall användas.
Startdos:
- för dermatiter (hudinflammationer) som kräver antiinflammatorisk dos: 0,5 mg per kg kroppsvikt två gånger dagligen.
- för dermatiter (hudinflammationer) som kräver immundämpande doser: 1-3 mg per kg kroppsvikt två gånger dagligen.
För längre behandlingar: när effekten har uppnåtts efter en period med daglig dosering, bör dosen minskas tills lägsta effektiva dos har uppnåtts. Dosreduktion bör göras genom dosering varannan dag och/eller genom att halvera dosen i intervall om 5-7 dagar tills lägsta effektiva dos har uppnåtts.
Till exempel:
Antal tabletter för ett doseringsschema på 1 mg/ kg och dag, fördelat på två lika stora doser – motsvarande den antiinflammatoriska dosen 0,5 mg/ kg två gånger dagligen.

Kroppsvikt (kg) 0.5mg/kg	Dermipred Vet 5 mg Antal tabletter (två gånger dagligen)	Dermipred Vet 10 mg Antal tabletter (två gånger dagligen)	Dermipred Vet 20 mg Antal tabletter (två gånger dagligen)
3–5	½	¼	
6–10	1	½	¼
11–15		¾	
16–20		1	½
21–25		1¼	
26–30			¾
31–40			1

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletten ätes frivilligt av djuret eller kan placeras på tungans bakre del.

KARENSTID: Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C. Förvara delad tablett i blister och använd vid nästa doseringstillfälle. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet i öppnad förpackning: 2 år.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Behandling med kortikosteroider syftar till att förbättra symtom snarare än att bota. Behandlingen bör kombineras med behandling av den underliggande orsaken och/eller kontroll av miljöfaktorer.
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: I fall med bakteriell infektion bör produkten användas tillsammans med lämplig antibakteriell behandling. Farmakologiskt aktiva dosnivåer kan resultera i försämrad binjurefunktion. Detta kan komma att bli särskilt uppenbart efter utsättning av kortikosteroidbehandling. Denna effekt kan minimeras genom att ge läkemedlet varannan dag om det är praktiskt möjligt. Doseringen bör minskas och sättas ut gradvis för att undvika uppkomst av binjuresvikt (se avsnitt 8 "DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG").
Kortikosteroider såsom prednisolon, ökar proteinnedbrytning. Därför bör produkten ges med försiktighet till gamla eller undernärda djur.
Kortikosteroider såsom prednisolon, bör användas med försiktighet till djur med högt blodtryck, epilepsi, brännskador, tidigare steroidinducerad myopati (muskelsjukdom), djur med nedsatt immunförsvar och till unga djur eftersom kortikosteroider kan orsaka fördröjd tillväxt.
Behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet kan störa effekten av vaccination. Vid vaccinering med levande, försvagat vaccin, bör ett tvåveckors intervall före och efter behandling beaktas.
Särskild övervakning krävs för djur med försämrad njurfunktion. Använd endast efter noggrann nytta/riskbedömning av ansvarig veterinär.
Tuggtabletterna är smaksatta. Förvara tabletterna utom räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.
Personer som är överkänsliga för prednisolon eller andra kortikosteroider ska undvika kontakt med läkemedlet.
Kortikosteroider kan orsaka fostermissbildningar. Detta läkemedel bör därför inte hanteras av gravida kvinnor.
Tvätta händerna noggrant omedelbart efter hantering av tabletterna.
Dräktighet och digivning: Användning av kortikosteroider rekommenderas inte under dräktighet. Det är känt att behandling under tidig dräktighet har orsakat fosterskador hos laboratoriedjur. Administrering under den senare delen av dräktigheten kan leda till för tidig födsel eller abort.
Glukokortikoider utsöndras i mjölk vilket kan leda till hämning av tillväxt hos diande unga djur.
Använd därför hos digivande tikar endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.
Andra läkemedel och Dermipred Vet: Samtidig behandling med läkemedel som innehåller fenytoin, barbiturater, efedrin eller rifampicin kan minska effekten av detta läkemedel.
Samtidig användning av detta läkemedel med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan förvärra sår i mag-tarmkanalen.
Administrering av prednisolon kan orsaka hypokalemi (kaliumbrist) och därigenom öka risken för toxicitet av så kallade hjärtglykosider. Risken för hypokalemi kan öka om prednisolon ges tillsammans med icke-kaliumsparande diuretika. Försiktighet bör iakttas när användning kombineras med insulin.
Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift): En överdos kommer inte att orsaka andra effekter än de som nämns i avsnittet ovan.
Det finns ingen specifik antidot (motgift).

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES: 2016-10-05

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Dermipred Vet 5 mg: Pappkartong med 20, 24 tabletter eller 120 tabletter
Dermipred Vet 10 mg: Pappkartong med 16 eller 96 tabletter
Dermipred Vet 20 mg: Pappkartong med 20 eller 100 tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännande för försäljning (SE).

FI MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVANVALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI
Myyntiluvan haltija:
Ceva Santé Animale - 10, av. de la Ballastière - 33500 Libourne - Ranska
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Ceva Santé Animale - Boulevard de la communication, Zone Autoroutière, 53950 Louverné, Ranska
ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Dermipred Vet 5 mg tabletit koirille - Dermipred Vet 10 mg tabletit koirille - Dermipred Vet 20 mg tabletit koirille prednisoloni
VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET
Dermipred Vet 5 mg
Yksi tabletti sisältää: **Vaikuttava aine**
prednisoloni ..... 5 mg
Beige tai vaaleanruskea pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
Dermipred Vet 10 mg
Yksi tabletti sisältää: **Vaikuttava aine**
prednisoloni ..... 10 mg
Beige tai vaaleanruskea pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
Dermipred Vet 20 mg
Yksi tabletti sisältää: **Vaikuttava aine**
prednisoloni ..... 20 mg
Beige tai vaaleanruskea pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
KÄYTTÖAIHEET
Tulehduksellisen ja immuunivälitteisen ihottuman oireenmukaiseen hoitoon tai tukihoitoon koirilla.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää eläimille, joilla on hoitamaton virus-, sieni- tai loisinfektio, sokeritauti, lisämunuaisten liikatoiminta (Cushingin oireyhtymä), luukato, sydämen vajaatoiminta, vaikea munuaisten vajaatoiminta, sarveiskalvon haavaumia, ruuansulatuskanavan haavaumia, silmänpainetauti.
Ei saa käyttää samanaikaisesti eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden kanssa.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle, muille kortikosteroideille tai apuaineille.
Ks. myös kohdat "Käyttö tiineyden tai imetyksen aikana" ja "Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset".
HAITTAVAIKUTUKSET
Tulehdusta ehkäisevät tai lievittävät kortikosteroidit voivat aiheuttaa vaikeita haittavaikutuksia pitkäaikaisessa käytössä.
Haittavaikutukset ilmenevät usein lisämunuaisten liikatoiminnan (Cushingin tauti) kliinisinä oireina, joita ovat muutokset rasvakudoksen sijoittumisessa, painon nousu, lihasheikkous ja lihaskato, kalkkiutuminen sekä luun tiheyden väheneminen.
Kortisolituotannon väheneminen ja plasman triglyseridipitoisuuden kasvu ovat hyvin yleisiä kortikoidi- lääkityksen haittavaikutuksia (ilmenevät yli yhdellä eläimellä kymmenestä).
Muita, todennäköisesti prednisolonin käyttöön liittyviä, huomattavia muutoksia biokemiallisissa arvoissa sekä veri- ja maksa-arvoissa olivat seerumin maksaentsyymiarvojen ja neutrofiiliarvojen suureneminen sekä lymfosyyttiarvojen pieneneminen.
Systeemisesti annosteltuna kortikosteroidit voivat erityisesti hoidon alkuvaiheessa aiheuttaa lisääntynyttä virtsaamista, juomista ja ruokahalua. Pitkäaikaisessa käytössä jotkut kortikosteroidit saattavat aiheuttaa natriumin ja veden kertymistä ja alhaisia kaliumpitoisuuksia. Kortikosteroidit voivat hidastaa haavojen paranemista, ja immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevät vaikutukset voivat heikentää vastustuskykyä olemassa olevia tulehduksia vastaan tai vaikeuttaa niitä.
Kortikosteroideilla lääkityillä eläimillä on ollut mahasuolikanavan haavaumia. Steroidit saattavat pahentaa mahasuolikanavan haavaumia eläimillä, joille on annettu ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä.
Muita mahdollisesti ilmeneviä haittavaikutuksia ovat luiden pituuskasvun hidastuminen, ihon oheneminen, sokeritauti, käytöshäiriöt (kiihtymys ja alakuloisuus), haimatulehdus, kilpirauhashormonin tuotannon väheneminen ja lisäkilpirauhashormonin tuotannon lisääntyminen.
Hoidon keskeyttäminen voi aiheuttaa lisämunuaisten vajaatoimintaa, mikä saattaa johtaa eläimen kyvyttömyyteen selvitä stressitilanteissa. Ks. myös kohta "Käyttö tiineyden tai imetyksen aikana".
Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.
KOHDE-ELÄINLAJIT: Koira
ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Suun kautta.
Eläinlääkäri arvioi tarvittavan annoksen ja hoidon keston yksilöllisesti oireiden vakavuuden perusteella. Pienintä tehokasta annosta on käytettävä.
Aloitusannos:
- ihottuman hoitoon tulehdusta ehkäisevällä tai lievittävällä annoksella: 0,5 mg/painokilo kaksi kertaa vuorokaudessa
- ihottuman hoitoon immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevällä annoksella: 1-3 mg/painokilo kaksi kertaa vuorokaudessa.
Jatkohoito: kun päivittäisen annostelun jälkeen on saavutettu toivottu teho, annosta lasketaan, kunnes pienin tehokas annos saavutetaan. Annoksen pienentäminen pitää tehdä antamalla lääkettä joka toinen päivä ja/tai puolittamalla annos 5-7 vuorokauden jaksoissa, kunnes pienin tehokas annos on saavutettu.
Esimerkiksi:
Tablettien määrä annostuksella 1 mg/kg/vrk kahdella yhtä suurella annoksella - vastaa tulehdusta ehkäisevää tai lievittävää annosta 0,5 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa

Paino (kg) 0,5 mg/kg	Dermipred Vet 5 mg Tablettien määrä (kaksi kertaa vuorokaudessa)	Dermipred Vet 10 mg Tablettien määrä (kaksi kertaa vuorokaudessa)	Dermipred Vet 20 mg Tablettien määrä (kaksi kertaa vuorokaudessa)
3–5	½	¼	
6–10	1	½	¼
11–15		¾	
16–20		1	½
21–25		1¼	
26–30			¾
31–40			1

ANNOSTUSOHJEET
Valmiste annetaan eläimelle syötäväksi tai laitetaan kielen takaosan päälle.
VAROAIKA
Ei oleellinen.
SÄILYTYSOLOSUHTEET
Säilytä alle 30 °C. Käyttämättömät tabletin osat pitää säilyttää avatussa läpipainopakkauksessa ja käyttää seuraavalla annostelukerralla. Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta eräänty mispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu läpipainopakkauksessa ja etiketissä EXP jälkeen. Eräänty mispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.
ERITYISVAROITUKSET
Kortikoideja käytetään lieventämään kliinisiä oireita, ei varsinaisesti parantamaan sairautta. Hoito on yhdistettävä taustalla olevan sairauden hoitoon ja/tai ympäristöolosuhteiden muuttamiseen.
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: Bakteerien aiheuttamissa tulehduksissa valmistetta pitää käyttää yhdistettynä sopivaan bakteerien määrää vähentävään hoitoon. Farmakologisesti vaikuttavat annokset voivat johtaa lisämunuaisten vajaatoimintaan. Tämä voi tulla esiin etenkin kortikosteroidihoidon päätyttyä. Lisämunuaisten vajaatoiminnan riskiä voidaan pienentää annostelemalla lääke joka toinen päivä, jos se on mahdollista. Annoksen pienentäminen ja lääkityksen lopettaminen pitää tehdä asteittain, jotta lisämunuaisten vajaatoiminnan kehittymistä voidaan välttää (ks. kohta "ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN").
Kortikoidit, kuten prednisoloni, kiihdyttävät proteiinien aineenvaihdunnallista hajoamista. Tästä syystä valmistetta on käytettävä harkiten vanhoilla tai aliravituilla eläimillä.
Kortikoideja, kuten prednisolonia, on käytettävä varoen potilailla, joilla on korkea verenpaine, epilepsia, palovammoja tai aiempi steroidien aiheuttama lihassairaus sekä puutteellisesta immuunivasteesta kärsivillä ja nuorilla eläimillä, sillä kortikosteroidit voivat aiheuttaa kasvun hidastumista.
Hoito tällä eläinlääkevalmisteella saattaa heikentää rokotusvastetta. Lääkettä ei saa antaa kaksi viikkoa ennen eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävän rokotteen antoa tai kaksi viikkoa sen jälkeen.
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavia eläimiä on seurattava erityisen tarkasti. Valmistetta saa käyttää vain hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty–haitta-arvion perusteella.
Purutabletit ovat maustettuja. Säilytä tabletit eläinten ulottumattomissa, etteivät eläimet syö niitä vahingossa.
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.
Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä prednisolonille tai muille kortikosteroideille tai apuaineille, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.
Kortikosteroidit voivat aiheuttaa sikiön epämuodostumia. Siksi raskaana olevien naisten on suositeltavaa välttää eläinlääkevalmisteen käsittelyä.
Pese kädet huolellisesti heti tablettien käsittelyn jälkeen.
Käyttö tiineyden tai imetyksen aikana: Kortikosteroidien käyttöä ei suositella tiineyden aikana. Niiden käytön tiineyden varhaisvaiheessa tiedetään aiheuttaneen sikiön poikkeavuuksia koe-eläimillä. Käyttö tiineyden loppuvaiheessa saattaa aiheuttaa ennenaikaisen synnytyksen tai keskenmenon.
Glukokortikoidit erittyvät maitoon, mikä voi johtaa imevien pentujen kasvun hidastumiseen. Imetyksen aikana valmistetta voidaan siis käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella.
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Lääkkeen teho voi heikentyä, jos sen kanssa käytetään samanaikaisesti muuta lääkettä, jossa on vaikuttavana aineena fenytoiinia, jotakin barbituraattia, efedriiniä tai rifampisiinia.
Tämän eläinlääkevalmisteen samanaikainen käyttö ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden kanssa voi pahentaa mahasuolikanavan haavautumista.
Prednisoloni saattaa aiheuttaa alhaisia kaliumpitoisuuksia ja siten lisätä sydänglykosidilääkityksen toksisuuden riskiä. Alhaisen kaliumpitoisuuden riski saattaa suurentua, jos prednisolonia käytetään yhdessä kaliumia kuluttavien diureettien kanssa.
Varovaisuutta on noudatettava, jos valmistetta käytetään yhdessä insuliinin kanssa.
Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): Yliannostus ei aiheuta muita kuin kohdassa "Haittavaikutukset" mainittuja haittavaikutuksia.
Vastalääkettä ei tunneta.
ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI
Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.
PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY: 22.7.2016
MUUT TIEDOT
Dermipred Vet 5 mg. Pahvirasia, jossa on 20, 24 tai 120 tablettia
Dermipred Vet 10 mg . Pahvirasia, jossa on 16 tai 96 tablettia
Dermipred Vet 20 mg . Pahvirasia, jossa on 20 tai 100 tablettia
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.
Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

NO Dermipred Vet 5 mg tabletter til hund - Dermipred Vet 10 mg tabletter til hund - Dermipred Vet 20 mg tabletter til hund
NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Ceva Santé Animale, 10 av de la Ballastière, 33500 Libourne, Frankrike
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication, Zone Autoroutière; 53950 Louverné, Frankrike
VETERINÆRPREPARATETS NAVN
Dermipred Vet 5 mg tabletter til hund - Dermipred Vet 10 mg tabletter til hund - Dermipred Vet 20 mg tabletter til hund
Prednisolon
DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)
Dermipred Vet 5 mg
Hver tablett inneholder: **Virkestoff:**
Prednisolon ..... 5,0 mg
Avlang, beige til lysebrun tablett med delestrek på en side. Tabletten kan deles i 2 deler.
Dermipred Vet 10 mg
Hver tablett inneholder: **Virkestoff:**
Prednisolon ..... 10,0 mg
Rund, beige til lysebrun tablett med dobbel delestrek på en side. Tabletten kan deles i 2 og 4 deler.
Dermipred Vet 20 mg
Hver tablett inneholder: **Virkestoff:**
Prednisolon ..... 20,0 mg
Rund, beige til lysebrun tablett med dobbel delestrek på en side. Tabletten kan deles i 2 og 4 deler.
INDIKASJON(ER)
Til symptomatisk behandling eller som tilleggsbehandling ved inflammatorisk og immunmediert dermatitt hos hund.
KONTRAINDIKASJONER
Skal ikke brukes til hunder med: Viral, mykotisk eller parasittær infeksjon som ikke er under kontroll med egnet behandling, diabetes mellitus, hyperadrenokortisisme, osteoporose, hjertefeil, alvorlig nyresvikt, cornea sår, gastrointestinal ulcerasjon og glaukom.
Skal ikke brukes samtidig med levende attenuerte vaksiner.
Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet, andre kortikosteroider eller noen av hjelpestoffene.
Se også i punkt 12 under rubrikkene «Drektighet», «Diegiving» og «Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon».
BIVIRKNINGER
Antiinflammatoriske kortikosteroider kan gi alvorlige bivirkninger ved langtidsbruk.
Disse viser seg oftest som kliniske symptomer på hyperadrenokortisisme (Cushings sykdom) og omfatter redistribusjon av kroppsfett, vektøkning, muskelsvakhet, svinn, kalsinose og osteoporose.
Undertrykking av kroppens kortisolproduksjon og økning i plasmatriglyserider er en svært vanlig bivirkning etter medisinering med kortikoider.
Forandringer i biokjemiske og hematologiske parametre samt leververdier som sannsynligvis er knyttet til bruken av prednisolon omfatter signifikante effekter som f.eks. økning av leverenzymer i serum og nøytrofile blodlegemer eller reduksjon i lymfocytter.
Systemisk behandling med kortikosteroider kan forårsake økning i urinmengde, økt tørste og økt appetitt, særlig i tidlige stadier av behandlingen. Noen kortikosteroider kan gi retensjon av natrium og vann samt hypokalemi ved langtidsbruk. Kortikosteroidbruk kan forsinke sårheling og de immununder- trykkende egenskapene kan føre til minsket resistens mot eller forverring av eksisterende infeksjoner.
Sårdannelser i mage/tarm er rapportert hos dyr som behandles med kortikosteroider og steroider kan også gi en forverring av sår i mage/tarm hos dyr som behandles med NSAID-preparater.
Andre bivirkninger som kan forekomme: hemming av lengdeveksten hos bein, hudatrofi, diabetes mellitus, atferdslidelser (eksitasjon og depresjon), pankreatitt, reduksjon i produksjon av tyroideahormon, økning i produksjon av paratyroideahormon.
I forbindelse med at behandlingen avsluttes kan det oppstå tegn på binyresvikt og dette kan føre til at dyret ikke greier å håndtere stressede situasjoner.
Se også i punkt 12 under rubrikkene «Drektighet» og «Diegiving».
Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:
- Svært vanlige (flere enn 1 av10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling)
- Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr)
- Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr)
- Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av10 000 dyr)
- Svært sjeldne (færre enn 1 av10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).
Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.
DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER): Hund
DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE
Gis gjennom munnen.
Dosering og varighet av behandlingen bestemmes av veterinæren i hvert enkelt tilfelle og er avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Lavest mulig effektiv dose skal brukes.
Startdose:
- hudbetennelse - antiinflammatorisk dosering: 0,5 mg per kg kroppsvekt 2 x daglig.
- hudbetennelse - immunosuppressiv dosering: 1 – 3 mg per kg kroppsvekt 2 x daglig.
Ved langtidsbehandling: Når ønsket effekt er oppnådd reduseres dosen til den lavest mulige med opp- rettholdt effekt. Reduksjon kan foretas gjennom å halvere dosen hver 5. – 7. dag og gjennom å behandle annenhver dag.
I tabellen nedenfor angis antall tabletter for doseringen 1 mg/kg/dag delt i to like doser, tilsvarende en antiinflammatorisk dosering på 0,5 mg/kg 2 x daglig.

Kroppsvekt (kg) 0,5 mg/kg	Dermipred Vet 5 mg Antall tabletter (2 ggr. daglig)	Dermipred Vet 10 mg Antall tabletter (2 ggr. daglig)	Dermipred Vet 20 mg Antall tabletter (2 ggr. daglig)
3 – 5	½	¼	
6 – 10	1	½	¼
11 – 15		¾	
16 – 20		1	½
21 – 25		1 ¼	
26 – 30			¾
31 – 40			1

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK
Hvis hunden ikke spiser tabletten spontant kan den plasseres bak på tungeroten.
TILBAKEHOLDELSESTID: Ikke relevant
SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30 °C.
Ubrukt del av tablett oppbevares i blisteret og brukes ved neste administrering.
Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
SPESIELLE ADVARSLER
Kortikoider brukes for å gi lindring av kliniske symptomer og ikke for å helbrede. Behandlingen skal kombineres med behandling for underliggende sykdom og/eller kontroll av miljøet.
Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:
I tilfeller med bakteriell infeksjon skal behandlingen alltid kombineres med egnet antibiotikum.
Farmakologisk aktiv dose kan resultere i binyresvikt, spesielt etter at behandlingen er avsluttet. Risikoen kan reduseres gjennom å behandle annenhver dag. Dosen skal trappes ned og seponeres gradvis for å unngå binyresvikkelse (se også under punkt 8 om dosering).
Kortikosteroider, som f.eks. prednisolon, øker nedbrytningen av proteiner og skal derfor brukes med forsiktighet til gamle eller underernærte dyr.
Kortikosteroider, som f.eks. prednisolon, skal brukes med forsiktighet til dyr med høyt blodtrykk, epilepsi, brannsår, tidligere steroid muskelsykdom eller immunsvikt. Brukes også med forsiktighet til unge dyr, da kortikosteroider kan føre til forsinket vekst.
Prednisolon kan interferere med effekten av vaksinering og et intervall på 2 uker før og etter behandling er nødvendig ved bruk av levende attenuerte vaksiner.
Dyr med nedsatt nyrefunksjon skal bare behandles i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Disse pasientene krever spesiell oppfølging.
Tablettene er smaksatt og skal oppbevares utenfor dyrs rekkevidde slik at utilsiktet inntak unngås.
Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:
Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.
Personer med kjent hypersensitivitet overfor prednisolon, andre kortikosteroider eller noen av hjelpestoffene bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.
Kortikosteroider kan forårsake misdannelser hos foster og det er derfor anbefalt at veterinærpreparatet ikke håndteres av gravide kvinner.
Vask hendene grundig etter håndtering av tablettene.
Drektighet:
Bruk er ikke anbefalt. Det er kjent at bruk i tidlig drektighet har gitt fostermisdannelser hos laboratoriedyr. Behandling i siste del av drektigheten kan forårsake tidlig fødsel eller abort.
Diegiving:
Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Glukokortikoider skilles ut i melk og kan gi vekstforstyrrelser hos diende unge dyr.
Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:
Samtidig bruk av legemidler med innhold av fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan gi redusert effekt.
Bruk sammen med NSAID-preparater kan forverre sår i mage/tarm.
Behandling med prednisolon kan gi hypokalemi og dermed økt risiko for toksisk virkning av hjerteglykosider.
Risikoen for hypokalemi kan øke dersom prednisolon gis sammen med diuretika som øker kaliumutskillelsen.
Forsiktighetsregler må følges ved kombinasjon med insulin.
Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):
Overdosering vil ikke gi andre symptomer enn de som er beskrevet i punkt 6 «Bivirkninger».
Det finnes ikke spesifikk antidot.
SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE
Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.
DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG: 10.01.2017
YTTERLIGERE INFORMASJON
Dermipred 5 mg: Eske med 20, 24 eller 120 tabletter.
Dermipred 10 mg: Eske med 16 eller 96 tabletter.
Dermipred 20 mg: Eske med 20 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

SC486: 0217