

Ido-E[®] vet. 50 mg/ml



injektionsvæske, opløsning

Nyeste version af indlægssedlen er tilgængelig på www.indlaegsseddel.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Boehringer Ingelheim
Animal Health Nordics A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø

Veterinærlægemidlets navn

Ido-E vet. 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
Vitamin E

Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer

1 ml indeholder:

Aktivt stof: 50 mg vitamin E.

Hjælpemidler: Butylhydroxytoluen, citronsyre-monohydrat, natriumpyrosulfit, polyoxylet ricinusolie, natriumhydroxid, chlorcresol og vand til injektionsvæsker.

Indikationer

Anvendes til forebyggelse og behandling af E-vitaminmangel.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger

Der er i sjældne tilfælde set allergiske reaktioner, disse kan i meget sjældne tilfælde være fatale.
Risikoen øges ved gentagne injektioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger.

Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,
DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Dyrearter

Hest, kvæg, svin eller efter dyrlægens anvisning.

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Vær opmærksom på at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

| | |
|---------------------------|----------|
| Hest, ko, so, gylt, svin: | 10-20 ml |
| Kalv: | 5-10 ml |
| Smågrise: | 5 ml |
| Pattegrise: | 1 ml |

Indsprøjtet i muskulaturen (i.m.) eller under huden (s.c.) som en enkelt dosering.

Oplysninger om korrekt anvendelse

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Tilbageholdelsestid

Mælk: 0 døgn
Slagtning: 0 døgn

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.
Opbevares i køleskab (2°C- 8°C).

Særlige advarsler

Ingen.

Offaldshåndtering

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Dato for seneste ændring af indlægssedlen

Maj 2020