

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

- Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
- Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.
- Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Denne indlægsseddel fortæller:

1. Hvad Protopic er, og hvad det anvendes til
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Protopic
3. Hvordan De anvender Protopic
4. Hvilke mulige bivirkninger Protopic har
5. Hvordan De opbevarer Protopic
6. Yderligere oplysninger

Protopic 0,03% salve

Tacrolimus monohydrat

- Det aktive stof er tacrolimus monohydrat.
Et gram af Protopic 0,03% salve indeholder 0,3 mg tacrolimus (som tacrolimus monohydrat).
- De øvrige indholdsstoffer er hvid vaselin, paraffinolie, propylenkarbonat, hvidt voks og paraffin.

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str. 61, D-81673 München, Tyskland.

Fremstilleren: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irland.

1. HVAD PROTOPIC ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Protopic er en hvid, lidt gullig salve. Den findes i tuber med enten 10, 30 eller 60 gram salve. Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres. Protopic findes i to styrker (Protopic 0,03% og Protopic 0,1% salve). Det aktive indholdsstof, tacrolimus, er et immunomodulerende lægemiddel.

Protopic 0,03% salve benyttes til at behandle moderat til svær atopisk dermatitis (eksem) hos voksne, der ikke responderer tilfredsstillende på eller ikke tåler konventionelle behandlinger og til børn (2 år og ældre), der ikke har responderet tilfredsstillende på konventionel behandling. Ved atopisk dermatitis ses inflammation af huden (kløe, rødme og tørhed) på grund af en overreaktion af hudens immunsystem. Protopic dæmper den unormale hudreaktion og lindrer hudinflammation og kløe.

2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE PROTOPIC

De bør ikke anvende Protopic:

- Hvis De er overfølsom (allergisk) over for tacrolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer i salven eller til macrolide antibiotika (f.eks. azithromycin, clarithromycin, erythromycin).

Vær særlig forsigtig med at anvende Protopic:

- Hvis patienten er yngre end 2 år. Der er ingen erfaring med brug af Protopic til børn under 2 år.
- Virkningen af behandling med Protopic salve på det endnu ikke færdigudviklede immunsystem hos børn, specielt mindre børn, kendes endnu ikke.
- Hvis hudlæsionerne er inficerede. Smør ikke salven på inficerede hudlæsioner.
- Hvis De har nedsat leverfunktion. Tal med lægen før De begynder at bruge Protopic.

- Hvis De har en nedarvet hudbarrierelidelse som f.eks. Netherton's syndrom eller hvis De lider af generaliseret erythrodermi (inflammatorisk rødmen og skoldning over hele kroppen). Tal med lægen før De begynder at bruge Protopic.
- Hvis Deres lymfekirtler bliver hævede under behandling med Protopic skal De tale med lægen.
- Nævn for lægen at De bruger Protopic før De skal vaccineres. Man bør ikke vaccineres under behandling med Protopic og i et vist tidsrum efter behandlingen. For levende afsvækkede vacciner (f.eks. mæslinger, fåresyge, røde hunde eller polio vaccine indtaget gennem munden) er tidsrummet 28 dage, for inaktive vacciner (f.eks. stivkrampe, difteritis, kighoste eller influenza) er tidsrummet 14 dage.
- Undgå at udsætte huden for langvarig solbestråling eller kunstig bestråling som f.eks. solarielys. Hvis De er udendørs efter at have påsmurt Protopic, brug da et solbeskyttelsesmiddel og tag løst tøj på der beskytter huden mod solen. Spørg desuden Deres læge til råds om andre passende solbeskyttelsesmetoder. Hvis De får ordineret lysbehandling skal De oplyse lægen om, at De bruger Protopic og at det frarådes at bruge Protopic og få lysbehandling på samme tid.
- Undgå kontakt med øjne eller slimhinder (i munden og i næsen).

Hvordan man anvender Protopic sammen med mad og drikkevarer:

Når man er i behandling med Protopic, kan indtagelse af alkohol medføre pludselig rødmen (flush) og varme i huden.

Graviditet:

Brug ikke Protopic, hvis De er gravid.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Amning:

Brug ikke Protopic, hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Indtagelse/anvendelse af andre lægemidler og af kosmetik:

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

De kan bruge fugtighedscreme og lotion når De behandles med Protopic, men dette må ikke bruges fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring af Protopic salve.

Brug af Protopic på samme tid som andre hudmidler eller medens De tager kortikosteroider (f.eks. kortison) som kapsler eller tabletter eller lægemidler, der påvirker immunsystemet er ikke undersøgt.

Før en vaccination skal lægen informeres om brug af Protopic (se Afsnittet ”Vær særlig forsigtig med at anvende Protopic”).

3. HVORDAN DE ANVENDER PROTOPIC

Protopic bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Hvis De mener, at virkningerne af salven er for kraftige eller for svage, bør De tale med Deres læge eller apotek herom.

Påsmør Protopic i et tyndt lag på de angrebne hudområder.

Protopic kan anvendes på de fleste områder af kroppen, også i ansigtet og på halsen og på bøjefurene af albuer og knæ.

Undgå at påsmøre salven i næsen, munden eller i øjnene. Hvis der kommer salve på disse områder, skal det tørres af og/eller skylles med vand.

Dæk ikke behandlede områder med forbindinger.

Vask hænder efter påsmøring af Protopic, med mindre hænderne også skal behandles.

Før påsmøring af Protopic salve efter et bad eller brusebad skal man være helt sikker på, at huden er fuldstændig tør.

Børn (2 år gamle og ældre)

Påsmør Protopic salve 2 gange om dagen i op til 3 uger, en gang om morgenen og en gang om aftenen. Derefter skal salven benyttes engang om dagen på de afficerede hudområder indtil eksemen er forsvundet.

Voksne (16 år gamle og ældre)

Der findes 2 styrker Protopic salve (Protopic 0,03% og Protopic 0,1% salve) til brug for voksne patienter. Lægen vil afgøre hvilken styrke, der er bedst for Dem. Sædvanligvis starter man behandlingen med Protopic 0,1% salve 2 gange om dagen, en gang om morgenen og en gang om aftenen indtil eksemen er forsvundet. Hvis symptomerne vender tilbage, skal man genoptage behandling med Protopic 0,1% to gange om dagen. Afhængig af, hvordan Deres eksem reagerer, vil lægen afgøre om hyppigheden af påsmøringer kan reduceres eller den svagere salve, Protopic 0,03% salve, kan benyttes.

Alle angrebne hudområder skal behandles indtil eksemen er forsvunden. Man ser sædvanligvis bedring indenfor den første uge. Hvis De ikke ser bedring efter 2 uger skal De tale med lægen om andre mulige behandlinger. Behandling med Protopic kan gentages, hvis symptomerne kommer igen.

Hvis De ved et uheld kommer til at sluge noget salve:

Hvis De ved en fejltagelse er kommet til at indtage salven, skal De hurtigst muligt kontakte Deres læge eller apoteket. De skal ikke forsøge at fremkalde en opkastning.

Hvis De glemmer at anvende Protopic:

Hvis De glemmer at påsmøre salven på det fastsatte tidspunkt, påsmør salve straks De kommer i tanke om det, og fortsæt behandlingen som tidligere.

4. HVLKE MULIGE BIVIRKNINGER PROTOPIC HAR

Som alle andre lægemidler kan Protopic have bivirkninger.

Omkring halvdelen af de patienter, der bruger Protopic føler en eller anden form for hudirritation, hvor salven er påsmurt. En brændende følelse og kløe er meget almindeligt (> 10%). Disse symptomer er sædvanligvis milde til moderate og forsvinder almindeligvis efter en uges brug af Protopic. Andre almindelige (> 1%) bivirkninger er rødmen, varmekølelse, smerte, øget hudfølsomhed (specielt for kulde og varme), prikken i huden, hududslæt, folliculitis (inflammere eller inficerede hårsække) og herpes virus infektioner (f.eks. forkølelsessår, udbredte herpes simplex infektioner). Hudrødmen (flushing) eller hudirritation er også almindeligt efter indtagelse af alkohol. Acne er en usædvanlig bivirkning. Rosacea og rosacea-lignende dermatitis er også blevet rapporteret.

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom.

5. HVORDAN DE OPBEVARER PROTOPIC

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på tuben og på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch
Erasmus Park/Parc Erasme
Square Marie Curie 50
B-1070 Brüssel/Bruxelles
Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch
Erasmus Park/Parc Erasme
Square Marie Curie 50
B-1070 Brüssel/Bruxelles
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
CZ-18600 Praha 8
Tel: +420 236 080300

Magyarország

Astellas Pharma Kft.
Kelenhegyi út 43
H-1118 Budapest
Tel.: +36 (06)1 3614673

Danmark

Astellas Pharma a/s
Naverland 4
DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 43 430355

Malta

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München
Germanja
Tel: +49 (0)89 454406

Deutschland

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München
Tel: +49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.
Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp
Tel: +31 (0)71 5455745

Eesti

OÜ Sirowa Pharma Trade Tallinn
Salve 2c
EE-11612 Tallinn
Tel: +372 6 830700

Norge

Astellas Pharma
Solbråveien 47
N-1383 Asker
Tlf: +47 6676 4600

Ελλάδα

BIANEE A.E.
Οδός Τατοΐου
GR-146 71 NEA EPYΘΡΑΙΑ
Τηλ: +30 210 8009111

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.
Linzer Straße 221/E02
A-1140 Wien
Tel: +43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.
Paseo del Club Deportivo nº 1
Bloque 14-2^a
E-28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel: +34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o.
ul. Poleczki 21
PL-02-822 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Portugal

Astellas Farma, Lda.

114 rue Victor Hugo
F-92300 Levallois Perret
Tél: +33 (0)1 55917500

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.
25, The Courtyard
Kilcarbery Business Park, Clondalkin
IRL-Dublin 22
Tel: +353 (0)1 4671555

Ísland

Ísfarm
Lyngháls 13
IS-110 Reykjavík
Tel: +354 540 8080

Italia

Astellas Pharma S.p.A.
Via delle Industrie 1
I-20061 Carugate (Milano)
Tel: +39 (0)2 921381

Κύπρος

Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30, Στρόβολος
CY-2003 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 319282

Latvija

AS Sirowa Riga
Katrinas dambis 16
LV-1045 Riga
Tel: +371 7 098 250

Lietuva

UAB Sirowa Vilnius
Švitrigailos g. 11b
LT-03228 Vilnius
Tel. +370 (5) 2394155

Edifício Cinema
Rua José Fontana, n.º1, 1º Andar
P-2770-101 Paço de Arcos
Tel: +351 21 4401320

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.
Wolfova 1
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 2003060

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka
Záborského 29
SK-831 03 Bratislava
Tel: +421 2 4444 2157

Suomi/Finland

Algol Pharma Oy
PL 13
FIN-02611 Espoo/Esbo
Puh/Tel: +358 9 50991

Sverige

Astellas Pharma AB
Haraldsgatan 5
S-41314 Göteborg
Tel: +46 (0)31 7416160

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.
Lovett House
Lovett Road, Staines
Middlesex, TW18 3AZ
Tel: +44 (0) 1784 419615

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 10/2005

INDLÆGSSEDDEL

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

- Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
- Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.
- Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Denne indlægsseddel fortæller:

1. Hvad Protopic er, og hvad det anvendes til
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Protopic
3. Hvordan De anvender Protopic
4. Hvilke mulige bivirkninger Protopic har
5. Hvordan De opbevarer Protopic
6. Yderligere oplysninger

Protopic 0,1% salve

Tacrolimus monohydrat

- Det aktive stof er tacrolimus monohydrat.
Et gram af Protopic 0,1% salve indeholder 1,0 mg tacrolimus (som tacrolimus monohydrat).
- De øvrige indholdsstoffer er hvid vaselin, paraffinolie, propylenkarbonat, hvidt voks og paraffin.

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str. 61, D-81673 München, Tyskland.

Fremstilleren: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irland.

1. HVAD PROTOPIC ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Protopic er en hvid, lidt gullig salve. Den findes i tuber med enten 10, 30 eller 60 gram salve. Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres. Protopic findes i to styrker (Protopic 0,03% og Protopic 0,1% salve). Det aktive indholdsstof, tacrolimus, er et immunomodulerende lægemiddel.

Protopic 0,1% salve benyttes til at behandle moderat til svær atopisk dermatitis (eksem) hos voksne, der ikke responderer tilfredsstillende på eller ikke tåler konventionelle behandlinger. Ved atopisk dermatitis ses inflammation af huden (kløe, rødme og tørhed) på grund af en overreaktion af hudens immunsystem. Protopic dæmper den unormale hudreaktion og lindrer hudinflammation og kløe.

2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE PROTOPIC

De bør ikke anvende Protopic:

- Hvis De er overfølsom (allergisk) over for tacrolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer i salven eller til macrolide antibiotika (f.eks. azithromycin, clarithromycin, erythromycin).

Vær særlig forsigtig med at anvende Protopic:

- Hvis patienten er yngre end 2 år. Der er ingen erfaring med brug af Protopic til børn under 2 år.
- Hvis hudlæsionerne er inficerede. Smør ikke salven på inficerede hudlæsioner.
- Hvis De har nedsat leverfunktion. Tal med lægen før De begynder at bruge Protopic.
- Hvis De har en nedarvet hudbarrierelidelse som f.eks. Netherton's syndrom eller hvis De lider af generaliseret erythrodermi (inflammatorisk rødmen og skoldning over hele kroppen). Tal med lægen før De begynder at bruge Protopic.

- Hvis Deres lymfekirtler bliver hævede under behandling med Protopic skal De tale med lægen.
- Nævn for lægen at De bruger Protopic før De skal vaccineres. Man bør ikke vaccineres under behandling med Protopic og i et vist tidsrum efter behandlingen. For levende afsvækkede vacciner (f.eks. mæslinger, fåresyge, røde hunde eller polio vaccine indtaget gennem munden) er tidsrummet 28 dage, for inaktive vacciner (f.eks. stivkrampe, difteritis, kighoste eller influenza) er tidsrummet 14 dage.
- Undgå at udsætte huden for langvarig solbestråling eller kunstig bestråling som f.eks. solarielys. Hvis De er udendørs efter at have påsmurt Protopic, brug da et solbeskyttelsesmiddel og tag løst tøj på der beskytter huden mod solen. Spørg desuden Deres læge til råds om andre passende solbeskyttelsesmetoder. Hvis De får ordineret lysbehandling skal De oplyse lægen om, at De bruger Protopic og at det frarådes at bruge Protopic og få lysbehandling på samme tid.
- Undgå kontakt med øjne eller slimhinder (i munden og i næsen).

Hvordan man anvender Protopic sammen med mad og drikkevarer:

Når man er i behandling med Protopic, kan indtagelse af alkohol medføre pludselig rødmen (flush) og varme i huden.

Graviditet:

Brug ikke Protopic, hvis De er gravid.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Amning:

Brug ikke Protopic, hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Indtagelse/anvendelse af andre lægemidler og af kosmetik:

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

De kan bruge fugtighedscreme og lotion når De behandles med Protopic, men dette må ikke bruges fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring af Protopic salve.

Brug af Protopic på samme tid som andre hudmidler eller medens De tager kortikosteroider (f.eks. kortison) som kapsler eller tabletter eller lægemidler, der påvirker immunsystemet er ikke undersøgt.

Før en vaccination skal lægen informeres om brug af Protopic (se Afsnittet ”Vær særlig forsigtig med at anvende Protopic”).

3. HVORDAN DE ANVENDER PROTOPIC

Protopic bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Hvis De mener, at virkningerne af salven er for kraftige eller for svage, bør De tale med Deres læge eller apotek herom.

Påsmør Protopic i et tyndt lag på de angrebne hudområder.

Protopic kan anvendes på de fleste områder af kroppen, også i ansigtet og på halsen og på bøjefurene af albuer og knæ.

Undgå at påsmøre salven i næsen, munden eller i øjnene. Hvis der kommer salve på disse områder, skal det tørres af og/eller skylles med vand.

Dæk ikke behandlede områder med forbindinger.

Vask hænder efter påsmøring af Protopic, med mindre hænderne også skal behandles.

Før påsmøring af Protopic salve efter et bad eller brusebad skal man være helt sikker på, at huden er fuldstændig tør.

Der findes 2 styrker Protopic salve (Protopic 0,03% og Protopic 0,1% salve) til brug for voksne patienter (16 år gamle eller ældre). Lægen vil afgøre hvilken styrke, der er bedst for Dem. Sædvanligvis starter man behandlingen med Protopic 0,1% salve 2 gange om dagen, en gang om morgenen og en gang om aftenen indtil eksemen er forsvundet. Hvis symptomerne vender tilbage, skal man genoptage behandling med Protopic 0,1% to gange om dagen. Afhængig af, hvordan Deres eksem reagerer, vil lægen afgøre om hyppigheden af påsmøringer kan reduceres eller den svagere salve, Protopic 0,03% salve, kan benyttes.

Alle angrebne hudområder skal behandles indtil eksemen er forsvunden. Man ser sædvanligvis bedring indenfor den første uge. Hvis De ikke ser bedring efter 2 uger skal De tale med lægen om andre mulige behandlinger. Behandling med Protopic kan gentages, hvis symptomerne kommer igen.

Hvis De ved et uheld kommer til at sluge noget salve:

Hvis De ved en fejltagelse er kommet til at indtage salven, skal De hurtigst muligt kontakte Deres læge eller apoteket. De skal ikke forsøge at fremkalde en opkastning.

Hvis De glemmer at anvende Protopic:

Hvis De glemmer at påsmøre salven på det fastsatte tidspunkt, påsmør salve straks De kommer i tanke om det, og fortsæt behandlingen som tidligere.

4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER PROTOPIC HAR

Som alle andre lægemidler kan Protopic have bivirkninger.

Omkring halvdelen af de patienter, der bruger Protopic føler en eller anden form for hudirritation, hvor salven er påsmurt. En brændende følelse og kløe er meget almindeligt (> 10%). Disse symptomer er sædvanligvis milde til moderate og forsvinder almindeligvis efter en uges brug af Protopic. Andre almindelige (> 1%) bivirkninger er rødmen, varmekølelse, smerte, øget hudfølsomhed (specielt for kulde og varme), prikken i huden, hududslæt, folliculitis (inflammerede eller inficerede hårsække) og herpes virus infektioner (f.eks. forkølelssår, udbredte herpes simplex infektioner). Hudrødmen (flushing) eller hudirritation er også almindeligt efter indtagelse af alkohol. Acne er en usædvanlig bivirkning. Rosacea og rosacea-lignende dermatitis er også blevet rapporteret.

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom.

5. HVORDAN DE OPBEVARER PROTOPIC

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på tuben og på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien
Astellas Pharma B.V. Branch

Luxembourg/Luxemburg
Astellas Pharma B.V. Branch

Erasmus Park/Parc Erasme
Square Marie Curie 50
B-1070 Brüssel/Bruxelles
Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
CZ-18600 Praha 8
Tel: +420 236 080300

Danmark

Astellas Pharma a/s
Naverland 4
DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 43 430355

Deutschland

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München
Tel: +49 (0)89 454401

Eesti

OÜ Sirowa Pharma Trade Tallinn
Salve 2c
EE-11612 Tallinn
Tel: +372 6 830700

Ελλάδα

BIANEE A.E.
Οδός Τατοΐου
GR-146 71 NEA EPYΘPAIA
Τηλ: +30 210 8009111

España

Astellas Pharma S.A.
Paseo del Club Deportivo nº 1
Bloque 14-2^a
E-28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel: +34 91 4952700

France

Astellas Pharma S.A.S.
114 rue Victor Hugo
F-92300 Levallois Perret
Tél: +33 (0)1 55917500

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.
25, The Courtyard
Kilcarbery Business Park, Clondalkin

Erasmus Park/Parc Erasme
Square Marie Curie 50
B-1070 Brüssel/Bruxelles
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 (0)2 5580737

Magyarország

Astellas Pharma Kft.
Kelenhegyi út 43
H-1118 Budapest
Tel.: +36 (06)1 3614673

Malta

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München
Germanja
Tel: +49 (0)89 454406

Nederland

Astellas Pharma B.V.
Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp
Tel: +31 (0)71 5455745

Norge

Astellas Pharma
Solbråveien 47
N-1383 Asker
Tlf: +47 6676 4600

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.
Linzer Straße 221/E02
A-1140 Wien
Tel: +43 (0)1 8772668

Polska

Astellas Pharma Sp.z o.o.
ul. Poleczki 21
PL-02-822 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 225451 111

Portugal

Astellas Farma, Lda.
Edifício Cinema
Rua José Fontana, n.º1, 1º Andar
P-2770-101 Paço de Arcos
Tel: +351 21 4401320

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.
Wolfova 1
SI-1000 Ljubljana

IRL-Dublin 22
Tel: +353 (0)1 4671555

Tel: +386 1 2003060

Ísland

Ísfarm
Lynghåls 13
IS-110 Reykjavík
Tel: +354 540 8080

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka
Záborského 29
SK-831 03 Bratislava
Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.
Via delle Industrie 1
I-20061 Carugate (Milano)
Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Algol Pharma Oy
PL 13
FIN-02611 Espoo/Esbo
Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30, Στρόβολος
CY-2003 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 319282

Sverige

Astellas Pharma AB
Haraldsgatan 5
S-41314 Göteborg
Tel: +46 (0)31 7416160

Latvija

AS Sirowa Riga
Katrinas dambis 16
LV-1045 Riga
Tel: +371 7 098 250

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.
Lovett House
Lovett Road, Staines
Middlesex, TW18 3AZ
Tel: +44 (0) 1784 419615

Lietuva

UAB Sirowa Vilnius
Švitrigailos g. 11b
LT-03228 Vilnius
Tel. +370 (5) 2394155

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 10/2005