

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flemoxin Solutab 125 mg, 250 mg, 500 mg og 750 mg opløselige tabletter Amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Lægen har ordineret Flemoxin Solutab til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptome, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Flemoxin Solutab
3. Sådan skal De tage Flemoxin Solutab
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Flemoxin Solutab indeholder et antibiotikum af penicillintypen.
- Flemoxin Solutab virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.
- De kan få Flemoxin Solutab mod f.eks. mellemørebetændelse eller urinvejsinfektioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE FLEMOXIN SOLUTAB

Tag ikke Flemoxin Solutab hvis:

- De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof amoxicillin eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Flemoxin Solutab.
- De er overfølsom (allergisk) over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamer).

Vær ekstra forsigtig med at tage Flemoxin Solutab, hvis De:

- har mononukleose (kyssesygge).
- har en bestemt type blodkræft (lymfatisk leukæmi).
- har stærkt nedsat nyrefunktion.
- har allergi.
- er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner og penicillin).

Tal med Deres læge, inden De tager Flemoxin Solutab, hvis noget af ovenstående gælder for Dem.

Kontakt straks lægen, hvis De får:

- voldsom eller langvarig, blodig diaré, når De bruger eller har brugt Flemoxin Solutab. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse.
- pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal De straks ringe 112. Kan være livsfarligt.

Brug af anden medicin

Tal med lægen, hvis De tager:

- anden medicin mod infektioner (kloramfenikol, tetracyclin, makrolider, aminoglykosider).
- medicin mod psoriasis, leddegigt og visse kræftformer (methotrexat).
- medicin mod urinsur gigt (allopurinol, probenecid).
- p-piller, da Flemoxin Solutab kan nedsætte virkningen.
- medicin mod smerter (acetylsalicylsyre, indometacin, phenylbutazon).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin som er købt i udlandet, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Flemoxin Solutab sammen med mad og drikke

De kan tage Flemoxin Solutab sammen med mad og drikke.

Graviditet og Amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De kan tage Flemoxin Solutab under graviditet.

Amning:

De kan amme, selvom De tager Flemoxin Solutab.

Flemoxin Solutab bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flemoxin Solutab påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE FLEMOXIN SOLUTAB

Tag altid Flemoxin Solutab nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sedvanlige dosis er:

Voksne:

Flemoxin Solutab, opløselige tabletter, 125 mg:

3-6 tabletter på 125 mg (i alt 375-750 mg) 2 gange daglig.

Flemoxin Solutab, opløselige tabletter, 250 mg:

2-3 tabletter på 250 mg (i alt 500-750 mg) 2 gange daglig.

Flemoxin Solutab, opløselige tabletter, 500 mg:

1 tablet på 500 mg 2 gange daglig.

Flemoxin Solutab, opløselige tabletter, 750 mg:

1 tablet på 750 mg 2 gange daglig.

Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.

Akut blærebetændelse:

3000 mg som engangsdosis.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt og mindste dosis vil normalt være 1 tablet på 125 mg 2 gange daglig. Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. De kan normalt ikke bruge Flemoxin Solutab, opløselige tabletter, til børn under 5 kg. Børn under 3 år bør indtage tabletten i opløst form. Syge børn har ofte svært ved at synke tabletter.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan her være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Brugsanvisning

De kan tage Flemoxin Solutab opløselige tabletter på 2 måder:

1. De kan synke tabletten hel eller delt sammen med et glas vand. De bør kun dele tabletten for at gøre den lettere at synke, ikke for at halvere dosis.
2. De kan opløse tabletterne i vand, som De kan drikke efter grundig omrøring:

125 mg skal De opløse i mindst 1 teskefuld vand.

250 mg skal De opløse i mindst 1 barneskefuld vand.

500 mg skal De opløse i mindst en kvart kop vand.

750 mg skal De opløse i mindst en kvart kop vand.

Når De har opløst Flemoxin Solutab i vand, kan De blande opløsningen i juice, saftvand, mælk, modernælk eller yoghurt.

De skal drikke blandingen umiddelbart efter omrøring.

Det er vigtigt, at De indtager hele blandingen.

Hvis De har taget for mange Flemoxin Solutab

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Flemoxin Solutab, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diaré, bevidsthedsændring, forstyrrelser i saltbalancen, muskeltrækninger, krampeanfald, dyb bevidstløshed (koma), blodmangel med gulsot og nyresvigt.

Hvis De glemmer at tage Flemoxin Solutab

Hvis De er kommet til at springe en dosis over, fortsætter De bare med den næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Flemoxin Solutab

Det er vigtigt, at De fuldfører tabletkuren som ordineret af lægen. Kontakt lægen, hvis De ønsker at stoppe behandlingen. Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Flemoxin Solutab kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelig (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber (agranulocytose). Søg straks læge.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (trombocytopeni). Søg straks læge.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Søg straks læge.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Svær, langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber. Kontakt lægen.

Sjældne – meget sjældne (sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Kvalme, diaré, opkastninger, fordøjelsesbesvær, ubehag i mellemgulvet.
- Udslæt.

Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kløe i endetarmsåbning, nældefeber, ledsmerter, feber.

Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Udvikling af en ny infektion (superinfektion).

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt i ansigtet, på arme og ben samt feber.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Krystaller i urinen, som kan forårsage nyresvigt.

Flemoxin Solutab kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. forandringer i blodet (eosinofili) og et forøget antal blodplader.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares over 30 °C.
- Brug ikke Flemoxin Solutab efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flemoxin Solutab indeholder:

- Aktivt stof: amoxicillin som amoxicillintrihydrat.

- Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, opløselig cellulose, crospovidon, citron-aroma, mandarinaroma PO 0551, vanillin, saccharin og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelserUdseende:

Hvid oval tablet med en delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser:

14 og 20 tabletter i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillerIndehaver af markedsføringstilladelsen:

Astellas Pharma a/s

Naverland 4

2600 Glostrup

Danmark

Fremstiller:

Astellas Pharma Europe B.V.

P.O. Box 108

2350 AC Leiderdorp

Holland

Denne indlægsseddel blev revideret marts 2009