

Myyntiluvun haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Ranska
Jokainen paikallisvaleluuksiin sisältää

FI

Koiran paino	Pipelin korkin väri	Tilavuus (ml)	Dinotefuraani (mg)	Pyriproksifeeni (mg)	Permetriini (mg)
1,5 - 4 kg	keltainen	0,8	44	3,9	317
> 4 - 10 kg	siniyhreä	1,6	87	7,7	635
> 10 - 25 kg	sininen	3,6	196	17,4	1429
> 25 - 40 kg	violetti	4,7	256	22,7	1865
> 40 kg	punaista	8,0	436	38,7	3175

ELÄINLÄKEVALMISTEEN NIMI

Vectra® 3D paikallisvaleluuksiin koirille 1,5 – 4 kg

Vectra® 3D paikallisvaleluuksiin koirille > 4 – 10 kg

Vectra® 3D paikallisvaleluuksiin koirille > 10 – 25 kg

Vectra® 3D paikallisvaleluuksiin koirille > 25 – 40 kg

Vectra® 3D paikallisvaleluuksiin koirille > 40 kg

dinotefuraani / pyriproksifeeni / permetriini

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 millilitri sisältää 54 mg dinotefuraania,

4,84 mg pyriproksifeenia ja 397 mg permetriinia

Eläinlääkevalmiste on vaaleankeltaista paikallisvaleluuksiin, joka on pakattu kerta-annoksina paikallisvaleluuksiin.

KÄYTTÖAIHEET: Kirput: Tämä eläinlääkevalmiste tappaa kirppuja tartunnan saaneissa eläimissä ja ennaltaehkäisee tartuntoja yhden kuukauden ajan. Sillä on tehoa koirilla esintyviä *Ctenocephalides canis* ja *Ctenocephalides felis*-kirppuja vastaan. Estää kirppujen lisääntymisen kahden kuukauden ajan annostelusta estämällä munien kuoriutumisen (ovisidinen vaikutus) sekä kehitysmisen alkusuodatusta.

Puutaiset: Tämä eläinlääkevalmiste tappaa ja karkottaa puutaisia (vaikutus kestää *Rhipicephalus sanguineus* ja *Ixodes ricinus*-puutaisia vastaan kuukauden ajan) ja *Dermacentor reticulatus*-puutaisia vastaan kolmen viikon ajan). Jos koirassa on puutaisia eläinlääkevalmisteen annostelun aikaan, kaikki puutaiset eivät välttämättä kuole 48 tunnin kuluessa annostelusta, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Näiden puutaisien poistamisessa on suositeltavaa käyttää asianmukaista puutiaisen poiston tarkoitettua välinettä.

Hietasäksät, hytyset ja pistokärpäset: Tämä eläinlääkevalmiste karkottaa (pistoja estää vaikutus) lentäviä hyönteisiä, kuten hietasäksää (*Phlebotomus perniciosus*), hytysiä (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) ja pistokärpää (*Stomoxys calcitrans*) yhden kuukauden ajan annostelusta. Valmiste myös tappaa hytysiä (*Aedes aegypti*) ja pistokärpää yhden kuukauden ajan.

VASTA-AIHEET: Ei saa käyttää kissolle (katso "Erityisvaroitusset"). Eläinlääkevalmiste ei saa käyttää kissolle, sillä kissat eivät pysty poikkeavaan aineenvaihduntaan takia metaboloiman permetriinin (yksi eläinlääkevalmisteenvaihtava aineesta). Eläinlääkevalmiste voi aiheuttaa vakavia haittoja, jos sitä annostellaan kissalle tai kissa saa eläinlääkevalmisteesta suurhunsa äskettäin käsittää eläintä koiraan. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esintyy liherykkyyttä vaikuttavilla aineilla tai apuaineilla.

HAITTAVAIKUTUKSET: Annostuskohdan ohimenevä punotusta, kutina ja muuta epämukavuuteen viittaavia oireita on raportoitu harvoissa tapauksissa ja nämä yleensä häviävät itsestään 24 tunnin kuluessa lääkevalmisteen annostelusta. Käytöshäiriötä, kuten ylivirkkautta, äänetylyt tai ahdistusta, yleisointia, kuten unelaisuutta tai ruokahalutonmuutta ja hermostolisia oireita kuten lisahapsina, on raportoitu harvoissa tapauksissa. Ruuanalustukanavan oireita, kuten oksentelua tai ripulua on myös kuvattu annostuskohdassa hyvin harvoin. Ohimenevä kosmeettisia vaikutuksia (koesta ulkonäkö, karvojen ilmanteruminen hoitoissa ja jäämät) on kuvattu annostuskohdassa hyvin harvoin ja ne eivät yleensä ole enää havaittavissa 48 tunnin kuluttua annostelusta.

Haittavaikutusten esintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 100 hoidettua eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkauslosteessä, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJIT:

Koirat.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAI:

Paikallisvaleluun paikallisesti. Käytetään vain terveelle (vahingoittumattomalle) koiran iholle.

Annotus: Määritä koiralesi sopivan kokoinen paikallisvaleluuksiin (käytööön alle 7 viikon ikäisillä koiranpennulla tai alle 1,5 kg painoisilla koirilla ei ole suositeltu). Katso myös kohta "Erityisvaroitusset". Alhaisin suositeltu annos on 6,4 mg dinotefuraania/kg, 0,6 mg pyriproksifeenia/kg ja 46,6 mg permetriiniä/kg, mikä vastaa 0,12 ml eläinlääkevalmisteista painokiloa kohden.

Sopiva paikallisvaleluuksiin valitaan koiran painon mukaan seuraavasti:

ANNOSTUSOHJEET


Annostusohje: Käytöööhö:

Poista paikallisvaleluuksiin pakkauksesta.



Vaihe 1:

Pidä kaadinta pystysuorassa asennossa, sormien ote suuremmien levyn alla.



Vaihe 2:

Paina toisella kädellä pienempiä levyä, kunnes levyt kohtaavat. Tällöin sinetti rikkoutuu.



Vaihe 3:

Koiran tulisi seisäti olla mukavassa asennossa annostuksen helpottamiseksi. Tee turkkia jakaus, jotta saat ihon esin. Annostelee eläinlääkevalmiste (vaiheessa 4 kuvatulla tavalla) huistaati kaatimen kärjistä iholle.

Vaihe 4: Toimi joko kohdan 4a tai 4b suoitusken mukaisesti:

4a suosisut: Purista kaadinta kevyesti ja annostelee eläinlääkevalmisteesta koiran iholle selän alueelle kunnes kaadint on tyhjä. Aloita lapojen välisistä noudattaa oheisissa kuvissa osoitettuja annostelukohtia ja järjestystä. Vältä valmisteen annostelua pinnalliseksi koiran turkkiin. Annostelukohtien määrä riippuu koiran painosta.

Koira, joka painavat 1,5-4 kg

TAI

4b suoitus: Koiran painosta riippumatta ja koiran hänen tyven alueen turki ja kaukelle käytäen kaatimen kärkeä apuna ja annostelee eläinlääkevalmisteesta suoraan iholle selän keskilinjalla pitkin jatkuvana linjana lapon välini saakka kunnes kaadint on tyhjä.

Annostelutoihes: Yhden annostelukerran vaikuttus kestää yhden kuukauden ajan. Annostelu voidaan toistaa kerran kuukaudessa.

Koira, joka painavat yli 4 kg aina 10 kg saakka.

1

2

3

4

Koira, joka painavat yli 10 kg aina 40 kg saakka.

1

3

2

Yli 40 kg painavat koirat.

1

4

3

2

VAROAIKA: Ei oleellinen.

SÄILYTYSTOSLOSUHTEET: Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Älä käytä eläinlääkevalmisteesta viimeisen käytöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa ja paikallisvaleluuksiimessa (EXP) jälkeen. Eräintypäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISVAROITUSET: **Erityisvaroituksien kohde-eläinlajeitaan:** Kaikki saman talouden koirat tulisi käsitellä samaanikäisesti. Talouden kissat hoidetaan koirille hyväksyttyä valmisteella. Kirput leväävät koiran makuualustaan ja lepoaikoihin, kuten mattoihin ja pehmustettuihin kalusteisiin. Voimakkaan turvallisuutta ei ole tutkittu alle 7 viikon ikäisillä koiranpennulla tai alle 1,5 kg painoisilla koirilla. Varmista, ettei kissa nuole koiran annostelukohtaa. Tällaisen altistuksen tapahtuessa käänny välittömästi eläinlääkärin puoleen. Kissat on syytä pitää eroossa käsiltästä valmisteesta olosuhteissa voida täysin estää. Eläinlääkevalmiste säilyttää tehonsa vaikka hoidettu eläin kastuu (esim. uiminen, pesu) valmisteen valkuutusasteen. Vilkkaittainen kastuminen kuukauden ajan, alkaen 48 tunnin annostelusta, muukaan lukien shampoopus 2 viikon kuluttua annostelusta, eivät valkutu valmisteeseen. Mikäli koiraa pestää toistuvasti shampooilla tai koira kastuu 48 tunnin kuluessa annostelusta, voi valmisteeseen vaikuttavien aineiden (dinotefuraania, permetriiniä tai pyriproksifeenia) toksisuista valkuutusasteesta tälläkin kohdalla. Eläinlääkevalmisteeseen apuaanetta on osoitettu aiheuttavan synnynnäisen epämoodustuman laboratorioihin, terveellä seitsemän viikon ikäisillä koiranpennulla ja hevosen turvallisuus on osoitettu.

ERITYISVAROITUSET, jota ei sovelleta: Älä käytä eläinlääkevalmisteesta turvallisuusasteesta riippuen. Erikoisvaroituksien kohde-eläinlajeitaan: Kaikki saman talouden koirat tulisi käsitellä samaanikäisesti. Talouden kissat hoidetaan koirille hyväksyttyä valmisteella. Kirput leväävät koiran makuualustaan ja lepoaikoihin, kuten mattoihin ja pehmustettuihin kalusteisiin. Voimakkaan turvallisuutta ei ole tutkittu alle 7 viikon ikäisillä koiranpennulla tai alle 1,5 kg painoisilla koirilla. Varmista, ettei kissa nuole koiran annostelukohtaa. Tällaisen altistuksen tapahtuessa käänny välittömästi eläinlääkärin puoleen. Kissat on syytä pitää eroossa käsiltästä valmisteesta olosuhteissa voida täysin estää. Eläinlääkevalmiste säilyttää tehonsa vaikka hoidettu eläin kastuu (esim. uiminen, pesu) valmisteen valkuutusasteen. Vilkkaittainen kastuminen kuukauden ajan, alkaen 48 tunnin annostelusta, muukaan lukien shampoopus 2 viikon kuluttua annostelusta, eivät valkutu valmisteeseen. Mikäli koiraa pestää toistuvasti shampooilla tai koira kastuu 48 tunnin kuluessa annostelusta, voi valmisteeseen vaikuttavien aineiden (dinotefuraania, permetriiniä tai pyriproksifeenia) toksisuista valkuutusasteesta tälläkin kohdalla. Eläinlääkevalmisteeseen apuaanetta on osoitettu aiheuttavan synnynnäisen epämoodustuman laboratorioihin, terveellä seitsemän viikon ikäisillä koiranpennulla ja hevosen turvallisuus on osoitettu.

ERITYISVAROITUSET, jota ei sovelleta: Älä käytä eläinlääkevalmisteesta turvallisuusasteesta riippuen. Erikoisvaroituksien kohde-eläinlajeitaan: Kaikki saman talouden koirat tulisi käsitellä samaanikäisesti. Talouden kissat hoidetaan koirille hyväksyttyä valmisteella. Kirput leväävät koiran makuualustaan ja lepoaikoihin, kuten mattoihin ja pehmustettuihin kalusteisiin. Voimakkaan turvallisuutta ei ole tutkittu alle 7 viikon ikäisillä koiranpennulla tai alle 1,5 kg painoisilla koirilla. Varmista, ettei kissa nuole koiran annostelukohtaa. Tällaisen altistuksen tapahtuessa käänny välittömästi eläinlääkärin puoleen. Kissat on syytä pitää eroossa käsiltästä valmisteesta olosuhteissa voida täysin estää. Eläinlääkevalmiste säilyttää tehonsa vaikka hoidettu eläin kastuu (esim. uiminen, pesu) valmisteen valkuutusasteen. Vilkkaittainen kastuminen kuukauden ajan, alkaen 48 tunnin annostelusta, muukaan lukien shampoopus 2 viikon kuluttua annostelusta, eivät valkutu valmisteeseen. Mikäli koiraa pestää toistuvasti shampooilla tai koira kastuu 48 tunnin kuluessa annostelusta, voi valmisteeseen vaikuttavien aineiden (dinotefuraania, permetriiniä tai pyriproksifeenia) toksisuista valkuutusasteesta tälläkin kohdalla. Eläinlääkevalmisteeseen apuaanetta on osoitettu aiheuttavan synnynnäisen epämoodustuman laboratorioihin, terveellä seitsemän viikon ikäisillä koiranpennulla ja hevosen turvallisuus on osoitettu.

ERITYISVAROITIMET KÄYTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI: Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Tämä eläinlääkevalmiste ei saa joutua vahingottaa kaloihin ja vesistöihin.

KÄYTÄMÄTTÖMÄT ELÄINLÄKEVALMISTEET: Käytämättömät eläinlääkevalmisteet ovat jättemateriaaleissa annostelutavalla. Vältä valmisteen annostelua pinnalliseksi koiran turkkiin. Annostelukohtien määrä riippuu koiran painosta.

MUUT TIEDOT: Pakkauskoot: Pahvikotelot, jossa I, 3, 4, 6, 12, 24 tai 48 paikallisvaleluuksiin 0,8 ml, 1,6 ml, 3,6 ml, 4,7 ml tai 8,0 ml.

Kaikkia pakkauskojia ei välttämättä ole markkinoinut.

Toimintamekanismi: Eläinlääkevalmisteen kolme valkutusta annettalevat koiran kehon pinnalle ensimmäisen vuorokauden kuluessa annostelusta, ja ne pysyvät kehon pinnalla 1 kuukauden ajan. Vaikuttavat aineet valkutat suoraan lemmikin turkissa, eläinten turvalla annostelutavalla. Vaikuttavat aineet hajoavat koiran kehon pinnalla 1 kuukauden ajan.

Fästingar: Dettä lääkemedeli dödar ja stöter bort fästingar (*Rhipicephalus sanguineus</i*

Indehaver af markedsføringstilladelserne og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Ceva Santé Animale - 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - Frankrig

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectra® 3D spot-on-oplosning til hunde 1,5-4 kg

Vectra® 3D spot-on-oplosning til hunde > 4-10 kg

Vectra® 3D spot-on-oplosning til hunde > 10-25 kg

Vectra® 3D spot-on-oplosning til hunde > 25-40 kg

Vectra® 3D spot-on-oplosning til hunde > 40 kg

dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin

ANGIVELSE AF DÉ(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSTOSSLER

Hver ml indeholder 54 mg dinotefuran, 4,84 mg pyriproxyfen, og 397 mg permethrin.

Veterinærægemidlet er en bleguglig spot-on-oplosning pakket i spot-on-applikatorer med enkeltdosser.

INDIKATIONER: Lopper: Dette veterinærægemiddel dræber lopper på infesterede dyr og forhindrer yderligere infestation i en måned. Det er effektivt mod loppearterne Ctenocephalides felis og Ctenocephalides canis, som findes på hunde. Behandlingen forhindrer loppeinfestation i en måned. Veterinærægemidlet forhindrer ligedeles opformeringen af lopper ved hæmning af ægklækningen (ovicidal aktivitet) og ved at hæmme fremkomsten af voksne individer fra de æg, der allerede måtte være lagt af voksne lopper (larvicidal aktivitet).

Flåter: Dette veterinærægemiddel dræber og afskrækker flåter (*Rhipicephalus sanguineus* og *Ixodes ricinus*) i en måned, og *Dermacentor reticulatus* i op til tre uger. Hvis hunden er angrebet af flåter, når veterinærægemidlet påføres, dræbes alle flåterne muligvis ikke inden for første 48 timer – men sandsynligvis inden for en uge. Det anbefales at fjerne disse flåter ved hjælp af et passende flåtfjernelsesredskab.

Sandfluer, myg og stikkfluer: Veterinærægemidlet forhindrer flyvende insekter og sandfluer i at bide (repellerende effekt). Behandlingen forhindrer bid fra sandfluer (*Phlebotomus perniciosus*), myg (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) og fra stikkfluer (*Stomoxys calcitrans*) i en måned efter applikation. Behandlingen dræber også myg (*Aedes aegypti*) og stikkfluer (*Stomoxys calcitrans*) i en måned efter applikation.

KONTRAINDIKATIONER: Må ikke anvendes til kat (se "Særlige forsigtighedsregler"). Pga. kattens unikke fysiologi og manglende evne til at metabolisere permethrin (et af de aktive stoffer i dette veterinærægemiddel) må dette veterinærægemiddel ikke anvendes til kat. Hvis veterinærægemidlet påføres en kat eller hvis katten aktivt indtager det ved at slikke på nyligt behandlet hund, kan dette veterinærægemiddel medføre meget alvorlige bivirkninger. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogen af de aktive stoffer eller hjælpestoffer.

BIVIRKNINGER: Forbigitte rødme, kløe og andre symptomer på ubehag på applikationsstedet er rapporteret i sjeldne tilfælde og forsvinder sædvanligvis spontant inden for et døgn efter administration af veterinærægemidlet. Adfærdstyper bl.a. hyperaktivitet, vokalisering og frygt; systemiske tegn som sløvhed eller anoreksi samt neurologiske symptomer som muskelsitren, er blevet rapporteret i sjeldne tilfælde. Tegn på ataksi såsom usikre bevægelser er blevet rapporteret i meget sjeldne tilfælde. Gastrointestinale (mave og tarm) bivirkninger som opkast og diarré er ligedeles meget sjældent rapporteret. Forbigående kosmetiske gener (vådt udseende, tjævet pels og aflejringer) på applikationsstedet er meget sjældent rapporteret, og disse gener er sædvanligvis ikke synlige efter to døgn.

Hypophysen af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjeldne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægseddelen eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

DYRARTER: Hund


DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INGDIVELSESVEJ(E):

Spot-on-anvendelse. Vær omhyggelig med kun at påføre veterinærægemidlet på intakt (ubeskadiget) hud hos hunden. Bestem hvilken applikatorstørrelse der er korrekt i forhold til din hund (brug hos hunde yngre end 7 uger eller som vejer under 1,5 kg anbefales ikke, se også afsnittet "Særlige advarsler"). Dosering: Den anbefalede minimumsdosis er 6,4 mg dinotefuran/kg lgv, 0,6 mg pyriproxyfen/kg lgv og 46,6 mg permethrin/kg lgv svarende til 0,12 ml af veterinærægemiddlet pr kg lgv. Nedenstående skema viser størrelsen af spot-on-applikator, der skal bruges i forhold til hundens vægt.


OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Sådan påfører produktet:

Dosering: Tag spot-on-applikatoren ud af pakken.



Trin 1: Hold applikatoren lodret og placér fingrene under den store skive som vist.



Trin 2: Med den anden hånd presses den lille skive nedad, indtil de to skiver når sammen. Dette vil gennembrude forseglingen



Trin 3: For at lette applikationen skal hunden stå i en behagelig position. Lav en skålning i hæret, indtil huden er synlig. Påfør veterinærægemiddlet (som vist i trin 4 nedenfor) langsomt og med applikatorspidsen mod huden.

Trin 4: Anvendelse ifølge 4a- eller 4b-anfalingen:

4a-anbefalinger: Tryk forsigtigt på applikatoren og påfør veterinærægemidlet på huden langs hundens hals. Begynd mellem skulderbladene og tryk indtil applikationsstedet er tom på det antal steder og i den rækkefølge, som vises på illustrationerne nedenfor. Antallet af applikationssteder afhænger af hundens kropsvejt.

4b-anbefalinger: Uanset hundens legemsvejt laves med applikatorspidsen en skålning ved halebasis og veterinærægemidlet påføres direkte på huden i en ubrudt linje fra halebasis til midt på ryggen og hele vejen op til skulderbladene som vist på illustrationen. Applikatoren trykkes sammen til den er tom.

Behandlingsplan:

Veterinærægemidlet vil efter en enkelt administration forhindre infestation i en måned. Behandling kan gentages månedligt.

TILBAKEHOLDELSESTID: Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette veterinærægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke dette veterinærægemiddel efter den udløpsdato, der står på den ydre emballage og på spot-on-applikatoren (etter "EXP"). Udløpsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

SÆRLIGE ADVARSLER: Særlige advarsler for hver dyreart: Alle husstandens hunde bør behandles. Husstandens katte bør kun behandles med et veterinærægemiddel, der er godkendt til bruk hos katte. Lopper kan infestere hundens kurv, underlag og sædvanlige opholdssteder som gulvtæpper og bløde møbler. I tilfælde af en omfattende loppeinfestation bør disse områder - som led i indledende bekæmpelsesforanstaltninger - behandles med et passende insekticid og støvsuges regelmæssigt. I tilfælde af mistanke om dermatitis (kløe og hudirritation), søges dyrlægehjælp. Må ikke anvendes til kat. Hvis veterinærægemiddlet utiligtet indtages gennem munnen af katte, kan det udlede fatale kræmer hos katte. I tilfælde af utiligtet indtakelse af eksponeringer skal katten vaskes med shampoo eller sæbe, og der skal omgående tages kontakt til dyrlæge. For at forhindre katte i utiligtet at blive eksponeret for veterinærægemiddlet skal katte holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre, at katten ikke slikker på applikationsstedet på den behandlede hund. I tilfælde af denne type eksponering skal der omgående tages kontakt til dyrlæge. **Særlige forholdsregler til bruk hos dyr:** Kun til udtørtes brug. Veterinærægemidlets sikkerhed er ikke blevet påvist for hunde, der er yngre end 7 uger eller vejer mindre end 1,5 kg. Sørg for at undgå kontakt mellem veterinærægemidlet og hundens øjne. I tilfælde af kontakt med hundens øjne skylles øjeblikkeligt med vand. Efter behandling kan det ikke undelukkes, at en enkelt flåt hæfter sig fast. Af den grund kan overførslen af smitsomme sydromme ikke fuldstændigt undelukkes, hvis betingelserne er gunstige. Veterinærægemiddlet forbliver effektivt, når behandlede dyr nedsenkes i vand (f.eks. svømming eller bading). Måling af produktets effektivitet efter en måned viste, at effektiviteten ikke påvirkes af ugentligt nedsenkning i vand, når denne var påbegyndt 48 timer efter behandling, ej heller ved shampoobehandling påbegyndt 2 uger efter behandling. Dog kan aktivitetsvarighed formindskes ved hyppig shampoobehandling eller bading inden for 48 timer efter behandling. Behandlede hunde bør ikke gives adgang til overfladevand i 48 timer efter behandling for at undgå bivirkninger hos vandorganismen (se også afsnit "Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler"). **Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dy:** Spis, drik eller ryg ikke, når veterinærægemiddlet håndteres. Personer med kendt overfølsomhed for overførslen af insektsstofferne fra hundens huden til deres egen huden.

ALTERNATIVT

4b-anbefalinger: Uanset hundens legemsvejt laves med applikatorspidsen en skålning ved halebasis og veterinærægemidlet påføres direkte på huden i en ubrudt linje fra halebasis til midt på ryggen og hele vejen op til skulderbladene som vist på illustrationen. Applikatoren trykkes sammen til den er tom.

Behandlingsplan:

Veterinærægemidlet vil efter en enkelt administration forhindre infestation i en måned. Behandling kan gentages månedligt.

TILBAKEHOLDELSESTID: Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette veterinærægemiddel kræver ingen særlige oppbevaringsbetingelser. Bruk ikke dette veterinærægemiddel efter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dag i den måneden.

SÆRLIGE ADVARSLER: Særlige advarsler for hver dyreart: Alle husstandens hunde bør behandles. Husstandens katte bør kun behandles med et veterinærægemiddel, der er godkendt til bruk til kat. Lopper kan infestere hundens kurv, underlag og sædvanlige opholdssteder som gulvtæpper og bløde møbler. I tilfælde af en omfattende loppeinfestation bør disse områder - som led i indledende bekæmpelsesforanstaltninger - behandles med et passende insekticid og støvsuges regelmæssigt. I tilfælde af mistanke om dermatitis (kløe og hudirritation), søges dyrlægehjælp. Må ikke anvendes til kat. Hvis veterinærægemiddlet utiligtet indtages gennem munnen af katte, kan det udlede fatale kræmer hos katte. I tilfælde af utiligtet indtakelse af eksponeringer skal katten vaskes med shampoo eller sæbe, og der skal omgående tages kontakt til dyrlæge. For at forhindre katte i utiligtet at blive eksponeret for veterinærægemiddlet skal katte holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre, at katten ikke slikker på applikationsstedet på den behandlede hund. I tilfælde af denne type eksponering skal der omgående tages kontakt til dyrlæge. **Særlige forholdsregler til bruk hos dyr:** Kun til udtørtes brug. Veterinærægemidlets sikkerhed er ikke blevet påvist for hunde, der er yngre end 7 uger eller vejer mindre end 1,5 kg. Sørg for at undgå kontakt mellem veterinærægemidlet og hundens øjne. I tilfælde af kontakt med hundens øjne skyll straks med vann. Følgende illustration viser hvordan man skal påføre veterinærægemiddlet på hundens hals i en behagelig position. Lav en skålning i hæret, indtil huden er synlig. Påfør veterinærægemiddlet (som vist i trin 4 nedenfor) langsomt og med applikatorspidsen mod huden.

Start

Stop

4b-anbefalinger: Uanset hundens legemsvejt laves med applikatorspidsen en skålning ved halebasis og veterinærægemidlet påføres direkte på huden i en ubrudt linje fra halebasis til midt på ryggen og hele vejen op til skulderbladene som vist på illustrationen. Applikatoren trykkes sammen til den er tom.

Behandlingsplan:

Veterinærægemidlet vil efter en enkelt administration forhindre infestation i en måned. Behandling kan gentages månedligt.

TILBAKEHOLDELSESTID: Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette veterinærægemiddel kræver ingen særlige oppbevaringsbetingelser. Bruk ikke dette veterinærægemiddel efter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dag i den måneden.

SÆRLIGE ADVARSLER: Særlige advarsler for hver dyreart: Alle husstandens hunde bør behandles. Husstandens katte bør kun behandles med et veterinærægemiddel, der er godkendt til bruk til kat. Lopper kan infestere hundens kurv, underlag og sædvanlige opholdssteder som gulvtæpper og bløde møbler. I tilfælde af en omfattende loppeinfestation bør disse områder - som led i indledende bekæmpelsesforanstaltninger - behandles med et passende insekticid og støvsuges regelmæssigt. I tilfælde af mistanke om dermatitis (kløe og hudirritation), søges dyrlægehjælp. Må ikke anvendes til kat. Hvis veterinærægemiddlet utiligtet indtages gennem munnen af katte, kan det udlede fatale kræmer hos katte. I tilfælde af utiligtet indtakelse af eksponeringer skal katten vaskes med shampoo eller sæbe, og der skal omgående tages kontakt til dyrlæge. For at forhindre katte i utiligtet at blive eksponeret for veterinærægemiddlet skal katte holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre, at katten ikke slikker på applikationsstedet på den behandlede hund. I tilfælde af denne type eksponering skal der omgående tages kontakt til dyrlæge. **Særlige forholdsregler til bruk hos dyr:** Kun til udtørtes brug. Veterinærægemidlets sikkerhed ved bruk til hund yngre end 7 uker, eller som vejer mindre end 1,5 kg er ikke klarlagt. Det skal utvist forsikrighed for å unngå kontakt mellom veterinærægemiddlet og hundens øjne. Ved kontakt med hundens øjne, skyll straks med vann. Følgende illustration viser hvordan man skal påføre veterinærægemiddlet på hundens hals i en behagelig position. Lav en skålning i hæret, indtil huden er synlig. Påfør veterinærægemiddlet (som vist i trin 4 nedenfor) langsomt og med applikatorspidsen mod huden.

Start

Stop

4b-anbefalinger: Uanset hundens legemsvejt laves med applikatorspidsen en skålning ved halebasis og veterinærægemidlet påføres direkte på huden i en ubrudt linje fra halebasis til midt på ryggen og hele vejen op til skulderbladene som vist på illustrationen. Applikatoren trykkes sammen til den er tom.

Behandlingsplan:

Veterinærægemidlet vil efter en enkelt administration forhindre infestation i en måned. Behandling kan gentages månedligt.

TILBAKEHOLDELSESTID: Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette veterinærægemiddel kræver ingen særlige oppbevaringsbetingelser. Bruk ikke dette veterinærægemiddel efter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdato