

PROSCAR®

Filmovertrukne tabletter 5 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Proscar® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Proscar®.
3. Sådan skal du tage Proscar®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Proscar® hæmmer dannelsen af et hormon, som er årsag til forstørrelse af blærehalskirtlen (prostata). En forstørret blærehalskirtel kan trykke på urinrøret og på den måde hindre vandladning.

Medicinen anvendes til

Du kan tage Proscar® for at nedsætte risikoen for akut vandladningsbesvær og udsætte tidspunktet for en evt. operation for forstørret prostata.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Proscar®

Tag ikke Proscar® hvis

- Du er overfølsom over for finasterid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Kvinder og børn må ikke tage Proscar®.

Særlige forholdsregler

- Nogle patienter får meget hurtigt lindring for deres besvær, andre skal behandles i mindst 6 måneder, før generne bliver mindre.
- Proscar® nedsætter risikoen for, at du lige pludselig ikke kan lade vandet og akut får brug for læge eller skadestue. Du må kun holde op med at tage Proscar® efter aftale med lægen.
- Tal med lægen, hvis din lever fungerer dårligt.

Brug af Proscar® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Proscar® sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Proscar®

Proscar® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Proscar® er kun til behandling af mænd. Kvinder, der er eller kan være gravide må ikke komme i kontakt med Proscar®, da Proscar® kan medføre misdannelser hos drenge-fostre. Gravide kvinder må ikke tage Proscar® eller røre ved

knuste eller knækkede tabletter. Mænd skal anvende kondom ved samleje med kvinder, der er eller kan blive gravide, da Proscar® udskilles i sæden.

Amning:

Proscar® er kun til behandling af mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proscar® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Der er ikke kendskab til problemer ved brug af Proscar® sammen med anden medicin.

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Proscar®

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Mænd:

1 tablet dagligt, med eller uden mad.

Ældre mænd:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen.

Har du taget for mange Proscar®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Proscar®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage Proscar®

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du springe den glemte tablet over og tage den næste til sædvanlig tid.

4. Bivirkninger

Proscar® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktion, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, feber samt hævelse af læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Impotens, nedsat lyst til sex. Nedsat mængde sæd.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt.
- Problemer med udløsning.
- Udvikling af brystkirtler, brystømhed.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Kløe, nældefeber.
- Smerter i testiklerne.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udflåd fra brystvorterne. Knuder i brysterne.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Proscar® utilgængeligt for børn.
- Opbevar Proscar® i original emballage, da medicinen er følsom over for lys og fugt.
- Tag ikke Proscar® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Proscar® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Proscar® er:

Finasterid 5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Lactose, pregelatineret stivelse, natriumdocusat, mikrokrySTALLINSK cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, talcum, indigotin (E 132), titandioxid (E 171) og jernoxider (E 172).

Produktets styrke og pakningsstørrelse:

Proscar® 5 mg fås i pakninger med 28, 30, 90, 98, 105 og 120 fillovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Proscar® er et registreret varemærke, der tilhører Merck & Co. Inc.



(02) 1078801

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700