

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CANESTEN® GYN

500 mg vaginaltabletter og 10 mg/g creme Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten® Gyn uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Canesten® Gyn. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

Øversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Canesten® Gyn og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten® Gyn.
3. Sådan skal du bruge Canesten® Gyn.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Canesten® Gyn.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Canesten® Gyn og hvad du skal bruge det til

- Canesten® Gyn er et svampedræbende middel.
- Du kan bruge Canesten® Gyn til behandling af betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Canesten® Gyn virker på.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten® Gyn for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten® Gyn

Brug ikke Canesten® Gyn

hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten® Gyn

- hvis du er under 15 år. Tal med lægen.
- hvis du er i eller efter overgangsalderen. Tal med lægen.
- hvis du har gentagne betændelser over længere tid. Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner. Tal med lægen.

Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke er bedre efter 3 dage.

Brug ikke Canesten® Gyn samtidig med kondom eller pessar, da det kan nedsætte sikkerheden af disse midler.

Brug af anden medicin

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan bruge Canesten® Gyn under graviditet.
- Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet.

Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

Amning:

- Du kan bruge Canesten® Gyn, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten® Gyn påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten® Gyn

Canesten® Gyn creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten® Gyn

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Endagsbehandling: 1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis.

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten® Gyn 10 mg/g creme. Smør cremen på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og i 3 dage efter symptomerne er væk.

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten® Gyn vaginaltabletter under menstruation.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten® Gyn creme 10 mg/g på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk.

Børn:

Du må kun bruge Canesten® Gyn til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Hvis din læge har ordineret Canesten® Gyn til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

4. Bivirkninger

Canesten® Gyn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hudreaktioner med kløe, udslæt, brændende fornemmelse og rødmen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergi.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Canesten® Gyn

- Opbevar Canesten® Gyn utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Canesten® Gyn ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Canesten® Gyn efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Canesten® Gyn 500 mg vaginaltabletter og 10 mg/g creme indeholder:

Vaginaltabletter: Clotrimazol 500 mg.

Creme: Clotrimazol 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Vaginaltabletter: Laktosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse, crospovidon, calciumlactatpentahydrat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica og hypromellose.

Creme: Sorbitanstearat, polysorbit 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol og rensed vand.

Pakningsstørrelser:

Canesten® fås i:

Canesten® 500 mg og 10 mg/g i pakninger med 1 vaginaltablet og 20 g creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.


I Danmark markedsføres Canesten® Gyn også som Canesten®.

Canesten® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft.


Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.




2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).



3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren.



(02)2918501