

Burinex® med kaliumklorid, overtrukne tabletter

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Burinex® med kaliumklorid tabletter til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Burinex® med kaliumklorid.
3. Sådan skal du tage Burinex® med kaliumklorid.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Burinex® med kaliumklorid er hvide elipseformede overtrukne tabletter.

Burinex® med kaliumklorid virker vanddrivende. Kaliumklorid modvirker tab af kalium gennem urinen.

Du kan bruge Burinex® med kaliumklorid som vanddrivende middel og til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse før du tager Burinex® med kaliumklorid

Tag ikke Burinex® med kaliumklorid hvis:

- du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.
- du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen (elektrolytforstyrrelser).
- dine nyrer ikke fungerer normalt eller din urinproduktion er ophørt.
- du har sår i mave eller tarm.
- du har en alvorlig leversygdom.

Særlige forholdsregler

Fortæl lægen, hvis du:

- er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner (sulfonamider) eller
- andre vanddrivende midler (thiazider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Burinex® med kaliumklorid.
- har stofskiftesygdom (porfyri).
- har diabetes, eller
- urinsyregigt, da Burinex® med kaliumklorid kan forværre din gigt.
- har for lavt blodtryk.
- har hjertesygdom.

Brug af Burinex® med kaliumklorid sammen med mad og drikkevarer:

Du kan tage Burinex® med kaliumklorid sammen med mad og drikke (se afsnit 3 Sådan skal du tage Burinex® med kaliumklorid).

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Burinex® med kaliumklorid

Tabletterne indeholder saccharose, kontakt derfor lægen, før du tager dem, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

Burinex® med kaliumklorid indeholder 7,7 mmol kalium pr. dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun bruge Burinex® med kaliumklorid efter lægens anvisning.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Burinex® med kaliumklorid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex® med kaliumklorid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Burinex® med kaliumklorid kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Burinex® med kaliumklorid. Tal med lægen, hvis du tager:

- hjertemedicin (digoxin, antiarytmiske midler),
- binyrebarkhormoner,
- tabletmedicin mod diabetes (sulfonylurinstoffer),
- smertestillende medicin (NSAID),
- medicin mod mani (lithium),
- andre vanddrivende midler,
- medicin mod depression (tricycliske antidepressiva),
- antibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner),
- medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere, angiotensin II receptor-antagonister).

3. Sådan skal du tage Burinex® med kaliumklorid

Dosering

Voksne: 2 tabletter daglig.

Du skal synke tabletterne hele.

Børn: Du må kun bruge Burinex® med kaliumklorid til børn efter lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

Du skal tage Burinex® med kaliumklorid med et glas vand. Du kan tage Burinex® med kaliumklorid i forbindelse med et måltid eller lige efter.

Du skal ikke tage Burinex® med kaliumklorid lige før sengetid.

Tabletten indeholder en kerne, som undertiden kan ses i afføringen.

Har du taget for mange Burinex® med kaliumklorid?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Burinex® med kaliumklorid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Burinex® med kaliumklorid, kan du:

- få kraftig forøget vandladning.
- få væskemangel.
- få mundtørhed.
- føle dig afkræftet.
- få udtalt søvntilbøjelighed,
- blive døsig og forvirret.
- få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald.

Har du glemt at tage Burinex® med kaliumklorid?

Hvis du har glemt at tage Burinex® med kaliumklorid, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot fortsætte med sædvanlig dosis.

4. Bivirkninger

Burinex® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Tendens til mavesår.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Sukkersyge (diabetes).

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Forandringer i blodet, med tendens til, blødninger og betændelser. Kontakt omgående læge eller skadestue.

Bindevævssygdom med feber, udslæt, betændelse i blodårer (vaskulit). Høreskader.

Hyppighed ikke oplyst:

- Uregelmæssig hjerterytme med meget hurtig eller for langsom puls. Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Gulsot.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Forstyrrelser i væske- og saltbalancen med svaghed og kræftsløshed. Anfald af urinsur gigt. Øget blodglukose med tørst og øget vandladning. Hovedpine, træthed svimmelhed, især når du rejser dig op. Kvalme, diaré, luft i maven. Opkastning, forstoppelse og irritation i maven.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Væskemangel. Hududslæt, nældefeber, kløe. Øget hudfølsomhed over for lys. Muskelkræmper.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner. Høreforstyrrelser.

Hyppighed ikke oplyst:

- Bensmerter, muskelsmerter.
- Tørst.
- Føleforstyrrelser.
- Besvimelse.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Burinex[®] med kaliumklorid utilgængeligt for børn.

Brug ikke Burinex[®] med kaliumklorid tabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Burinex[®] med kaliumklorid indeholder:

Burinex[®] med kaliumklorid tabletter:

De virksomme stoffer i Burinex[®] med kaliumklorid tabletter er: Bumetanid 0,5 mg og kaliumklorid 573 mg.

Hjælpestoffene er: Ethylcellulose; jernoxid brun E 172; glycerol 85%; magnesiumstearat; stearylalkohol; calciumsulfatdihydrat; hypromellose; povidon; kolloid vandfri silica; saccharose; talcum; titandioxid E 171.

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup

Laboratoires LEO S.A.39, route de Chartres
28500 Vernouillet
Frankrig

Revideret: Februar 2006.