

Daivonex® creme, 50 mikrogram/g

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen


- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Daivonex® til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:


1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Daivonex®.
3. Sådan skal du bruge Daivonex®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse


Du kan bruge Daivonex® til behandling af psoriasis. I psoriasisishud deler cellerne sig så hurtigt, at de ikke når at modnes. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden (fig.1).




Daivonex® får hudcellerne til at dele sig normalt (fig. 2,3,4).



Efter 2 ugers behandling med Daivonex® creme kan du ofte se en forbedring af din psoriasis.



Skællene plejer at forsvinde først.



Hudens rødme er normalt længere tid om at forsvinde.

Du kan bruge Daivonex® creme til behandling af psoriasis både alene eller sammen med hormonsalve eller hormoncreme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Daivonex®

Brug ikke Daivonex® creme hvis:

- Du er overfølsom over for det aktive stof calcipotriol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex® creme.
- Du har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Særlige forholdsregler

Du bør ikke bruge Daivonex® creme i ansigtet på grund af risiko for irritation af huden. Du skal vaske hænderne, efter du har brugt Daivonex® creme for at undgå, at cremen kommer i ansigtet. Er det dine hænder, du skal behandle, skal du passe på med ikke at få Daivonex® creme i ansigtet. Brug evt. bomuldshandsker.

Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarium og anden form for lysbehandling.

Hvis du bruger mere Daivonex® creme end anbefalet, kan du risikere, at indholdet af kalk i

blodet bliver for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme.

Tal med lægen, hvis du har:

- Dårlige nyrer.
- Dårlig lever.

Brug af Daivonex® sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Daivonex® creme sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex® creme

Daivonex® creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakt-eksem).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun bruge Daivonex® creme efter lægens anvisning.

Amning: Erfaringerne med Daivonex® creme er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Daivonex® creme, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex® creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Du kan bruge Daivonex® creme sammen med anden medicin.

3. Sådan skal du bruge Daivonex® creme

Dosering

Voksne:

Smør Daivonex® creme på den angrebne hud 1-2 gange dagligt. I starten af behandlingen skal du sædvanligvis bruge cremen 2 gange dagligt. Derefter kan du efter behov nøjes med 1 gang dagligt.

Bruger du Daivonex® creme sammen med hormoncreme eller hormonsalve, skal du ikke bruge de to ting samtidig. Brug fx Daivonex® creme om morgenen og hormonsalve eller hormoncreme om aftenen.

Du må højst bruge 100 g Daivonex® creme om ugen.

Skal du bruge Daivonex® creme sammen med Daivonex® salve eller Daivonex® kutanopløsning til hårbunden, bør den samlede mængde af det aktive stof calcipotriol ikke overstige 5 mg om ugen. Dette svarer til, at du bruger fx 50 ml kutanopløsning og 50 g salve eller creme om ugen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.



Brugsanvisning

Smør cremen i et tyndt lag på den angrebne hud. Du bør ikke bruge cremen i ansigtet. Vask hænderne efter du har brugt cremen, så du undgår, at få cremen i ansigtet. Skal du bruge cremen på hænderne, kan du evt. bruge et par bomuldshandsker.



Har du brugt for meget Daivonex® creme?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivonex® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har brugt for meget af Daivonex® creme, kan indholdet af kalk i blodet blive for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Kalkindholdet i dit blod bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® creme.

Har du glemt at bruge Daivonex® creme?

Hvis du har glemt at bruge Daivonex® creme, skal du bare fortsætte med næste dosis. Du skal ikke bruge dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Daivonex® creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kløe, hudirritation, brændende og stikkende fornemmelse, tør hud, rødmen i huden, hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Kontakteksem, eksem, forværring af psoriasis.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Forbigående farveændringer i huden, øget følsomhed af huden over for lys, nældefeber, hævelse omkring øjnene.
- Forhøjet kalk i blod og urin. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Daivonex® creme utilgængeligt for børn.

Brug ikke Daivonex® creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Daivonex® creme, 50 mikrogram/g indeholder:

Det virksomme stof i Daivonex® creme er:

Calcipotriol som calcipotriolmonohydrat.

De øvrige indholdsstoffer er:

Macrogolstearylether, cetostearylalkohol, chloroallylhexaminchlorid, dinatriumedetat, natriumhydroxid, dinatriumphosphatdihydrat, glycerol 85 %, paraffinolie, hvid blød paraffin og rensat vand.

Pakningsstørrelser:

60 g og 120 g.

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55,
DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road,
Dublin 12, Irland.

Revideret

Oktober 2007

LEO

