

Daivonex® kutanopløsning til hårbunden, 50 mikrogram/g

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Daivonex® til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Daivonex®.
3. Sådan skal du bruge Daivonex®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Daivonex® kutanopløsning til behandling af psoriasis i hårbunden.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Daivonex®

Brug ikke Daivonex® kutanopløsning hvis:

- Du er overfølsom over for det aktive stof calcipotriol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex® kutanopløsning.
- Du har forstyrrelser i kalkstofskiftet.

Særlige forholdsregler

Du bør ikke bruge Daivonex® kutanopløsning i ansigtet på grund af risiko for irritation af huden. Du skal vaske hænderne, efter du har brugt Daivonex® kutanopløsning for at undgå, at kutanopløsningen kommer i ansigtet.

Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarium og anden form for lysbehandling.

Hvis du bruger mere Daivonex® kutanopløsning end anbefalet, kan du risikere, at indholdet af kalk i blodet bliver for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Dit kalk i blodet bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® kutanopløsning.

Tal med lægen, hvis du har:

- Dårlige nyrer.
- Dårlig lever.

Brug af Daivonex® sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Daivonex® kutanopløsning sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Daivonex® kutanopløsning

Daivonex® kutanopløsning indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun bruge Daivonex® kutanopløsning efter lægens anvisning.

Amning: Erfaringerne med Daivonex® kutanopløsning er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Daivonex® kutanopløsning, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivonex® kutanopløsning påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept,

medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Du kan bruge Daivonex® kutanopløsning sammen med anden medicin.

3. Sådan skal du bruge Daivonex® kutanopløsning

Dosering

Voksne:

Smør Daivonex® kutanopløsning på den angrebne hud 2 gange dagligt. Du må højst bruge 60 ml kutanopløsning om ugen. Brugt du Daivonex® kutanopløsning sammen med Daivonex® salve eller creme, må den samlede mængde af det aktive stof calcipotriol ikke overstige 5 mg om ugen. Det svarer til, at du bruger f.eks. 50 ml kutanopløsning og 50 g salve eller creme om ugen.

Børn:

Du må kun bruge Daivonex® kutanopløsning til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

Sådan bruger du Daivonex® kutanopløsning:

1. Håret bør være tørt.
2. Hold flaskens åbning tæt ved hårbunden.
3. Påfør nogle dråber i et tyndt lag på de angrebne områder, og massér det forsigtigt ind i hårbunden.
4. Vask hænderne efter brug.



Daivonex® kutanopløsning tørrer hurtigt. Du bør ikke benytte hårtørrer.

Har du brugt for meget Daivonex® kutanopløsning?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivonex® kutanopløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har brugt for meget af Daivonex® kutanopløsning, kan indholdet af kalk i blodet blive for højt. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrationsevne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft. Dit kalk i blodet bliver normalt igen, når du stopper med at bruge Daivonex® kutanopløsning.

Har du glemt at bruge Daivonex® kutanopløsning?

Hvis du har glemt at bruge Daivonex® kutanopløsning, skal du bare fortsætte med næste dosis. Du skal ikke bruge dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Daivonex® kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.



L E O

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede):

- Brændende og stikkende fornemmelse.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kløe, hudirritation, tør hud, rødmen i huden, hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Kontakteksem, eksem, forværring af psoriasis.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Forbigående farveændringer i huden, øget følsomhed af huden over for lys, nældefeber, hævelse omkring øjnene.
- Forhøjet kalk i blod og urin. Symptomer på for højt kalk i blodet er nedsat koncentrations- evne, træthed, forstoppelse, tørst og nedsat muskelkraft.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Daivonex® kutanopløsning utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Daivonex® kutanopløsning ved temperaturer over 25°C.

Daivonex® kutanopløsning er brandfarlig.

Brug ikke Daivonex® kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Daivonex® kutanopløsning til hårbunden, 50 mikrogram/g indeholder:

Det virksomme stof i Daivonex® kutanopløsning er: Calcipotriol som calcipotriolmonohydrat.

De øvrige indholdsstoffer er:

Hydroxypropylcellulose, isopropylalkohol, levomenthol, natriumcitrat, propylenglycol og rensat vand.

Pakningsstørrelser:

120 ml

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup

Revideret

Oktober 2007

LEO

