

INDLÆGSSEDDEL

Zicare 1000 mg/g premix til foderlægemiddel, til svin

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Himmerlands Grovvarer A/S
Hjortkjærvej 10
9600 Aars

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Himmerlands Grovvarer A/S
Søagervej 9
Sdr. Onsild
9500 Hobro

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Zicare 1000 mg/g premix til foderlægemiddel, til svin.
Zinkoxid.

3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSTOFFER

Zinkoxid 1000 mg/g.

4. INDIKATIONER

Til kontrol af E.coli-diarré hos fravænnede svin.

5. KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6. BIVIRKNINGER

Nye studier har vist, at anvendelsen af zinkoxid til fravænnede grise kan øge udbredelsen af MRSA CC398 i de resistente bakterier.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

7. DYREARTER

Fravænnede svin op til 10 uger gamle.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej(E)

Til anvendelse i foder.

Til opblanding i tørfoder på en fodermølle, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
2500 mg zink pr. kg foder svarende til 3100 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.
Kun til oral anvendelse.

Når lægemidlet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede er i foderet, enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på ernæringsmæssige formål. Tilsæt en mængde af lægemidlet så den samlede mængde zink i foderet bliver 2500 mg zink pr. kg foder.

For at sikre tilstrækkelig fordeling af lægemidlet i slutfoderet anbefales det at forblende lægemidlet med en passende mængde af foderingredienserne, inden det iblandes slutfoderet. Slutfoderet bør anvendes som det eneste foder i højst 14 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

-

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Svin (slagtning): 0 dage

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på emballagen efter EXP.

Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

I salgspakning: 2 år.

Efter opblanding i fodermel eller foderpiller: 3 måneder.

12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Læs indlægssedlen før brug.

Et højt indhold af zink i foderet kan hæmme optagelsen af calcium, kobber og jern.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidletLuftveje/indtagelse:

- Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre irritation af luftvejene.
- Undgå inhalation.
- Undgå støvdannelse. Undgå støvdannelse ved opblanding i foder. Ved eksponering for store mængder støv anvendes støvmaske P2.
- Ved inhalation flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Giv ilt, hvis der er åndedrætsproblemer. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, giv kunstig åndedræt. Søg lægehjælp.
- Ved indtagelse forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægepersonalet anbefaler dette. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Såfremt potentielt farlige mængder af dette materiale er blevet indtaget skal der straks søges lægehjælp og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Øjne:

- Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre irritation af øjne.
- Undgå kontakt med øjne.
- Brug beskyttelsesbriller.
- I tilfælde af kontakt med øjne skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Fjern herefter eventuelle kontaklinser og fortsæt skylning. Søg læge.

Hud:

- Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre hudirritation.
- Undgå kontakt med hud
- Anvend arbejdstøj og beskyttelseshandsker (af læder eller bomuld).
- I tilfælde af kontakt med huden skal der straks skylles med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør sko grundigt, før de bruges igen. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

Andre forholdsregler vedrørende indvirkning på miljøet

Zink er meget giftig for organismer, der lever i vand, men kan påvirke væksten, overlevelse og reproduktion i både akvatiske og terrestriske planter og dyr. Zink er persistent i jord og kan ophobes i sedimenter. Toksicitet afhænger af miljøforhold og naturtyper. Risikoen for miljøet kan reduceres ved at overholde følgende foranstaltninger.

Ved spredning af gødning fra behandlede dyr skal den maksimale samlede zinkbelastning, som defineret i de nationale eller lokale regler, overholdes strengt. Ufortyndet gylle fra behandlede grise bør ikke anvendes på land. Fortyndning med gylle fra ubehandlede dyr og søer er påkrævet, så den samlede mængde af behandlet pattegrisdgødning er så lav som mulig og aldrig over 40 %, som er forholdet mellem gylle fra fravænnede pattegrise og søer, når gyllen lagres sammen. Produktet bør

ikke anvendes på bedrifter, hvor blanding af gødning fra behandlede dyr med gødning af ikke-behandlede dyr ikke er mulig.

Zinks biotilgængelighed, og dermed miljørisikoen, varierer mellem jordtyper. Gylle fra behandlede grise bør ikke spredes på sårbare jordtyper, der er blevet identificeret som frit drænende, sure (pH ≤ 6), sandede jorder.

Gylle, som indeholder zink bør ikke spredes på samme areal i på hinanden følgende år for at undgå ophobning af zink, som kan forårsage skadelige virkninger på miljøet.

Ved spredning af gylle fra behandlede dyr skal den mindste afstand til overfladevand, som defineret i de nationale eller lokale regler, strengt respekteres, og en stødpudezone på minimum 3 m anvendes, da gyllen indeholder zink, som kan forårsage skader i vandmiljøet.

Overdosering

Der er rapporteret levertoksisk effekt ved den anbefalede daglige dosis i 4 uger.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

EKSTREMT FARLIGT FOR FISK OG VANDLEVENDE ORGANISMER. Undgå at forurene overfladevand eller grøfter med produktet eller brugte beholdere

Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

Februar 2020

15. ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelse: 25 kg.