

# INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

## Selexid® pulver til injektionsvæske, opløsning

Mecillinam

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  - Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  - Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Øversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Selexid®
3. Sådan bliver du behandlet med Selexid®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Selexid® er et antibiotikum af penicillintype. Selexid® virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.

Du kan få Selexid® mod urinvejsinfektioner og infektioner med salmonella.

Du skal have Selexid® som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtninger. Lægen kan give dig Selexid® for noget andet. Spørg lægen.

### 2. DET SKAL DU VIDE OM SELEXID®

Du må ikke få Selexid®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for
- mecillinam
- øvrige indholdsstoffer
- penicillin

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Selexid®

Tal med lægen, inden du får Selexid® hvis du

- er overfølsom over for cefalosporiner
- lider af porfyri (en stofskiftesygdom)
- tager medicin mod epilepsi (valproat)
- får langvarig eller blodig diaré under behandlingen med Selexid®. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis)

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Selexid®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- anden medicin mod betændelse (f.eks. tetracyklin, erythromycin, andre beta-lactamantibiotika, aminoglykosider)
- medicin mod urinsyreigt (probenecid)

### Graviditet og amning

#### Graviditet:

Du kan få Selexid® under graviditet.

#### Amning:

Du kan få Selexid® selvom du ammer.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Selexid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### 3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED SELEXID®

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

### Den sædvanlige dosis er

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og afhænger af din sygdom. En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Selexid® i en muskel eller i en blodåre.

### Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig.

### Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er og hvor længe behandlingen varer.

### Nedsat nyrefunktion:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

### Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig.

### Hvis du har fået for meget Selexid®

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Selexid® og af den grund føler dig utilpas.

### Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

### Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Selexid®. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Selexid® er stoppet.



#### 4. BIVIRKNINGER

Selexid® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

##### Alvorlige bivirkninger

##### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældent)

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt. Hævelse af læber, tunge og ansigt, det kan medføre at luftvejene blokeres. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet. Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

##### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. Diaré, opkastning, maveproblemer, kvalme og mavesmerter.

**Ikke almindelige:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede. Forskellige former for hududslæt. Træthed.

##### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældent)

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Udslæt (nældefeber) og kløe. Der er en række bivirkninger der først ses ved blodprøvekontrol. Det er forbigående forhøjelse af levertal og andre forandringer i blodet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

#### 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Selexid® kan opbevares ved almindelig temperatur.

Selexid® må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan medicinrester skal afleveres. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

#### 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

##### Selexid® 1 g pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Mecillinam

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæske.

##### Udseende og pakningsstørrelser

###### Udseende

Hætteglas med hvidt til råhvidt krystallinsk pulver.

###### Pakningsstørrelser

1 g

##### Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S  
Industriparken 55  
DK-2750 Ballerup

##### Fremstiller

Laboratoires Panpharma S.A.,  
35133 Fouyeres  
Frankrig

##### Denne indlægsseddel blev senest revideret

Juli 2011



**LEO**

026415-00



**Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:**

#### Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

##### Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Til i.m. anvendelse opløses 1 g i 4,4 ml sterilt vand.

Til i.v. anvendelse opløses 1 g mecillinam i 9,4 ml sterilt vand, som gives langsomt (3-4 min.) eller som i.v. infusion i isotonisk natrium-klorid-infusionsvæske eller Ringer-infusionsvæske.

##### Uforligneligheder

Selexid® pulver til injektion, opløsning bør kun opløses/fortyndes med sterilt vand og isotonisk natriumkloridinjektionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka.