

Centyl® tabletter 5 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Centyl® tabletter 5 mg til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Centyl®.
3. Sådan skal du tage Centyl®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Centyl® er en hvid, rund, flad tablet. Der er en delekærv på den ene side og en rund rille på den anden.

Centyl® nedsætter blodtrykket og virker vanddrivende.

Centyl® øger saltudskillelsen i nyrerne. Det giver større urinmængde og øger udskillelse af kalium (et salt i blodet).

Du kan bruge Centyl® til

- behandling af forhøjet blodtryk og
- væskeansamlinger (ødemer).
- forebyggelse af tilbagevendende nyresten.
- behandling af tørstesyg (diabetes insipidus).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Centyl®

Tag ikke Centyl® hvis:

- du har alvorlige forstyrrelser i kroppens væske og -saltbalance (elektrolytforstyrrelser).
- du har problemer med at tømme blæren eller ingen urin.
- din nyre- eller leverfunktion er alvorligt nedsat.
- du har svigt af binyrerne (Addisons sygdom).
- du har urinsyregigt (arthritis urica).
- du er overfølsom over for bendroflumethiazid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- du er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider), medicin mod diabetes type 2 (sulfonylurinstoffer) eller mod blærebetændelse (sulfamethizol).

Særlige forholdsregler

Du bør jævnligt få kontrolleret indholdet af kalium og natrium i dit blod. Hvis dine nyrer fungerer dårligt, skal du hyppigt til kontrol.

Hvis du har diabetes, kan Centyl® medføre, at glukosen i dit blod og i din urin stiger. Det kan være nødvendigt at ændre behandlingen af din diabetes, når du er i behandling med Centyl®. Det skal ske i samråd med din læge.

Centyl® kan forværre eller udløse anfald af urinsyreigt. Centyl® kan også forværre en bindevævssygdom (LED, systemisk lupus erythematosus).

Hvis du er i behandling med lithium, bør du ikke tage Centyl®, med mindre din læge hyppigt kontrollerer din behandling. Se afsnit "Brug af anden medicin".

Drikker du alkohol, mens du tager Centyl®, kan du risikere at besvime, når du rejser dig op. Det er, fordi dit blodtryk bliver for lavt.

Du bør undgå at spise lakrids, mens du tager Centyl. Det kan øge tabet af kalium.

Brug af Centyl® sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Centyl® sammen med mad og drikke. Alkohol kan øge bivirkninger ved behandling med Centyl®.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Centyl® tabletter 5 mg

Centyl® tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager disse tabletter, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Centyl® efter lægens anvisning.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker svangerskabsforebyggelse, mens du tager Centyl®.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Centyl®. Centyl® bliver udskilt i modermælken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler eller stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod gigt eller smerte (NSAID).
- Kolesterolssænkende midler (kolestyramin og kolestripol).
- Anden vanddrivende medicin.
- Hjertemedicin (digoxin).
- Muskelafslappende medicin.
- Blodtrykssænkende medicin.
- Medicin mod maniske tilstande (lithium).
- Medicin mod diabetes.
- Binyrebarkhormon (kortikosteroider).
- Medicin mod astma (beta-2-agonister).

- Medicin mod svamp (amphotericin B).
- Kalk (calcium) og/eller D-vitamin.
- Medicin som kan gøre din hud lysfølsom.
- Medicin, der kan sænke blodtrykket (f.eks. tricykliske antidepressiva).

Hvis du sammen med Centyl[®] tager:

- Alkohol,
 - medicin mod epilepsi (phenobarbital),
 - stærkt smertestillende medicin (opioider),
- kan du risikere at blive svimmel og falde, fordi blodtrykket bliver for lavt.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Centyl[®] og/eller Centyl[®] kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

3. Sådan skal du tage Centyl[®]

Dosering

Voksne:

½-1 tablet (2,5–5 mg) 1–2 gange daglig.

Børn:

Du må kun bruge Centyl[®] til børn efter lægens anvisninger.

Ældre:

Du skal følge lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Du skal følge lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Du skal følge lægens anvisninger.

Du kan tage Centyl[®] sammen med mad og drikke.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Centyl[®] ?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Centyl[®], end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis du tager for mange Centyl[®], risikerer du meget stor vandladning, væskemangel og forstyrrelser i væske- og saltbalancen.

Symptomerne er: Mundtørhed, tørst, kraftesløshed, sløvhed, døsighed, kvalme, opkastning, diaré, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald.

Har du glemt at tage Centyl[®] ?

Hvis du har glemt at tage Centyl[®] tabletter, skal du ikke tage dobbelt dosis men blot fortsætte med sædvanlig dosis.

4. Bivirkninger

Centyl[®] kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede):

Nedsat kaliumindhold i blodet der kan vise sig ved svaghed og kraftsløse muskler. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige forandringer i blodet, der kan vise sig ved influenzalignende symptomer, forkølelse, høj feber, træthed, svimmelhed, spontane blødninger. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlige forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance, der kan vise sig ved træthed, sløvhed, forvirring, koma, muskelspændinger. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 100 behandlede):

Forhøjet glukose og urinsyre i blodet, hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastninger og træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Føleforstyrrelser i huden f.eks. myrekryben, brænden, kløen, soven og prikken.

Svimmelhed når du rejser dig op, øget følsomhed for lys, hududslæt, muskelkramper, impotens.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

Anfald af urinsyreigt, kløe og årebetændelse.

Hypigheden ikke kendt:

For lavt blodtryk, diabetes, urinsyreigt (arthritis urica), besvimelse, kraftsløshed, svækkelse, muskelsmerter, væskemangel, mundtørhed, tørst, appetitløshed, diaré.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted;

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Centyl[®] utilgængeligt for børn.

Tag ikke Centyl[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Centyl[®] tabletter 5 mg indeholder:

Det virksomme stof i Centyl[®] tabletter er: Bendroflumethiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat; lactosemonohydrat; majsstivelse; gelatine; talcum; kolloid vandfri silica.

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup

Revideret

Januar 2006