

Motens[®] 4 mg filmovertrukne tabletter

lacidipin

0240485907

Motens[®] svarer til lægemidlet Midotens[®].

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Motens[®] til Dem personligt. Lad derfor være med at give Motens[®] til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Motens[®]
3. Sådan skal De bruge Motens[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Motens[®] udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder.
De kan bruge Motens[®] tabletter til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have givet Dem Motens[®] for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE MOTENS[®]**Tag ikke Motens[®] hvis De:**

- er overfølsom over for lacidipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Motens[®].
- har en forsnævring af hjerteklapperne (aortastenose).
- har en sjælden arvelig tilstand, hvor et af indholdsstofferne ikke tåles.

Vær ekstra forsigtig med at tage Motens[®]

Tal med lægen, før De tager Motens[®], hvis De:

- for nylig har haft en blodprop i hjertet.
- har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
- har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (forlænget QT-interval).
- har nedsat leverfunktion.
- bruger visse typer af anden medicin (se afsnittet "Brug af anden medicin").

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis De tager medicin

- mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
- for blodtrykket eller forstyrrelser i hjerterytmen (betablokkere, vanddrivende, ACE-hæmmere, antiarytmika).
- til brug efter transplantation og til at dæmpe betændelse (ciclosporin).
- mod psykiske sygdomme (tricykliske antidepressiva, visse antipsykotika).
- mod infektion (erythromycin, itraconazol, rifampicin).
- mod allergi (terfenadin).
- mod sygdomme der behandles med binyrebarkhormon.

Motens[®] kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Motens[®]. Hvis De ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Brug af Motens[®] sammen med mad og drikke

De kan tage Motens[®] i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

De bør ikke tage Motens[®] samtidig med grapefrugtjuice, da det kan ændre virkningen af Motens[®].

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Motens[®], efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Motens[®] efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Motens[®] kan give bivirkninger i form af svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Motens[®]

Motens[®] indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE MOTENS[®]

Motens[®] fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at De ikke nødvendigvis kan

bruge Deres tabletter til alle de anførte doseringer.

De bør tage tabletterne én gang dagligt og på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: Begyndelsesdosis er 2 mg 1 gang dagligt. Dosis kan gradvist øges til 4 mg (om nødvendigt 6 mg) dagligt.

De får først fuld virkning efter 3-4 ugers behandling.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: De må kun bruge Motens[®] til børn efter lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. De skal følge lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug altid Motens[®] nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis De har taget for mange Motens[®] filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Motens[®], end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være lavt blodtryk med svimmelhed og tendens til besvimelse, hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls.

Hvis De har glemt at tage Motens[®]

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at tage Motens[®]

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Motens[®] kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Vandophobning i kroppen. Kontakt lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hovedpine, rødmen.
- Svimmelhed, hjertebanken.
- Mavebesvær, kvalme.
- Udslæt, kløe.
- Forøget urinmængde.
- Kraftsløshed og svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Besvimelse. Ved normal puls og vejtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Fortykkelse af tandkødet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen, Hvis der er hævelse af ansigt, læbe og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Rysten.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Motens® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Motens® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Motens® 4 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Lacidipin 4 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vandfri lactose (spraytørret), povidon, magnesiumstearat, opaspray white M-1-7120 (E171).

Udseende og pakningsstørrelse:

Motens® er en hvid, oval filmovertrukket tablet med delekærv mærket med logo på den ene side og 9L-9L på den anden side.

Motens® findes i pakningsstørrelsen 28 stk. og 98 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010.