

Indlægsseddel: Information til brugeren**Hjerdyl® 150 mg tabletter**

acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

 Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjerdyl
3. Sådan skal du tage Hjerdyl
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjerdyl nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Det nedsætter også blodets evne til at størkne.

Du kan tage Hjerdyl til at forebygge dannelse af nye blodpropper, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet (akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjerdyl**Tag ikke Hjerdyl**

- hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
- hvis du er allergisk over for andre salicylater.
- hvis du har eller har haft allergiske reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner som skyldes salicylater eller smertestillende medicin (NSAID).
- hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødning.
- hvis du har øget tendens til blødning f.eks. hvis du har K-vitaminmangel, blødersygdom eller har lavt antal blodplader (trombocytopeni) med tendens til blødning fra hud og slimhinder.
- hvis du har meget dårlig lever.
- hvis du har meget dårlige nyrer.
- hvis du har meget dårligt hjerte.
- hvis du er gravid i 7.-9. måned og tager mere Hjerdyl end 150 mg dagligt.
- hvis du tager mere end 15 mg methotrexat om ugen.

Børn under 15 år med feber må ikke få Hjerdyl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hjerdyl.

Vær opmærksom på følgende:

- Du må ikke tage Hjerdyl sammen med smertestillende medicin, f.eks. ibuprofen eller naproxen (NSAID). Det kan øge risikoen for bivirkninger.
- Ældre må normalt ikke tage Hjerdyl i længere tid pga. risiko for blødning fra mave og tarm.
- Hjerdyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper og luftvejssygdomme eller allergi.
- Hjerdyl kan give urinsur gigt.
- Hjerdyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
- Forsigtighed ved mavesår.
- Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
- Hvis du får stærke mavesmerter og/eller mørkfarvet afføring kan dette skyldes blødning fra maven. Hvis dette sker skal du stoppe med at tage Hjerdyl og straks kontakte lægen.

Tal med lægen, inden behandling med Hjerdyl, hvis du

- har forhøjet blodtryk eller tendens til næseblødning, da det kan øge risikoen for slagtilfælde.
- er overfølsom over for anden smertestillende og betændelsesnedsættende medicin, medicin mod gigtssygdomme eller har andre overfølsomhedsreaktioner.
- har eller har haft smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm.
- har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi).
- har dårlig lever.
- har dårlige nyrer.
- har lav væskebalance (er dehydreret).
- har forhøjet blodtryk, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med medicin.
- har sukkersyge.
- har blodmangel på grund af mangel på et bestemt enzym (glucose-6-fosfat dehydrogenase).
- samtidig er i behandling med vanddrivende medicin.
- samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller heparin.

Hvis du skal opereres, skal du altid fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Hjerdyl. Hjerdyl øger tendensen til blødning.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hjerdyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Børn og unge

- Børn under 15 år må kun få Hjerdyl efter lægens anvisning.
- Hjerdyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Brug af anden medicin sammen med Hjerdyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat). Du må ikke tage Hjerdyl hvis du tager mere end 15 mg methotrexat om ugen.
- Blodfortyndende medicin (dikumarol, dipyridamol, clopidrogel, ticlopidin, cilostazol, warfarin, phenprocoumon, heparin, alteplase).
- Medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin).
- Hjertemedicin (abciximab, tirofiban, quinidin, digoxin og eptifibatid).

- Blodtrykssænkende medicin (ACE-hæmmere (f.eks. ramipril), angiotensin-II-antagonister (f.eks. losartan), calciumkanal-blokkere (f.eks. amlodipin).
- Medicin mod grøn stær (acetazolamid).
- Medicin mod epilepsi (valproat, phenytoin).
- Medicin mod urinsur gigt (probenecid og sulfinpyrazon).
- Anden smertestillende og febernedsættende medicin:
 - NSAID f.eks. ibuprofen eller naproxen, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser. Du skal tage Hjerdyd mindst 2 timer før, du tager ibuprofen eller naproxen.
 - Metamizol kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregering af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet.
- Vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
- Medicin mod mani og depression (lithium, imipramin, SSRI, f.eks. citalopram).
- Medicin mod infektioner (aminoglykosider).
- Binyrebarkhormoner.
- Medicin mod diabetes (insulin, sulfonylurinstoffer).
- Medicin mod for meget mavesyre (syreneutraliserende medicin).
- Naturlægemidler (ginkgo biloba).

Fortæl lægen, at du er i behandling med Hjerdyd, hvis du skal:

- vaccineres mod skoldkopper (varicella)
- bedøves (thiopental).

Alkohol kan forstærke virkningen af Hjerdyd, og kan give blødninger.

Brug af Hjerdyd sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Hjerdyd i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du drikker mere end 3 genstande daglig, må du normalt ikke tage Hjerdyd. Alkohol forstærker virkningen af Hjerdyd, hvilket kan give blødninger. Det anbefales derfor ikke at drikke alkohol, når du behandles med Hjerdyd.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Hjerdyd, medmindre din læge har vurderet at det er nødvendigt. Tal med lægen.

Du må ikke tage mere Hjerdyd end 150 mg dagligt i de sidste 3 måneder før forventet fødsel.

Fertilitet

Kvinder, der ønsker at blive gravide:

Hjerdyd kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du tager Hjerdyd og ønsker at blive gravid.

Amning

Hjerdyd går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn ved doser, som ikke overskrider 150 mg daglig. Det anbefales at undgå amning i 1-2 timer efter du har taget Hjerdyd.

Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjerdyd påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Hjerdyd

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslæmmes i vand.

Den anbefalede dosis er

Voksne

1 tablet daglig.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Hjerdyl til børn under 15 år efter aftale med lægen.

Hjerdyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Du må ikke tage Hjerdyl, hvis du har meget dårlige nyrer eller lever.

Hvis du har taget for meget Hjerdyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hjerdyl, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du oplever nogen af nedenstående symptomer på overdosering, skal du holde op med at tage Hjerdyl og kontakte din læge.

Symptomerne på overdosering (høje doser gennem længere tid) kan være

- dødsghed, svimmelhed, forvirring, kvalme

Symptomerne på alvorlig eller akut forgiftning, som følge af overdosering, kan være:

- svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.
- mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose)
- uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger
- tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring
- blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm
- hurtig vejrtrækning (hyperventilation), åndenød, hududslæt, tinnitus, nedsat syn og hørelse, kvalme, opkastninger, hovedpine, svimmelhed, forvirring, rysten, øget svedtendens, øget kropstemperatur, dyb bevidstløshed (koma)

Hvis du har glemt at tage Hjerdyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Hjerdyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjerdyl. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

- Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Astmaanfald hos astmapatienter. Kontakt læge eller skadestue.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.
- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. alvorlig blodmangel eller forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig maveblødning eller mavesår, hul i mavesækken.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

- Smerter i maven, opkastninger, evt. sort, blodig afføring pga. sår dannelse og forsnævninger af den nederste del af mave eller af tolvfingertarmen. Kontakt læge eller skadestue.
- Forværring og irritation i tyktarmen med vekslende forstoppelse og diaré, smerter og rumlen i maven. Kontakt læge.
- Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt lægen.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

- Blodet er længere tid om at størkne.
- Halsbrand og sure opstød.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

- Tendens til blødninger.
- Irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen.
- Kvalme, opkastning og diaré.
- Hovedpine.
- Søvnløshed.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

- Svimmelhed og døsighed.
- Øresusen (tinnitus).
- Allergiske reaktioner som nældefeber, hudreaktioner, astma og snue.
- Vejrtrækningsbesvær.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

- Bleghed og træthed pga. blodmangel (ved langtidsbehandling). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
- Forbigående døvhed.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
- Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema nodosum).

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

- Gulsot pga. leverbetændelse, som forsvinder når behandlingen stopper. Kontakt lægen.
- Mundbetændelse.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

- Blodig urin. Blødning fra skeden. Kontakt lægen.
- Øget blødning ved operationer.
- Næseblod.
- Blødning fra tandkødet.
- Blødninger i huden.
- Gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer.

Hjerdyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (f.eks. levertal og blodprøver) og blødninger, som ikke er let påviselige eller synlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjerdyl 150 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: kartoffelstivelse; magnesiumhydroxid; magnesiumstearat; majsstivelse og mikrokrySTALLinsk cellulose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hjerdyl er runde, hvide tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelser

Plastbeholder (HDPE) indeholdende 100, 200, 300 eller 700 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020.