

Perlutex® tabletter 5 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Perlutex® til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

- Virkning og anvendelse.
- Vigtig information som du skal læse, før du tager Perlutex®.
- Sådan skal du tage Perlutex®.
- Bivirkninger.
- Opbevaring.
- Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Perlutex® er en hvid til råhvid, rund tablet med delekærv.

Perlutex® indeholder et syntetisk hormon, der har samme virkning som det naturlige kvindelige kønshormon progesteron.

Du kan bruge Perlutex® mod:

- Blødningsforstyrrelser (hvis der ikke dannes nok progesteron i æggestokkene).
- Smarter ved endometriose (forekomst af livmoderslimhindevæv udenfor livmoderen).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.

Følg lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Perlutex®

Tag ikke Perlutex® hvis:

- du er overfølsom over for medroxyprogesteronacetat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Perlutex®.
- du har kræft eller mistanke om kræft i bryster eller underliv.
- du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.
- du har uforklarede blødninger fra skeden.
- du har alvorlig leversygdom.
- du har eller har haft en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
- du har knogleskørhed (osteoporose).
- du har en stofskiftesygdom (porfyri).

Særlige forholdsregler

Før du får Perlutex® vil din læge foretage en grundig gynækologisk undersøgelse for at udelukke at du har en underlivssygdom eller er gravid. Lægen vil desuden spørge om der har været tilfælde af brystkræft i din familie, da kvinder som får Perlutex® har let øget risiko for at få brystkræft. Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt under behandlingen.

Fortæl lægen, hvis du:

- får uregelmæssige blødninger eller dine blødninger ændres, f.eks. bliver kraftigere eller vedvarende.
- har diabetes, da du kan få brug for mere insulin eller mere tabletmedicin mod diabetes under behandling med Perlutex®.
- har astma.
- har migræne.
- har epilepsi.
- har dårligt hjerte eller nyrer.
- har været i behandling for depression.

Du skal være opmærksom på, at:

- ved længere tids behandling med Perlutex® er der risiko for, at knoglerne afkalkes. Du bør derfor indtage kalktilskud samt D-vitamin. Spørg lægen.
- der er en let øget risiko for brystkræft, når man tager kønshormoner.

- Perlutex® kan give vand i kroppen.
- der kan gå flere måneder efter du har fået Perlutex®, før du kan blive gravid. Dette er forskelligt fra kvinde til kvinde og er afhængig af, hvor længe du har fået Perlutex®.
- du ikke må bruge naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum.

Kontakt lægen snarest, hvis:

- du får migræneagtig hovedpine for første gang, eller hvis du hyppigt får meget kraftig hovedpine.
- du pludselig får synsforstyrrelser.
- du får tegn på årebetændelse, med hævet, smertende ben.
- du får blodprop i lungerne med pludselig åndenød, smerter i brystkassen.
- du får blodprop i øjet med pludselig blindhed.
- du får meget højt blodtryk (viser sig blandt andet ved meget høj puls).
- du får talebesvær, pludselig stærk svimmelhed, halvsidig lammelse eller føleforstyrrelser.
- du får gulsot.
- du bliver gravid.

Oplys altid ved vævsprøver, blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Perlutex®.

Brug af Perlutex® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Perlutex® sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Perlutex®

Perlutex® indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Perlutex® hvis du er gravid, eller har mistanke om, at du er gravid. Hvis du bliver gravid under behandling med Perlutex®, skal du kontakte din læge, da behandlingen skal ophøre.

Amning:

Perlutex® bliver udskilt i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade Deres barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Perlutex® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

- Tal med lægen, hvis du tager:
- medicin mod brystkræft (aminogluthetimid).
- medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
- antibiotika (rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).
- diabetesmedicin (sulfonylurinstoffer).
- naturmedicin der indeholder prikbladet perikum. Virkningen af prikbladet perikum kan vare i mindst 1-2 uger efter du har taget dem.

3. Sådan skal du tage Perlutex®

Dosering

Voksne:

Behandling af blødningsforstyrrelser (utilstrækkelig progesteronproduktion): 1-2 tabletter (5-10 mg) daglig fra dag 15-24 fra menstruationens første dag.

Behandling af endometriose:

1-4 tabletter (5-20 mg) daglig i 3-6 måneder.

Svært nedsat leverfunktion

Du må ikke tage Perlutex®.

Let eller moderat nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Brugsanvisning

Du bør tage Perlutex® med et glas vand.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Perlutex®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Perlutex® tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Hvis du har taget for mange Perlutex® kan du få symptomer, som dem angivet under "Bivirkninger".

Har du glemt at tage Perlutex®?

Hvis du har glemt at tage Perlutex®, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot fortsætte med sædvanlig dosis.

4. Bivirkninger

Perlutex® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Depression. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Voldsomme overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hævelse og smerter i et ben pga. årebetændelse. Kontakt læge.
- Blodprop i lungerne eller hjertet, der kan vise sig ved åndedrætsbesvær, smerter i brystet, hurtig puls, smerter eller hævelse i arme og ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden ikke kendt:

- Gulsot. Kontakt lægen.
- Blodprop i øjet. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Vægtændringer.
- Nervøsitet.
- Hovedpine.
- Blødningsforstyrrelser, uregelmæssige blødninger fra skeden, der kan være øgede, nedsatte eller helt udeblive.

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

- Nedtrykthed.
- Kvalme.
- Ømhed i bryster, brystspænding.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Søvnløshed.
- Svimmelhed.
- Bumser (akne).
- Hårtab.
- Udslæt.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Nedsat sexlyst.
- Øget behåring.
- Kløe, nældefeber,
- Mælkesekretion.
- Søvnighed.

Hyppigheden ikke kendt:

- Væskeophobning.
- Ændring i livmoderhalsens slim.
- Ufrugtbarhed.

Perlutex® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. ændringer i levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Tag ikke Perlutex® efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.

Opbevar Perlutex® utilgængeligt for børn.

6. Yderligere information

Afløver altid medicinrester på apoteket.

Perlutex® indeholder:

Perlutex® 5 mg tabletter.

Det virksomme stof i Perlutex® tabletter er:

Medroxyprogesteronacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, gelatine, magnesiumstearat, majsstivelse, talcum.

Pakningsstørrelser:

20 stk. og 50 stk.

Markedsføring i Danmark:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Revideret

Marts 2007

LEO



L E O



L E O