

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Condylone 5 mg/ml kutanopløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Condylone til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condylone
3. Sådan skal du bruge Condylone
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1. Virkning og anvendelse

- Condylone er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus.
- Det virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind i raske celler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condylone

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Condylone hvis:

- du har et betændt eller blødende sår nær vorten.
- du har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.
- du bruger anden medicin, der indeholder podophyllin (Wartec creme eller Wartec kutanopløsning).
- du er gravid eller ammer.
- du er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condylone (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Condylone i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand.

Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring.

Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger når du pensler et større område med Condylone.
Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden.

Brug af anden medicin sammen med Condylone

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol, må du ikke bruge Condylone uden først at tale med lægen.

Du kan bruge Condylone sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke bruge Condylone, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge Condylone.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Condylone påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Condylone

Dosering

Voksne: du skal påføre Condylone på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Du kan gentage behandlingen efter 4 dage, indtil vorterne er borte. Normalt skal du igennem 3-4 behandlinger.

- Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle.
- Påfør Condylone på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde.
- Brug en ny vatpind ved hver behandling.
- Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.
- Undgå at smøre uden for vorterne.
- Lad opløsningen tørre efter påsmøring.
- Vask ikke vorterne efter påsmøring.
- Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

Condylone flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig vride det den forkerte vej. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug.

Børn: du må kun bruge Condylone til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Condylone

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Condylone, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du kommer til at synke Condylone, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Sårdannelse omkring det behandlede område.
- Desuden kan der komme irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, se detaljer nedenfor. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sss@sst.dk

5. Opbevaring

Opbevar Condylone utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.
Brug ikke Condylone efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condylone indeholder:

- Aktive stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.

- Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning 60%, mælkesyre, ethanol 96 %.

Udseende og pakningsstørrelser

3,5 ml glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tel: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335

Fremstiller:

Takeda Austria GmbH
St Peter Strasse 25
A-4020 Linz
Østrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i juni 2015