

Isathal® 10 mg/g

Øjendråber, suspension til hund

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk**INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN**

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

LEO Laboratories Limited, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Isathal 10 mg/g øjendråber, suspension til hund

Fusidinsyre

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE**INDHOLDSSTOFFER**

Hvert gram øjendråber, suspension indeholder:

Aktivt stof:

Fusidinsyre 10,0 mg

(svarende til fusidinsyrehemihydrat 10,17 mg)

Hjælpestoffer:

Benzalkoniumchlorid 0,11 mg

Dinatriumedetat 0,5 mg

Steril, hvid/råhvid viskøs suspension.

INDIKATIONER

Til behandling af ukomplicerede øjeninfektioner hos hunde som følge af fusidinsyrefølsomme, grampositive bakterier.

KONTRAINDIKATIONERVeterinærlægemidlet må ikke anvendes til øjenproblemer forbundet med *Pseudomonas* spp.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, adjuvanter eller et eller flere af hjælpestofferne.

BIVIRKNINGER

Allergi eller overfølsomhed overfor det aktive stof eller et af indholdsstofferne kan forekomme.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk**DYREARTER**

Hund.

DOSERING, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej**Okulær anvendelse.**

En dråbe af veterinærlægemidlet dryppes i det berørte øje (konjunktivalsækken/indersiden af det nederste øjenlåg) to gange dagligt. Fortsæt behandlingen i mindst 5 dage og mindst 24 timer efter symptomfrihed.

Hvis der ikke er synligt klinisk respons 5 dage efter påbegyndelse af behandlingen, skal diagnosen revurderes.

**OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE**

Hvis dyret har ét inficeret øje, kan det være tilrådeligt at behandle begge øjne for at forhindre krydsinfektion. I sådanne tilfælde er det bedre at behandle det ikke inficerede øje først for at undgå overførsel af infektion via studsen.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er anført på emballagen efter forkortelsen, EXP.

Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Efter første åbning af den indre emballage: 1 måned.

SÆRLIGE ADVARSLERSærlige forsigtighedsregler for dyret:

Undgå kontaminering af indholdet under brug og undgå, at tubens studs kommer i direkte kontakt med øjet.

Den samme tube må kun bruges til behandling af samme hund.

Brug af lægemidlet skal baseres på identifikation og resistensbestemmelse af bakterier isoleret fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokale/regionale epidemiologiske oplysninger om målbakteriernes resistens.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Vask hænderne efter behandling.

Personer med kendt overfølsomhed overfor fusidinsyre bør undgå kontakt med det veterinære lægemiddel.

Drægtighed og diegivning:

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Overdosis:

Ingen kendte.

Uforligeligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

3. august 2021

ANDRE OPLYSNINGER

Tuber af 3 g og 5 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

