Indlægsseddel: Information til brugeren
Mucolysin® 200 mg, brusetabletter
acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
3. Sådan skal du tage Mucolysin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse
Mucolysin er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolycin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

Tag ikke Mucolysin:
- hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucolysin (angivet i afsnit 6).
- hvis du for nylig har hostet blod op.

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin:
- hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
- hvis du har eller har haft mavesår.
- hvis du er særlig følsom over for histamin.

Børn
Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 5 år uden lægens anvisning.

Vær opmærksom på følgende:
Mucolysin kan give alvolige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin.

Brug af andre lægemidler sammen med Mucolysin
Fortæl altid lægen eller apotekespersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge:
- hvis du er i behandling med oralt antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers mellemrum.
- hvis du tager hostestillende medicin.
- hvis du er i behandling med nitroglycerin (glyceryltrinitrat).
- hvis du får aktivt kul som modgift.
- hvis du er i behandling med carbamazepin. Når acetylcystein anvendes samtidig med carbamazepin, kan virkningen af carbamazepin mindskes på grund af det reducerede plasmaniveau af lægemidlet.

Du må ikke opløse Mucolysin sammen med andre lægemidler.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mucolysin. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke
Du kan tage Mucolysin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du bør ikke tage Mucolysin, hvis du er gravid eller ammer. Tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mucolysin indeholder natrium
Dette lægemiddel indeholder 99 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 5% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Mucolysin indeholder lactose
Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Mucolysin indeholder sorbitol
Dette lægemiddel indeholder mindre end 25 mg sorbitol pr. brusetablet.

3. Sådan skal du tage Mucolycin
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er
Voksne:
1 brusetablet (200 mg) 3 gange daglig.

Børn:
Børn over 5 år: 1 brusetablet (200 mg) 2 gange daglig.
Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 5 år.

Brugsanvisning:
Du skal opløse brusetabletten i et halvt glas vand.

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen.

Hvis du har taget for meget Mucolysin
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mucolycin
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger
Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter
- Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter
- Mundbetændelse, mavesmerter, diarre, opkastning, halsbrand og kvalme.
- Hovedpine og feber.
- Overfølsomhedsreaktioner (hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Susen for ørerne (tinnitus).

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter
- Blødning.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Mucolysin i original beholder for at beskytte mod fugt.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucolysin 200 mg brusetabletter indeholder:

- Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre, natriumhydrogencarbonat, vandfri natriumcarbonat, mannitol (E 421), vandfri lactose, saccharinnatrium (E 954), natriumcyclamat (E 952), natriumcitrat.
  Smag (citronaroma): Sorbitol (E 420), mannitol (E 421), gluconolacton, vandfri colloid silica og citrusolier.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Mucolysin er en hvid, rund brusetablet med en glat overflade.

Pakningsstørrelser

Plastrør indeholdende 15, 20, 25, 50 (2x25 styk) eller 100 (4x25 styk) brusetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 9. september 2025