

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**Passagen 1 mg/ml, næsespray**

Xylometazolinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Passagen uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Passagen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den seneste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Passagen
3. Sådan skal du bruge Passagen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Passagen næsespray virker ved at sammentrække blodårerne inde i næsen. Virkningen kommer i løbet af 5-10 minutter og holder i 10-12 timer.

Du kan bruge Passagen næsespray ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Passagen for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PASSAGEN**Brug ikke Passagen**

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for xylometazolinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- Hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion efter anvendelse af denne medicin
- Hvis du lider af grøn stær (glaucom)
- Hvis du har fået fjernet hypofysen, eller er blevet opereret i hjernen gennem næsen eller munden.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Passagen

- Du bør ikke anvende Passagen 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning.
- Anvend Passagen næsespray med forsigtighed, hvis du er følsom over for stoffer, der giver dig søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk.
- Behandlingen bør ikke vare længere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre, at næsetætheden vender tilbage eller forværres.
- Du bør kun anvende Passagen næsespray efter lægens anvisning, hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, stofskiftesygdomme, vandladningsproblemer pga. forstørret prostata, eller er i behandling med midler mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere).

Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller apoteket til råds.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du er i behandling med visse stoffer mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkningerne ved brug af Passagen næsespray blive forstærket. Hvis du er i tvivl, så spørg apoteket eller din læge.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Passagen efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge passagen efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Passagen næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om øvrige indholdsstoffer i Passagen næsespray

Passagen næsespray indeholder benzalkoniumchlorid som virker irriterende og kan give udslæt på huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PASSAGEN

Hvis din læge har ordineret Passagen til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er**Voksne og børn over 10 år:**

1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.

Børn:

Du må ikke bruge Passagen til børn under 10 år.

Brugsanvisning

1. Puds næsen. Fjern flaskens beskyttelseshætte.
2. Inden sprayen tages i brug første gang, pumpes et par gange, indtil Passagen næsespray kommer ud som en fin tåge. Herefter er sprayen klar til anvendelse.
3. Sprayen anbringes mellem fingrene. Der pumpes ved at trykke kraven ned mod flasken.
4. Bøj hovedet let forover.
5. Sprayens spids føres op i næseboret. Der pumpes kraftigt én gang, samtidig med at vejret trækkes gennem næsen. Gentag proceduren i det andet næsebor.

Hvis du har brugt for meget Passagen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Passagen, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering kan være nedsat legemstemperatur, sveden, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls og forhøjet blodtryk og eventuelt koma, især hos børn.

Hvis du har glemt at bruge Passagen

Passagen® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Hvis du har glemt at bruge Passagen, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige dosering.

Hvis du holder op med at bruge Passagen

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Passagen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals. Søg straks læge eller ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Tilstoppet næse, især efter hyppig eller langvarig brug.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Passagen utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Passagen ved almindelig temperatur.

Brug ikke Passagen efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Passagen 1 mg/ml, næsespray indeholder:

Aktivt stof: Xylometazolinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid; natriumdihydrogenphosphatdihydrat; dinatriumphosphatdodecahydrat; natriumedetat; benzalkoniumchlorid og rensset vand.

Passagens udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Passagen næsespray er en klar farveløs opløsning til anvendelse i næsen.

Pakningsstørrelser

Glasflaske med doseringspumpe, indeholdende 10 ml.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2012