

PROGRAM™ VET.

133 mg/dosis
oral suspension, enkeltdosisbeholder

Forebyggelse og behandling af loppeangreb hos kat

Bemærk at den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Læs indlægsseddelen nøje før anvendelse af produktet.

Hvad indeholder lægemidlet?

Oral suspension. 1 enkeltdosisbeholder (1,9 g) indeholder: 133 mg lufenuron. Øvrige indholdsstoffer: glycerol, mikrokrySTALLINSK cellulose, konserveringsmidler (methylparaben 2,3 mg, propylparaben 0,6 mg), vand.

Hvordan virker lægemidlet?

Det aktive stof lagres i kattens fedtvæv og afgives langsomt til blodet, hvorfra lopperne optager stoffet og overfører det til sine æg. Opbygningen af larve kitinstrukturen (hudskelettet), som er en typisk proces hos insekter, blokeres og udviklingen af loppernes afkom forhindres. Ingen levedygtige æg produceres f.o.m. 24 timer efter første dosis. Effekten opretholdes i en måned.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Information om produktet

Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1. th
2750 Ballerup

Fremstiller:

Elanco France S.A.S.,
F-68332 Huningue Cedex, Frankrig

Hvad bruges lægemidlet til?

Til forebyggelse og behandling af loppeangreb på katte som er forårsaget af katteloppen (*Ctenocephalides felis*) og hundeloppen (*C. canis*).

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses opkast og diarré. Disse symptomer er som regel af forbigående karakter.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte dyrlægen. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

Hvad skal man tænke på inden lægemidlet anvendes.

Program vet. virker ikke på voksne lopper. Er katten angrebet af mange lopper ved behandlingens start, anbefales det at anvende et middel mod voksne lopper de første 1 til 2 måneder.

Interaktioner

Interaktioner med andre lægemidler eller andre interaktioner er ikke observeret.

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes til drægtige og diegivende katte.

Doseringsanvisning

30 mg lufenuron/kg legemsvægt én gang om måneden. Den orale suspension skal gives sammen med foder.

Katte op til 4,5 kg gives 1 enkeltdosisbeholder/måned
Katte over 4,5 kg gives 2 enkeltdosisbeholdere/måned
Suspensionen blandes med en mindre mængde foder. Suspensionen kan også gives direkte i munden ved at klemme indholdet ud på den bageste del af kattens tunge efter fodring. Program vet. oral suspension kan gives til alle katte, inklusive drægtige og diegivende hunkatte samt killinger der får fast føde. Det er nødvendigt at alle katte og hunde (bortset fra ikke fravænnede killinger og hvalpe) i husstanden behandles. Til hund anvendes Program vet. tabletter. Kan anvendes i kombination med andre ektoparasitære midler med effekt på de voksne lopper.

Overdosering

Ingen symptomer rapporteret.

Opbevaring

Må ikke opbevares over 30 °C
Opbevares i original emballage
Anvendes inden udløbsdato som er angivet på pakningen.
Rester af lægemidlet tilbageleveres til apoteket.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Januar 2020