

Indlægsseddel: Information til brugeren

Prostasan®, bløde kapsler

Ekstrakt af savpalmefrugt

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen:

- Prostasan er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Prostasan.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 måneder, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prostasan
3. Sådan skal du tage Prostasan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Prostasan er et naturlægemiddel til brug ved vandladningsbesvær pga. godartet lettere forstørret prostata (blærehalskirtel), f.eks. hyppig vandladningstrang.

Inden du begynder at tage Prostasan, skal din læge have udelukket, at der er en anden årsag til dine gener.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Prostasan for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Prostasan

Tag ikke Prostasan

- hvis du er overfølsom over for savpalmefrugt eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Prostasan

I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Prostasan.

Tal med din læge, hvis:

- du har nedsat nyrefunktion.
- du har nedsat leverfunktion.
- du har anden alvorligere sygdom.

Du skal kontakte din læge, hvis

- du får det værre
- dine gener fortsætter uændret efter behandling i 3 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Prostasan

- Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Prostasan, eller Prostasan kan påvirke behandlingen med anden medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller læge, hvis du

- bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
- Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Prostan sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin/mineralpræparater eller kosttilskud.

Brug af Prostan sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Prostan sammen med mad. Du kan tage Prostan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage kapslerne med et glas vand.

Graviditet og amning

Prostan er kun til behandling af mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Prostan påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Prostan

Prostan indeholder sorbitol. Kontakt lægen før du tager kapslerne, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Prostan

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 kapsel dagligt. Du skal tage kapslen med et glas vand.

Børn

Prostan er ikke beregnet til børn.

Du skal tage kapslerne i ca. 3 måneder, før du kan vurdere virkningen af behandlingen.

Hvis dine gener fortsætter uændret efter behandling i 3 måneder, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.

Hvis du har taget for mange Prostan bløde kapsler

Kontakt læge, skadestue eller apoteket, hvis du har taget flere af Prostan bløde kapsler, end der står her, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen/emballagen/indlægssedlen med.

Hvis du har glemt at tage Prostan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Prostan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter)

- Lette gener fra maven eller tarmen
- Kløe og hudirritation

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette naturlægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Prostan ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Prostan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Prostan bløde kapsler indeholder:

- Aktiv bestanddel: Flydende ekstrakt af savpalmefrugt.
1 kapsel indeholder 320 mg flydende ekstrakt af savpalmefrugt, svarende til 2,88 – 3,84 g savpalmefrugt.
- Ekstraktet er fremstillet med ethanol 96% v/v.
- Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, glycerol, sorbitolopløsning 70% (E420), rød, gul, sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Prostan er en oval, mørkebrun, blød gelatinekapsel med gulbrun, klar olie.

Pakningsstørrelser

30 og 90 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

A.Vogel Danmark A/S
Håndværkervej 17b
8643 Ans By
Telefon: 87708790
e-mail: info@avogel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2020