

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Mildin® uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mildin®. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning af Mildin® og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mildin®
3. Sådan skal du tage Mildin®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Mildin®
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning af Mildin® og hvad du skal bruge det til

Mildin® er allergimedicin (antihistamin). Bruges til behandling af allergiske reaktioner som f.eks. høfeber og nældefeber.

Mildin® virker ved at lindre allergisymptomer der skyldes frigivelse af histamin, idet den hæmmer virkningen af histamin.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning,

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mildin®

Tag ikke Mildin®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mildin®

- Bør gives med forsigtighed til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.
- Patienter med sjældne arvelige tilstande, som medfører, at de ikke kan tåle mælkesukker, mangler enzymet laktase, der nedbryder lactose (Lapp laktase mangel), eller ikke kan optage visse kulhydrater (glukose-galaktose malabsorption), bør ikke få denne medicin.
- Hvis patienten skal have foretaget en hudprøvetest, bør behandling med Mildin® afbrydes mindst 48 timer før, da man ellers risikerer at forhindrer eller reducere ellers positive resultater af testen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemid-

ler samt stærke vitaminer og mineraler. Hvis flere lægemidler bruges samtidigt, kan de påvirke effekten af hinanden. Nedbrydningen af Mildin® afhænger af nogle af kroppens enzymer. Andre lægemidler, som påvirker disse enzymer, kan påvirke virkningen af Mildin®. Nogle af disse lægemidler er angivet herunder. Kontakt lægen, hvis du bruger et af følgende lægemidler samtidig med Mildin®, da dosis eventuelt skal justeres.

- Bupropion (lægemiddel til rygeafvænnning).
- Cimetidin (lægemiddel mod mavesår og sure opstød).
- Fluftenazin og moclobemid (mod psykoser og depression).
- Amiodaron, diltiazem og verapamil (mod uregelmæssig hjerterytme, forhøjet blodtryk og angina pectoris).
- Claritromycin og erythromycin (antibiotika).
- Fluconazol, itraconazol og ketoconazol (svampemidler).
- Lægemidler til behandling af HIV.
- Grapefrugtjuice.

Brug af Mildin® sammen med mad og drikke

Du kan tage Mildin® uafhængigt af mad. Tag ikke Mildin® med grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Mildin®, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Mildin®, da Mildin® udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mildin® kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og enden til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdstoffer i Mildin®

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Mildin®

Tag altid Mildin® som anført i denne indlægsseddel.

Tabletter indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år:

1 tablet (10 mg) én gang dagligt.

Børn 2-12 år gamle med legemsvægt mere end 30 kg:

1 tablet (10 mg) én gang dagligt.

Tabletter med styrken 10 mg er ikke hensigtsmæssig til børn med legemsvægt mindre end 30 kg.

Effekt og sikkerhed af Mildin® til børn under 2 år er ikke bestemt.

Nedsat leverfunktion:

Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning. En begyndelsesdosis på 10 mg hver anden dag anbefales til voksne og ligeledes til børn med en legemsvægt over 30 kg.

Hvis du har taget for mange Mildin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mildin® tabletter, end der står i denne indlægseddelse eller flere, end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Sygelig søvnighed, hurtig hjerterefrekvens og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Mildin®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemtede tablet.

4. Bivirkninger

Mildin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine.
Søvnighed.
Træthed.
Nervositet

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Øget appetit.
Søvnløshed.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi). En alvorlig bivirkning. Stop med at tage lægemidlet og kontakt lægen eller skadestuen
Svimmelhed
Kvalme, mundtørhed, mavekatar.
Udslæt, hårtab
Unormal leverfunktion
Hurtig puls, hjertebanken.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i indlægseddelen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Mildin®

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Mildin® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Yderligere oplysninger

Mildin® indeholder:

Aktivt stof: Loratadin 10 mg
Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, cellulose, mikrokrySTALLINSK, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Mildin® er en hvid, rund, flad tablet med delekrærv.

Pakningsstørrelser:

PVC/aluminum: 1, 5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 100, 105, 450 tabletter
Det er ikke sikkert, at alle pakningstørrelser markedsføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Denne indlægseddelse blev senest revideret den 09/2008

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm Generics A/S.