

DK INDLÆGSSEDEL

Febrivac ENT Vet.

Injektionsvæske, suspension
Inaktiveret vaccine mod virusenteritis

DMC

**NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN
INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,
SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS
FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller af batch-
frigivelse:

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Tyskland

Repræsentant:
IDT Biologika ApS
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Febrivac ENT Vet., injektionsvæske, suspension

**ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE
INDHOLDSSTOFFER**

1 ml (1 dosis) indeholder:

Aktivt stof

Minkparvovirus, stamme E-mink F1, inaktiveret mindst 10^4 TCID₅₀

Adjuvans

Aluminiumhydroxid 7,5 mg

INDIKATIONER

Vaccination mod virus enteritis hos mink.

KONTRAINDIKATIONER

Dyr i dårlig almentilstand bør ikke vaccineres. Drægtige dyr må kun vaccineres i nødstilfælde.

BIVIRKNINGER

Ofte ses på injektionsstedet en diffus hård eller blød hævelse (max. diameter 2,0 cm), der normalt forsvinder uden behandling i løbet af max. 6 uger. Der skal gøres opmærksom på at god vaccinations hygiejne og subkutan injektion skal overholdes.

Hvis De/du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De/du kontakte Deres/din dyrlæge.

DYREARTER

Mink.

**DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE
OG INDGIVELSESTIDPUNKT(E)**

Hvalpe vaccineres i 6-8 ugers alderen. Avlsdyr revaccineres årligt 1 måned før parring. Dosis: 1 ml subkutan.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Må ikke blandes med andre lægemidler/vacciner. Vaccinen må ikke fryses. Omrystes før anvendelse.

TILBAGEHOLDSESTID

Ikke relevant.



**EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
VEDRØRENDE OPBEVARING**

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten. Åbnede flasker skal anvendes inden for 8 timer. Opbevares koldt, 2 - 8 °C, men frostfrit.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Vaccination tidligere end 6 ugers alder kan medføre at materielle antistoffer forstyrrer aktiv immunisering via vaccination.

**EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED
BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER
AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek / leverandør eller til kommunal modtageordning.

DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

1. januar 2019

ANDRE OPLYSNINGER

Emballage: Plastflasker à 100 og 250 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.