

INDLÆGSSEDDEL:

Parvoruvax[®], injektionsvæske, suspension, til svin**1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER
AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR
BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA**Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaMenta ApS
Håndværkervej 32
6710 Esbjerg V

Ompakker ansvarlig for batchfrigivelse:

New Neopharm B.V.
9723 HB Groningen
Holland

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoruvax, injektionsvæske, suspension, til svin.

**3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE
INDHOLDSTOFFER**

1 dosis (2 ml) indeholder:

Aktive stoffer:

Inaktiveret porcint parvovirus K22 stamme min..... $\geq 2 \log_{10}$ HIU.
Inaktiveret *Erysipelothrix rhusiopathiae* serotype 2 ≥ 1 ELISA U

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid maks 4,2 mg

Hjælpestoffer:

Thiomersal maks $\leq 0,2$ mg
0,15M natriumklorid ad 2 ml
Renset vand

4. INDIKATIONER

Vaccination mod parvovirusinfektion og rødsyge hos svin.

5. KONTRAINDIKATIONER

Kun raske dyr bør vaccineres.

6. BIVIRKNINGER

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Vaccination kan i sjældne tilfælde fremkalde en overfølsomhedsreaktion, specielt hos dyr, der har forøget følsomhed over for rødsygekomponenten i vaccinen.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

7. DYREARTER

Svin.

**8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESVej**

Dosis: 2 ml. Vaccinen injiceres intramuskulært.

Basisvaccination: 1 dosis 2 gange, hhv. 4 uger og 1 uge før løbning.

Revaccination: 1 dosis 1 uge før løbning.

Lokal hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Stress af dyrene omkring vaccinationstidspunktet bør undgås.

Vaccinen omrystes før brug.

Må ikke blandes med andre lægemidler/vacciner.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 0 døgn.

**11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE
OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (+2°-8 °C). Beskyttes mod frost. Beskyttes mod lys.

Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes indenfor 24 timer. Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken.

12. SÆRLIGE ADVARSLERSærlige forholdsregler til brug hos dyr:

Antistoffer overført fra soen kan påvirke immunsvaret ved vaccination tidligere end 6-måneders alderen.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under drægtighed, dog først 3 uger efter bedækning.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Ingen særlige symptomer er observeret ved administration af 2 gange anbefalet dosis.

**13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED
BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER
AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

November 2021.

15. ANDRE OPLYSNINGERImmunologiske egenskaber:

Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod porcint parvovirus, som er årsag til "smitsom fosterdød" hos svin. Vaccinen inducerer tillige aktiv immunitet mod de hos svin hyppigst forekommende typer af *Erysipelothrix rhusiopathiae* (serotype 1a, 1b og 2).

Beskyttende immunitet indtræder ca. 2 uger efter basisvaccination. Den beskyttende effekt varer i mindst 6 måneder.

Pakningsstørrelser: 50 ml og 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Parvoruvax[®] er et registreret varemærke, der tilhører Ceva Santé Animale.