

Oxis® Turbuhaler® 4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver formoterol

0038505907

Oxis® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, som tilhører AstraZeneca Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis De vil vide mere.
- Lægen har ordineret Oxis® Turbuhaler® til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Medicinen kan være skadelig for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, der ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Oxis® Turbuhaler®'s virkning og hvad De skal bruge medicinen til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Oxis® Turbuhaler®
3. Sådan skal De bruge Oxis® Turbuhaler®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Oxis® Turbuhaler®
6. Yderligere information

1. Oxis® Turbuhaler®'s virkning og hvad De skal bruge medicinen til

Oxis® tilhører en lægemiddelgruppe, der er kendt som beta-2 agonister.

Oxis® indeholder et middel, der udvider bronkierne ved at afslappe musklerne i luftvejene. Luften kan så lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Inhalatoren bliver aktiveret af indåndingen.

Virkningen kommer i løbet af 1-3 minutter og varer i op til 12 timer.

De skal bruge Oxis® Turbuhaler® sammen med et binyrebarkhormon til at behandle vejrtræknings-besvær ved astma og til at forebygge astma, der bliver udløst af fysisk anstrengelse, når det ikke er nok at behandle med binyrebarkhormon.

De kan også bruge Oxis® Turbuhaler® til at lindre vejrtrækningsbesvær ved rygerlunger (KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Oxis® Turbuhaler®

Brug ikke Oxis® Turbuhaler® hvis:

- De er overfølsom over for formoterol (det virksomme indholdsstof i Oxis® Turbuhaler®) eller inhaleret lactose.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Oxis® Turbuhaler®

Tal med lægen hvis:

- De har alvorlige hjerte-karsygdomme, høj, evt. uregelmæssig puls eller De er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin.
- De har for højt stofskifte (Basedow).
- De har svulst i binyrerne (føokromocytom).
- De har stærkt forhøjet blodtryk.
- De har udposninger på blodkar (aneurismer).
- De får åndedrætsbesvær lige efter brug af Oxis® Turbuhaler®.
- De har diabetes. De bør få blodglukose kontrolleret regelmæssigt, da behandlingen kan få blodglukose til at stige.
- De har for lavt kalium i blodet. Ved en svær astma, kan kalium i blodet blive for lavt, især hvis De også tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.
- De har svært nedsat lever- eller nyrefunktion.

De skal normalt have været i behandling med anden astmamedicin, inden De får Oxis® Turbuhaler®.

De skal normalt være i behandling med binyrebarkhormoner til inhalation, når behandlingen med Oxis® Turbuhaler® begynder, og De bør fortsætte med behandlingen med binyrebarkhormon samtidig med behandlingen med Oxis® Turbuhaler®.

Tal med lægen, hvis De tager ekstra Oxis® eller anden anfaldsmedicin mere end 2 gange om ugen.

Brug af anden medicin

De kan bruge Oxis® Turbuhaler® sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De er i behandling med medicin mod:

- Depression (tricykliske antidepressive midler. Der er risiko for forstyrrelser i hjerterytmen).
- Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere. De kan nedsætte eller helt ophæve virkningen af Oxis® Turbuhaler®. Spørg lægen).
- Grøn stær (visse øjendråber - kan nedsætte eller helt ophæve virkningen af Oxis® Turbuhaler®). Spørg lægen.

- Forstyrrelser i hjerterytmen eller hjertesvigt (digoxin og visse andre midler, f.eks. chinidin, disopyramid og prokainamid – der er risiko for forstyrrelser i hjerterytmen). Spørg lægen.
- Kramper (spasmer) i mave eller tarm.
- Eller hvis De er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende midler eller andre midler til behandling af astma (f.eks. theophyllin) (kan påvirke blodets kaliumindhold, se også afsnit "Vær ekstra forsigtig med at bruge Oxis® Turbuhaler®"), midler mod allergi, nældefeber eller høfeber (terfenadin, astemizol, mizolastin – der er risiko for forstyrrelser i hjerterytmen) samt visse antibiotika (erythromycin - der er risiko for forstyrrelser i hjerterytmen).

Fortæl lægen, at De er i behandling med Oxis® Turbuhaler® hvis De skal bedøves i forbindelse med en undersøgelse eller operation.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Oxis® Turbuhaler®.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Oxis® Turbuhaler® efter aftale med lægen.

Amning:

De bør ikke bruge Oxis® Turbuhaler®, hvis De ammer, da det måske bliver udskilt i modermælken. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oxis® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Oxis® Turbuhaler®

Oxis® indeholder lactose (450 mikrogram). Denne lille mængde giver normalt ikke problemer for dem, der ikke kan tåle lactose.

Kontakt lægen, inden De bruger Oxis® Turbuhaler®, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De bruge Oxis® Turbuhaler®

Brug altid Oxis® Turbuhaler® nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Voksne (over 18 år):

Astma:

De skal bruge Oxis® Turbuhaler® sammen med inhalationssteroid (binyrebarkhormon) til vedligeholdelsesbehandling.

Lindrende behandling: 1-2 sug til lindring af akut åndenød.

Regelmæssig dosis: 1-2 sug 1 eller 2 gange dagligt.

Nogle har brug for 4 sug 1 eller 2 gange dagligt.

De må højst tage 8 inhalationer (36 mikrogram) om dagen.

Forebyggelse af anstrengelsesudløst astma:

2 sug før anstrengelse.

Ved regelmæssig brug bør De ikke tage mere end 8 sug om dagen.

De kan dog på enkelte dage tage op til højst 12 sug inden for 24 timer, hvis det er nødvendigt. De må ikke tage mere end højst 6 sug ad gangen.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.

Tal med lægen, hvis De skal bruge flere doser end angivet her i mere end 2 dage om ugen, da det kan tyde på, at behandlingen måske skal ændres.


Forebyggelse af anstrengelsesudløst astma:

1 eller 2 sug for anstrengelse.
Den daglige dosis bør ikke overskride 4 sug.
Børn kan dog enkelte dage tage op til 8 sug inden for 24 timer.
Børn bør ikke tage mere end 2 sug ad gangen.


De må normalt ikke bruge Oxis® Turbuhaler® til børn under 6 år.

Brugsanvisning

Sådan skal De bruge Oxis® Turbuhaler®



1. Skru beskyttelseshætten af.




2. Hold Oxis® Turbuhaler® lodret med det farvede bundstykke nedad. Drej bundstykket én gang frem og tilbage.



3. Pust ud. NB! De må ikke puste ud i Turbuhaler®.

4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring det. Tag så dyb og kraftig en indånding som muligt gennem munden.



5. Tag Oxis® Turbuhaler® fra munden og ånd langsomt ud.

6. Hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis, så gentag behandlingen fra punkt 2-5.

7. Skru beskyttelseshætten på.

Følg altid brugsanvisningen nøje og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.

De må ikke tygge eller bide i mundstykket eller bruge Oxis® Turbuhaler®, hvis den er i stykker eller mundstykket har løsnet sig.

Oxis® Turbuhaler® er forsynet med en dosisindikator.



Dosisindikatoren tæller antallet af klik. Når det røde mærke kommer til syne øverst i dosis-indikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Oxis® Turbuhaler® tom og den kasseres.

Der er et tørremiddel i bunden af beholderen. Den lyd, der kommer, når Oxis® Turbuhaler® bliver rystet, stammer fra tørremidlet.

Ved korrekt brug afgiver Oxis® Turbuhaler® altid én dosis. De kan ofte hverken smage eller mærke dosis. Selvom De drejer bundstykket mere end én gang, er der kun én dosis klar, og overdosering vil ikke finde sted. Dosisindikatoren tæller dog hver drejning, og dosisindikatoren vil derfor vise rødt – og dermed tom for tidligt (se ovenfor). Drej derfor kun det farvede bundstykke 1 gang frem og tilbage før brug.

De må ikke rengøre mundstykket med vand, da fugt får inhalationspulveret til at klumpe sammen. Rengør mundstykket med en tør klud 2-3 gange om ugen.

Hvis De har brugt for meget Oxis® Turbuhaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Oxis® Turbuhaler®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er rysten, hovedpine, hjertebanken. Desuden kan der komme kvalme, opkastning, høj puls, forstyrrelser i hjerterytmen.

Hvis De har glemt at bruge Oxis® Turbuhaler®

Hvis De kun har glemt én dosis, skal De ikke tage en ekstra dosis. De skal bare følge den normale dosering, og tage den næste dosis på det planlagte tidspunkt. De må ikke tage dobbelt dosis. Hvis De er i tvivl eller har glemt flere doser, skal De søge læge.

Hvis De holder op med at bruge Oxis® Turbuhaler®

De bør kun ændre, afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Oxis® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Meget hurtig og uregelmæssig puls, astmalignende anfald og vejrtrækningsbesvær (bronkospasme) lige efter brug af Oxis® Turbuhaler®. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Smerter i brystet, hjertekrampe. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, rysten, hjertebanken.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- Muskelkrampe, uro, rastløshed og søvnforstyrrelser.
- Hjertebanken og hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, nældefeber og kløe.
- Kvalme.
- Kalium. For højt kalium i blodet (kan give muskelsvaghed, forvirring, talebesvær, lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme, evt. hjertestop). Det kan være alvorligt. Tal med lægen. For lavt kalium i blodet (kan give svaghed og nedsat kraft i musklerne, lammelser, forstyrrelser i hjertets rytme, evt. hjertestop). Det kan være alvorligt, hvis kalium er meget lavt. Tal med lægen. De mærker ikke noget, hvis kalium kun er lidt for højt eller lavt.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- For højt blodsukker. Kan give hyppig vandladning, tørst og træthed. For højt blodsukker kan blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svingende blodtryk.
- Smagsforstyrrelser og svimmelhed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Oxis® Turbuhaler®

Opbevar Oxis® Turbuhaler® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Oxis® Turbuhaler® ved over 30° C.

Skru altid beskyttelseshætten tæt på efter brug.

Brug ikke Oxis® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Oxis® Turbuhaler® indeholder:

Det virksomme indholdsstof: Formeterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/dosis. Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Oxis® Turbuhaler® er en inhalator, der indeholder et hvidt inhalationspulver.

Pakningsstørrelser:

Turbuhaler med 60 doser og 180 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2007