

Indlægsseddel

Geavir® creme 5 %

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Geavir
3. Sådan skal du bruge Geavir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Geavir er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus. Du kan bruge Geavir til forkølelsessår på mund og læber samt i ansigtet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Geavir

Brug ikke Geavir hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Geavir.

Særlige forholdsregler

Du må ikke bruge Geavir creme på slimhinder (f.eks. i munden eller øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er uskadelig, hvis du får lidt af den i munden og synker den.

Hvis du har en kronisk sygdom, der gør dig lettere modtagelig for betændelser, er det ikke sikkert at behandling med Geavir creme er nok. Tal med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Geavir sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Geavir under graviditet.

Amning

Geavir® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Du kan amme, selv om du bruger Geavir.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Geavir

Geavir indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Geavir

Geavir bør altid bruges i nøje overensstemmelse med lægens instruktioner. Du bør konsultere din læge eller apoteket, hvis du er usikker.

Voksne og børn over 2 år:

Brug cremen 5 gange dagligt i 5-10 dage.

Begynd behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. Hav altid Geavir creme med, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning til andre dele af kroppen eller i øjnene skal du undgå at berøre såret unødvendigt eller lade andre gøre det.

Du bør ikke bruge Geavir til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har du brugt for meget Geavir?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Geavir, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Geavir.

Har du glemt at bruge Geavir?

Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil.

4. Bivirkninger

Geavir kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mild udtørring og afskalning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Forbigående svie eller brændende fornemmelse, kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Rødme i huden, kontakteksem.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Geavir® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Geavir utilgængeligt for børn.

Brug ikke Geavir efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere Information

Aflever altid medicinrester på apoteket

Geavir creme indeholder:

Det aktive indholdsstof er aciclovir.

De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, hvid blød paraffin, paraffinolie, glycerolfomal, glycerolmonostearat 40-50, stearinsyre, trolamin, rensset vand.

Pakningsstørrelse:

Tube: 2g, 2,5g og 3g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller:

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Senest revideret 24. april 2007