

Lidcosal Vet 16,2 mg/ml

Laryngofaryngealspray, opløsning til katte

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Holland

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Kroatien

REPRÆSENTANT

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Danmark

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Lidcosal Vet 16,2 mg/ml laryngofaryngealspray,

opløsning til katte

Lidocain

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE**INDHOLDSSTOFFER**

Aktivt stof:

Lidocainhydrochloridmonohydrat 20 mg/ml

(svarende til lidocain 16,2 mg)

Hjælpestoffer:

Chlorocresol

1 mg/ml

Klar, farveløs væske.

INDIKATIONER

Lokalbedøvelse af larynxslimhinden hos katte

for at lette endotrakeal intubation ved at

forhindre stimulering af larynxrefleksen.

KONTRAIKATIONER

Må ikke anvendes til dyr, der er hypovolæmiske

eller udviser hjerteblok. Må ikke anvendes

i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive

stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer

bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der

ikke allerede er anført i denne indlægsseddel

eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke

har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede

bivirkninger via det nationale bivirkningssystem

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

DYREARTER

Katte.

DOSERING, ANVENDELSESMÅDE OG**INDGIVELSESVej**

Til laryngofaryngeal anvendelse.

Hvert past (ca. 0,14 ml) indeholder ca. 2,8 mg

lidocainhydrochloridmonohydrat, hvilket svarer til

2,27 mg lidocain. Vent 30-90 sekunder før

intubation, så strubehovedet er afslappet.

Bemærk, at aktuatoren skal tages lodret ud af

sprøjtepumpen og ikke skråt for at sikre, at

stiften ikke bliver beskadiget.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have

foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid

dyrlægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Før brug skal pumpen primes, indtil væske frigives.

Det anbefales at spraye minimum 4 gange for at

klargøre flasken inden første brug, og mindst

2 gange for at klargøre igen, hvis den ikke har

været brugt i 7 dage eller længere.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER**VEDRØRENDE OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den

udløbsdato, der står på etiketten og ydre

emballage efter EXP. Udløbsdatoen refererer til

den sidste dag i den pågældende måned.

Når det er åbnet, brug inden for 3 måneder.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Skal anvendes med forsigtighed i tilfælde af

nedsat leverfunktion og/eller hjerteinsufficiens.

Det anbefales at kuldesterilisere dysen mellem

hver brug for at undgå spredning af infektion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der

administrerer lægemidlet:

- Lidocain og chlorocresol kan forårsage (allergiske) overfølsomhedsreaktioner. Personer med kendt overfølsomhed over for disse stoffer bør undgå kontakt med produktet.
- Utilsigtet eksponering over for dette produkt kan medføre lokale virkninger, såsom følelseløshed og systemiske virkninger, såsom svimmelhed eller dødsghed. Utilsigtet eksponering, især oral, øjen- og indåndingseksponering, bør undgås.
- Brug handsker ved håndtering af produktet og vask eventuelle eksponerede områder efter brug. Ved utilsigtet eksponering af øjnene skal der skylles med vand.
- Søg lægehjælp og vis etiketten til lægen i tilfælde af alvorlige eller udvidede reaktioner.
- Lidocain kan danne genotoksiske og mutagene metabolitter hos mennesker. Disse metabolitter kan også medføre, i langvarige toksikologiske studier af rotter, kræftfremkaldende virkninger ved høje doser.

Drægtighed og diegivning:

Laboratorieundersøgelser hos mus har vist tegn

på foetotoksiske virkninger ved høje doser.

Der er ikke udført sikkerhedsstudier med

produktet på gravide hunkatte.

Må kun anvendes i overensstemmelse hermed

til vurdering af fordele/risiko af den ansvarlige

dyrlæge.

Interaktion med andre lægemidler og andre

former for interaktion:

Ingen kendte.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER**VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE****LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA****SÅDANNE**

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald

heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF**INDLÆGSSEDLEN**

06/2021

ANDRE OPLYSNINGER

Til dyr.

Kræver recept.

Pakke mængde: 10 ml.