

Front

12 mm

42 mm

Imaverol[®] vet. 100 mg/ml



koncentrat til kutanopløsning til kvæg, hest og hund

1. **NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Audevard,
37-39 rue de Neuilly,
92110 Clichy
Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Lusomedicamenta
Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A
Estrada Consiglieri Pedroso, n°66, 69-B, Barcarena, 2730-055
Portugal

2. **VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN**

Imaverol vet.

3. **ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER**

1 ml indeholder:

Aktivt stof: 100 mg enilconazol.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 20 og sorbitanlaurat.

4. **INDIKATIONER**

Til behandling af hudinfektioner med enilconazolfølsomme svampe hos kvæg, hest og hund.

5. **KONTRAINDIKATIONER**

Ingen.

6. **BIVIRKNINGER**

I sjældne tilfælde ses opkast, nedsat ædelyst, sløvhed og usikre bevægelser. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.lmst.dk

7. **DYREARTER**

Kvæg, hest og hund.

8. **DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ**

Kun til anvendelse på huden. Opblandes og administreres i tilstrækkeligt ventilerede omgivelser. Koncentratet fortyndes ved at tilsætte 1 del koncentrat til 50 dele varmt vand. Herved opnås en 2 mg/ml opløsning. Hudinfektioner angriber hårsækkene. Derfor fjernes eventuelle sårskorper med en hård børste gennemvædet med den færdigblandede opløsning. For at behandle subkliniske infektioner, tilrådes det at behandle hele dyret første gang. Kvæg: Afhængigt af infektionens sværhedsgrad, bør kvæg behandles 3-4 gange med 3 dages mellemrum. Dyret bør enten vaskes eller sprayes med den færdigblandede opløsning. Alternativt anvendes en højtryksrensere. Hest: Læsioner og det omgivende hudområde vaskes med den færdigblandede opløsning 4 gange med 3 dages mellemrum. Hund: Dyret vaskes med den færdigblandede

Mat.ID.Code

2 mm

12 mm


12 mm

Mat.ID.Code

2 mm

42 mm

12 mm



opløsning 4 gange med 3 dages mellemrum. Der grides mod hårretningen for at sikre, at huden gennemvædes tilstrækkeligt. Det anbefales, at langhårede hunde klippes inden behandling påbegyndes. Alternativt kan hunden dyppes i et bad med den færdigblandede opløsning.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Imaverol vet. skal fortyndes inden anvendelse.

Fortynding:

1 del koncentrat til 50 dele varmt vand (1:50).

Behandling:

Forud for behandlingen fjernes eventuelle sårskorper med en børste eller en svamp, som er gennemvædet med den færdigblandede opløsning. Behandlingen foretages ved at vaske hele dyret med fortyndingen. Behandlingen foretages med en børste eller svamp.

Ved første behandling tilrådes det at behandle hele dyret. Efterfølgende behandlinger kan begrænses til hudområder omkring synlige læsioner.

Kutanopløsningen skal blive "siddende" i pelsen og ikke vaskes ud.

Imaverol vet. må ikke blandes med andre produkter.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 3 døgn.

Mælk: 1 døgn.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Anv. for. Holdbarhed efter først åbning af den indre emballage: 3 måneder.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Kun til udvortes brug. Skyl ikke dyret efter vask. Det anbefales at tørre pelsen med en føntørret (kold luft) for at forhindre, at opløsningen slikkes af.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Personligt beskyttelsesudstyr i form af gummihandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes ved håndtering af lægemidlet. Hvis koncentratet kommer i kontakt med huden, fjernes forurenede tøj omgående og huden vaskes grundigt med sæbe og vand. I tilfælde af utilsigtet øjenkontakt, skylles grundigt med rindende vand. Hvis irritationen vedvarer søges straks lægehjælp. I tilfælde af utilsigtet indtag, skylles munden med rigelige mængder rindende vand og lægehjælp søges. Vask hænder efter brug.

Drægtighed og diegivning:

Imaverol vet. kan anvendes under drægtighed og diegivning.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

Januar 2019

M210N.V2



Back