

INDLÆGSSEDDEL:

Tailan, pulver til opløsning i drikkevand, til svin og fjerkræ

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaMénta ApS
Håndværkervej 32
6710 Esbjerg V

Ompakker ansvarlig for batchfrigivelse:

New Neopharm B.V.
9723 HB Groningen
Holland

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tailan, pulver til opløsning i drikkevand, til svin og fjerkræ

3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 g indeholder 1 g tylosintartrat.

4. INDIKATIONER

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier. Se afsnit 12 vedrørende svinedysenteri.

5. KONTRAINDIKATIONER

Tailan bør ikke anvendes i besætninger, der leverer æg til konsum.

6. BIVIRKNINGER

Hos svin er observeret diarré, kløe, rødmen af huden, hævelse i endetarmen og prolaps.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Til svin og fjerkræ.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej

Til opløsning i drikkevand.

Kyllinger og kalkuner: Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5 g/l.

Grise: 5-10 mg/kg legemsvægt. Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5-1 g/8l.

Anvend ikke den færdigblandede opløsning i mere end 24 timer.

Behandlingsvarigheden må ikke være over 3 uger.

Vand, der indeholder tylosintartrat, må ikke efterlades eller bortskaffes, således at dyr, som ikke er i behandling eller vilde dyr har adgang hertil. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Pulver til opløsning i drikkevand.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: Svin: 1 døgn.

Fjerkræ: 2 døgn.

Æg: 30 dage.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Opbevaringstid efter første åbning: Anvendes med det samme.

Opbevaringstid efter rekonstituering ifølge anvisning: 24 timer.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Drægtighed og diegivning:

Kan anvendes.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug:

Skal omgås med forsigtighed pga. risiko for allergi.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Der er påvist høj andel af *in vitro*-resistens i europæiske stammer af *Brachyspira hyodysenteriae*, hvilket er tegn på, at produktet ikke vil være tilstrækkelig effektivt mod svinedysenteri.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet:

I tilfælde af kontakt med huden, vask grundigt med sæbe og vand. Hovedpine, astma, hoste, kløe i/omkring øjne, mavepine og irriterede luftveje kan ses efter kontakt med produktet.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OMNØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGGSSEDLEN

Juli 2020

15. ANDRE OPLYSNINGER

Tailan fås i pakninger med 100 g og 1000 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Tailan® er et registreret varemærke, der tilhører Eli Lilly and Company.