

# Indlægsseddel Norodyl Vet, 100 mg tabletter til hunde

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

## NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen  
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan, Irland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse  
Norbrook Laboratories Ltd  
105 Armagh Road, Newry, Co. Down,  
BT35 6PU, Northern Ireland

Repræsentant:  
ScanVet Animal Health  
Kongevejen 66  
3480 Fredensborg

## VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Norodyl Vet., 100 mg tabletter til hunde

Paracarp 100mg Tabletter til hunde  
(Tyskland)  
Norocarp 100mg Tabletter til hunde  
(Andre CMS)

## ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

**Aktivt stof:**  
Carprofen 100 mg

**Hjælpestof:**  
Tartrazin (E102)  
Mikrokrystallinsk cellulose,  
Lactosemonohydrat  
Croscarmellosematrik  
Povidon K30  
Natriumlaurylsulfat  
Magnesiumstearat

## INDIKATIONER

Hunde: Reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskulo-skeletale sygdomme og degenerativ ledsygdom.

Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ smerte.

## KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til katte.  
Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver.  
Bør ikke anvendes hos hvalpe der er yngre end 4 måneder.  
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.  
Bør ikke anvendes til hunde, der lider af hjerte-, lever- eller nyrelidelser, hvor der er mulighed for gastrointestinal ulceration eller blødning, eller hvor der er tegn på bloddyskrasi.

## BIVIRKNINGER

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID, såsom opkastning, tynd afføring/diarre, Fækalokkult blødning, nedsat appetit og letargi er blevet rapporteret. Disse bivirkninger opstår oftest i første uge af behandlingen, og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved ophør af behandlingen, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige. I tilfælde af bivirkninger, bør behandlingen ophøre og dyrlægen kontaktes. Som med andre NSAID, er der risiko for sjældne idiosynkratiske nyre- eller leverbivirkninger.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted. [www.sundhedsstyrelsen.dk](http://www.sundhedsstyrelsen.dk)

## DYREARTER

Hund

## DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej

Til oral administration.  
4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag.  
En startdosis på 4 mg carprofen per kg legemsvægt gives som en enkelt daglig dosis eller opdelt i to lige store doser.  
Den daglige dosis kan reduceres, afhængigt af klinisk respons.

Varighed af behandlingen vil afhænge af responset.

Langtidsbehandling bør foregå under regelmæssig tilsyn af dyrlæge.  
Er der præoperativt givet parenteral og antiinflammatorisk behandling med et carprofen produkt, kan denne forlænges ved at følge op med Norodyl tabletter 4 mg/kg dagligt i op til 5 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

## OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Delte tabletter returneres til blister og bruges indenfor 48 timer.  
Overskrid ikke anbefalet dosis.

## TILBAGEHOLDESESTID

Ikke relevant

## EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på blister, etiketten eller æsken efter Anv. før.

Må ikke opbevares over 25 °C  
Blister opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

## SÆRLIGE ADVARSLER

### Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse til gamle hunde kan medføre øget risiko. Hvis en sådan anvendelse ikke kan undgås, bør sådanne hunde behandles med en reduceret dosis under nøje klinisk overvågning. Undgå anvendelse hos dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive hunde, da der er en potentiel risiko for forøget nyretoksicitet. NSAID kan forårsage hæmning af fagocytose, hvorfor der i tilfælde af behandling af inflammatorisk tilstand associeret med bakteriologisk infektion samtidig bør iværksættes passende, antimikrobiel terapi.

### Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion.

Andre NSAID og glukokorticoider, bør ikke administreres samtidig eller inden for en periode på 24 timer af hinanden.  
Nogle NSAID kan være meget stærkt bundet til plasmaproteiner og konkurrerer

med andre stærkt bundne lægemidler, som kan medføre toksiske effekter.  
Samtidig medicinering med potentielle nyretoksiske lægemidler bør undgås.

### Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke undersøgt. Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver.

### Overdosering

Overskrid ikke anbefalet dosis.  
Der findes ingen specifik antidot mod overdosering med carprofen, men almen symptomatisk behandling, bør igangsættes som ved klinisk overdosering med NSAID.

### Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og Indlægssedlen bør vises til lægen.  
Vask hænder efter håndtering af lægemidlet.

### EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

### DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

Januar 2019

### ANDRE OPLYSNINGER

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for markedsføringstilladelsen, hvis de ønsker yderligere oplysninger om dette veterinære lægemiddel.

018019104

  
**Norbrook**<sup>®</sup>