

**Indikationer**

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne, nedsat nyre- eller leverfunktion. Må ikke bruges samtidig med præparater, der indeholder jern.

Bivirkninger

Mave-tarmforstyrrelser. Kan give misfarvning af tandemaljen hos dyr, hvor tandanlægget endnu ikke er afsluttet. Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt her bedes De kontakte Deres dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.

Særlige forsigtighedsregler og advarsler

Heste og drøvtyggende kvæg bør ikke behandles. Bør ikke anvendes til hunde eller katte under 2 uger. Bør ikke gives til tævehunde eller hunkatte de sidste 2 uger af drægtigheden.

Tilbageholdelsestider

Slagtning: 30 døgn. Æg: 30 døgn.

Dosering

Gives opløst i drikkevand eller opblandes i foderet.

Doseres daglig i 3-5 dage. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet nedenfor. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Kalv og gris

Tarmbetændelse: 1 g pulver/20 kg legemsvægt.

Systemisk behandling: 1 g pulver/8 kg legemsvægt.

Hund, kat, mink og fjerkræ

1 g pulver/4 kg legemsvægt. Bør ikke gives sammen med mælkeprodukter eller præparater indeholdende store mængder calcium, magnesium, aluminium eller jernsulfat (giver nedsat virkning).

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdbarhed efter anbrud: 1 måned. Oxytetracyclin i vandig opløsning er kun holdbar i 24 timer. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.

Affaldshåndtering

Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Fremstillere

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgien

500 g

Vnr 48 73 40

Terramycin® vet. 20 %

oxytetracyclin

Pulver til oral opløsning

Til dyr – kræver recept

1 g indeholder 200 mg oxytetracyclinhydrochlorid
Hjælpestoffer: vinsyre, lactose.

Måleske ilagt. 1 strøget mål svarer til 5 g pulver eller
ca. 1000 mg aktivt stof.

Til kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ, hund og kat.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zoetis Finland Oy, Helsinki, Finland MTnr 6391

8702384
A73202-3**zoetis**