

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Eeze uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Eeze.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre inden 3 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Eeze
3. Sådan skal De bruge Eeze
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

Eeze 4 % kutanspray, opløsning

DICLOFENACNATRIUM

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Eeze tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Eeze dæmper betændelse og er smertestillende.

De kan bruge Eeze til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Eeze for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

Eeze kutanspray er en væske, der får en gelignende konsistens, når De sprayer den på huden.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE EEZE

Brug ikke Eeze, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
- er gravid i 7.-9. måned
- er overfølsom (allergisk) over for soja eller jordnødder (peanuts).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Eeze

Vær opmærksom på, at

- De ikke må bruge Eeze på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem
- Eeze ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis De ved et uheld får sprayopløsning i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen
- hvis De får udslæt, skal De stoppe behandlingen med Eeze
- Eeze kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen
- De ikke må tage solbad, og De ikke må opholde Dem længe i solen, mens De bruger Eeze
- De ikke må bruge Eeze under tætsluttende forbindelse
- hvis De har eller har haft astma eller allergi, kan Eeze udløse astmalignende anfald
- ældre oftere får bivirkninger af Eeze og anden smertestillende medicin (NSAID)
- hvis De tager anden medicin mod smerter (NSAID), er risikoen for bivirkninger større
- De ikke må bruge Eeze på store hudområder og i længere tid
- Eeze kan påvirke Deres nyrer, selvom det smøres på huden
- hvis De er i behandling med medicin mod betændelse (metronidazol) eller Antabus, så tal med lægen, da Eeze indeholder små mængder alkohol
- Eeze indeholder propylenglycol, der kan irritere huden
- Eeze indeholder pebermynteolie, der kan give allergiske reaktioner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan få flere bivirkninger, hvis De samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande (Acetylsalicylsyre og andre NSAID).

Eeze indeholder alkohol. Hvis De er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må De ikke tage Eeze uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, inden De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Eeze efter aftale med lægen. De må ikke bruge Eeze de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge Eeze efter aftale med lægen. De må ikke bruge Eeze på brysterne eller på store hudområder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eeze påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Eeze kutanspray

Eeze indeholder propylenglycol og pebermynteolie, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner.

Eeze indeholder sojalecithin. De må ikke bruge Eeze, hvis De er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja.

Eeze indeholder alkohol (ethanol). Hvis De er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må De ikke tage Eeze uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE EEZE

Eeze må kun anvendes til udvortes brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Gnid Eeze kutanopløsning svarende til 4-5 pumpedoser ind i huden 3 gange daglig. Antallet af pumpedoser afhænger af størrelsen af det berørte område. De må højst bruge 15 pumpedoser om dagen.

Børn

De må kun bruge Eeze kutanspray til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre De behandler hænderne. Vent indtil Eeze er tørret ind, før De dækker huden med tøj eller forbindelse. Pas på, da sprayen kan misfarve Deres tøj, hvis den ikke er tør.

ESG-DK003

Stop behandlingen med Eeze, når symptomerne (smerte og hævelse) forsvinder. Brug ikke Eeze i mere end 14 dage uden at tale med lægen. Hvis De ikke har fået det bedre efter 3 dage, så tal med Deres læge.

De må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger.

Hvis Deres læge har ordineret Eeze til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis De har brugt for meget Eeze kutanspray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Eeze, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har glemt at bruge Eeze

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart, De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Eeze

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Eeze kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen af huden og irritation af huden.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

- Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
- Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Betændelse i huden med blærer.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Øget følsomhed af huden for lys.

Afbryd behandlingen med Eeze, hvis De får hududslæt af enhver art.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- De kan opbevare Eeze ved almindelig temperatur.
- Hvis De køler eller fryser Eeze, kan der komme bundfald. Bundfaldet forsvinder ved omrystning og opvarmning til almindelig temperatur.
- Brug ikke Eeze efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Anvend Eeze inden 6 måneder efter første anvendelse af flasken.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Eeze 4 %, kutanspray, opløsning indeholder

- Aktivt stof: Diclofenacnatrium.
- Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, sojalecithin, ethanol, dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumedetatdihydrat, propylenglycol, pebermynteolie, ascorbylpalmitat, saltsyre, natriumhydroxid og rensset vand.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Eeze kutanspray er en gyldengul, transparent opløsning, der bliver til en slags gel, når den sprayes på huden.

Pakningsstørrelser

Hver flaske indeholder 12,5 g eller 25 g opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, SE-114 26 Stockholm, Sverige.

Tlf: +46 8 31 68 00

Fax: +46 8 31 68 40

info@antula.se

Fremstiller

Pharbil Walthrop GmbH, DE-45731 Walthrop, Tyskland