

Zyx citron 3mg sugetabletter

Zyx mint 3mg sugetabletter

BENZYDAMINHYDROCHLORID

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Zyx citron/Zyx mint sugetabletter uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for sugetabletterne.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Zyx citron/Zyx mints virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zyx citron/Zyx mint
3. Sådan skal du tage Zyx citron/Zyx mint
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Zyx citron/Zyx mint
6. Yderligere oplysninger

1. ZYX CITRONS/ZYX MINTS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Zyx citron/Zyx mint bruges mod smerter og irritation (rødmen, opsvulmning, synkebesvær) i mund og svælg. Sugetabletterne har desuden en moderat lokalbedøvende virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZYX CITRON/ZYX MINT

Tag ikke Zyx citron/Zyx mint

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Zyx citron/Zyx mint

- hvis du har phenylketonuri (stofskifteforstyrrelse forårsaget af en arvelig mangel på det enzym, som omdanner aminosyren phenylalanin til thyroxin).
- hvis du er overfølsom over for salicylsyre eller andre NSAID'er. Da frarådes det at anvende benzydaminhydrochlorid.
- hvis du lider eller har lidt af bronkial astma, da der kan forekomme bronkospasme.

I ganske få tilfælde kan sår i mund eller svælg være et tegn på alvorligere sygdomme. Skulle symptomerne ikke forsvinde i løbet af 3 dage, bør du kontakt læge eller eventuelt tandlæge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Du må ikke tage Zyx citron/Zyx mint, hvis du er gravid eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zyx citron/Zyx mint påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zyx citron/Zyx mint

Sugetabletterne indeholder isomalt. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder også aspartam (fenyalaninkilde). Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings syndrom).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ZYX CITRON/ZYX MINT

Hvis din læge har ordineret Zyx citron/Zyx mint til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 sugetablet 3 gange i døgnet. Behandlingen bør ikke vare mere end 7 dage. Du får mest muligt gavn af lægemidlet, hvis sugetabletterne opløses langsomt i munden. Du må ikke overskride de anførte doser uden lægens anvisning.

Børn på 6-11 år skal tage sugetabletterne under en voksens opsyn. På grund af lægemidlets form må sugetabletterne kun indtages af børn på over 6 år.

Hvis du har taget for mange Zyx citron/Zyx mint

I meget sjældne tilfælde og ved doser langt højere end normal anvendelse er der hos børn rapporteret om irritation, krampetrækninger, sveden, ataksi, rysten eller opkastning.

Kun ved akut overdosering er symptomatisk behandling mulig; maven bør tømmes ved att fremkalde opkastning eller ved maveskyning, og patienten skal holdes under nøje observation og gives understøttende behandling. Det skal opretholdes en tilstrækkelig væsketilførsel.

Kontakt lægen, apoteket eller skadestuen hvis du har taget flere sugtabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du har glemt at tage Zyx citron/Zyx mint

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte sugetablet.

4. BIVIRKNINGER

Zyx citron/Zyx mint kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du øjeblikkelig skal reagere på:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Angiødem.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Brændende fornemmelse i munden
- Tørhed i munden

Følgende ikke alvorlige bivirkninger kan i nogle tilfælde være alvorlige:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Lysfølsomhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Overfølsomhedsreaktioner

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Krampe i halsen

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.Lægemiddelstyrelsen.dk.

5. SÅDAN OPBEVARER DU ZYX CITRON/ZYX MINT

Må ikke opbevares over 25°. Opbevares i original emballage. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Zyx citron/Zyx mint efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zyx citron indeholder:

- Aktivt stof: Benzylaminhydrochlorid 3 mg (svarende til 2,68 mg benzydamin).
- Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyremonohydrat, citronaroma, pebermynte aroma, quinolingult (E 104), indigotin (E 132).

Zyx mint indeholder:

- Aktivt stof: Benzylaminhydrochlorid 3 mg (svarende til 2,68 mg benzydamin).
- Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E 953), aspartam (E 951), menthol, citronsyremonohydrat, citronaroma, pebermynte aroma, quinolingult (E 104), indigotin (E 132).

Udseende og pakningstørrelse

Zyx citron er firkantede, gulgrønne, halvgennemsigtige sugetabletter med fordybning i midten, med karakteristisk citronsmag.

Zyx mint er firkantede, grønne, halvgennemsigtige sugetabletter med fordybning i midten, med karakteristisk pebermyntesmag.

Hver æske med sugetabletter indeholder 20 eller 30 sugetabletter (2/3 pakninger med ti sugetabletter).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, SE-114 26 Stockholm, Sverige.

Tlf: +46 8 31 68 00

Fax: +46 8 31 68 10

Email: info@antula.se

Information fås hos Antula Healthcare, Postboks 898, 1532 København V.

Tlf: 70 20 03 62.

Fremstiller: ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.