A. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. Veterinærlægemidlets navn

Rabisin vet. injektionsvæske, suspension

2. Sammensætning

Hver dosis (1 ml) indeholder:

Aktivt stof:
Inaktiveret rabiesvirus, stamme G52 ≥ 2,09 $\log_{10}$ OD_{50}* og ≥ 1 IU**

Adjuvans:
Aluminiumhydroxid 1,7 mg

* når batchkontrol foretages med *in vitro* ELISA-test.
** når batchkontrol foretages ihht. Ph. Eur.-monografi 451.

3. Dyrearter

Hund, kat, hest, kvæg og får.

4. Indikation(er)

Vaccination mod rabies af hund, kat, hest, kvæg og får.

5. Kontraindikationer

Må ikke anvendes til subkutan injektion af hest.
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, adjuvans eller over for hjælpestoffet.

6. Særlige advarsler

Særlige advarsler:
Kun raske dyr må vaccineres.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet til dyr:
I tilfælde af utilsigtet selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed og laktation:
Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan administreres samme dag som, men ikke blandet med markedsføringstilladelsesindehaverens adjuvansfrie vacciner til kat

(Purevax FeLV, Purevax RC, Purevax RCP, Purevax RCP FeLV, Purevax RCPCh, Purevax RCPCh FeLV), vacciner til hund (Eurican DAP, Eurican DAPPi, Eurican L4) og rekombinante vacciner til hest (ProteqFlu og ProteqFlu-Te). Vaccinerne bør administreres på forskellige injektionssteder.
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af vaccinen ved samtidig brug med andre veterinærlægemidler end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis:
Ingen.

7. Bivirkninger

Hund, kat, hest, kvæg og får:

Sjælden (1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):
Overfølsomhedsreaktion[1]
Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
Forhøjet kropstemperatur[2], nedstemthed[2] Hævelse ved injektionsstedet

[1] Passende symptomatisk behandling bør iværksættes
[2] Forbigående

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem: Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Hund, kat: Intramuskulær eller subkutan injektion.
Hest: Intramuskulær injektion (må aldrig administreres subkutant til hest).
Kvæg og får: Intramuskulær eller subkutan injektion.

Dosis er 1 ml til alle dyr uanset dyreart, alder og størrelse.

Vaccinationsprogram:

Dyreart	**Basisvaccination**	**Revaccination**
Hund Kat	En injektion fra 12-ugersalderen*	1 år efter basisvaccination, derefter hvert 3. år**
Hest Kvæg Får	En injektion fra 4-månedersalderen***	Årligt

** Såfremt en hund eller kat er blevet vaccineret før 12-ugersalderen gives yderligere 1 injektion fra 12-ugersalderen.*
*** Revaccinations perioden skal være i overensstemmelse med national lovgivning.*

**** Såfremt hest, kvæg eller får vaccineres før 4-månedersalderen, skal yderligere en injektion gives, fra en alder af mindst 4 måneder.*

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. Oplysninger om korrekt administration

Omrystes før brug.
Anvend sædvanlige aseptiske procedurer.

10. Tilbageholdelsestid(er)

0 dage.

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).
Må ikke nedfryses.
Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Exp.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

13. Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

MTnr 9961

Hætteglas.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen

10/2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelse og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14,
2300 København S
Tlf: + 45 3915 8888

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint-Priest
Frankrig

17. Andre oplysninger

Immunologiske egenskaber:
Rabisin vet. er en inaktiveret vaccine baseret på rabiesvirus, stamme G52. Ved vaccination af drægtige dyr opnås passiv immunitet hos afkommet ved overførsel af antistoffer via råmælk.