

INDLÆGSSEDDEL

Rabisin vet. injektionsvæske, suspension

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
Frankrig

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Rabisin vet. injektionsvæske, suspension

3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

Inaktiveret rabiesvirus, G52 stamme $\geq 2,09 \log_{10} OD_{50}^*$ og $\geq 1 \text{ IU}^{**}$
Aluminiumhydroxid 1,7 mg.

* når batchkontrol foretages med *in vitro* ELISA-test

** når batchkontrol foretages ihht. Ph.Eur monografi 451

4. INDIKATIONER

Vaccination mod rabies af hund, kat, hest, kvæg og får.

5. KONTRAINDIKATIONER

Kun raske dyr bør vaccineres.

6. BIVIRKNINGER

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Som for alle vacciner kan en overfølsomhedsreaktion opstå efter vaccination. Disse er sjældne, og korrekt symptomatisk behandling bør iværksættes.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Hund, kat, hest, kvæg, får.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJE

Dosis er 1 ml til alle dyr uanset dyreart, alder og størrelse.

Vaccinen omrystes før brug.

Indgivelsesmåde:

Injicer vaccinen intramuskulært eller subkutant, **dog aldrig subkutant til heste.**

Vaccinationsprogram

Dyreart	Basisvaccination	Revaccination
Hund Kat	1 injektion fra 12-ugers alderen*	1 år efter basisvaccination, derefter hvert 3. år.**
Hest Kvæg Får	En injektion fra 4-måneders alderen ***	Årligt

* Såfremt en hund eller kat er blevet vaccineret før 12-ugers alderen gives yderligere 1 injektion fra 12-ugers alderen.

** Revaccinations perioden skal være i overensstemmelse med national lovgivning.

*** Såfremt hest, kvæg eller får vaccineres før 4-måneders alderen, skal yderligere en injektion gives, fra en alder af mindst 4 måneder.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have udskrevet lægemidlet til anden brug og/eller med en anden dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid den anvisning dyrlægen har skrevet på etiketten fra apoteket.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Anvend normale aseptiske procedurer ved vaccinationen.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Hest, kvæg og får: 0 dage.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)

Opbevares utilgængeligt for børn.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

05/2023

15. ANDRE OPLYSNINGER

Immunologiske egenskaber:

Rabisin vet. er en inaktiveret vaccine baseret på rabiesvirus, G52-stammen, til aktiv immunisering af hund, kat, hest, kvæg og får mod rabies. Ved vaccination af drægtige dyr opnås passiv immunitet hos afkommet ved overførsel af antistoffer via råmælk.