

Dihydrostreptomycin Agrovet vet.®



500 mg tabletter til kvæg, svin, hund og kat

Nyeste version af indlægssedlen er tilgængelig på www.indlaegsseddel.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø

Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer
1 tablet indeholder:

Aktivt stof: 500 mg dihydrostreptomycin (som dihydrostreptomycinsulfat).

Indikationer

Infektioner forårsaget af bakterier, der er følsomme over for streptomycin hos kvæg, svin, hund og kat.

Dihydrostreptomycin er et antibiotikum, der har bakteriedræbende virkning og er særdeles aktivt over for gramnegative bakterier. Dihydrostreptomycin op-tages kun i meget ringe grad fra mave-tarmkanalen, hvorfor præparatet er særdeles velegnet til behandling af infektion i tarmen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for streptomyciner.

Bivirkninger

Der kan i sjældne tilfælde ses forstyrrelser i mave-tarmkanalen. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner.

Hypigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Dyrearter

Kvæg, svin, hund og kat.

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

10-20 mg pr. kg kropsvægt 2-3 gange dagligt svarende til 1 tablet pr. 25-50 kg kropsvægt 2-3 gange dagligt eller efter dyrlægens anvisning.

Ved abnorm vomgæring er dosis 4-6 tabletter dagligt.

Dosering ved borbetændelse er 2-4 tabletter ind i børen.

Oplysninger om korrekt anvendelse

Tabletterne kan gives direkte i drikkevandet eller sammen med foderet. Dihydrostreptomycin Agrovet tabletter er letopløselige i vand. Efter en let omrøring vil der i løbet af 1-2 minutter dannes en klar opløsning med fuldstændigt henfald af tabletterne. Opløsningen kan eksempelvis ske i en spand vand, der hældes i fodertruget, eller direkte i mælken til kalve. Til mindre dyr opløses 1 tablet i 100 ml vand, og en teskefuld (5 ml) svarer til 25 mg dihydrostreptomycin.

Tilbageholdelsestider

Mælk: 2 døgn

Slagtning: 6 døgn

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.

Må ikke opbevares over 30°C.

Særlige advarsler

Drægtighed og diegivning

Dihydrostreptomycin Agrovet tabletter kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af selvgivning ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne, om nødvendigt

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Dato for seneste ændring af indlægssedlen
Marts 2018

001175110