

INDLÆGSSEDDEL

Frontline vet., 2,5 mg/ml, kutanspray, opløsning til hund og kat

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S
AH.nordics@boehringer-ingelheim.com

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4, Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Frankrig

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Frontline vet.

3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml indeholder: Fipronil 2,5 mg
Hjælpesoffer: Copovidon, isopropanol, rensset vand.

4. INDIKATIONER

Forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat samt flåtangreb hos hund.
Behandling af flåtangreb hos kat.
Produktet kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb.

5. KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke bruges til syge (systemiske lidelser, feber ...) eller afkræftede dyr.
Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme.
Må ikke anvendes sammen med andre loppemidler til udvortes brug eller til indgivelse gennem munden, idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at dette er uden risiko.

6. BIVIRKNINGER

Blandt de meget sjældne* bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner (hudmisfarvning, lokal hårtab, kløe, hudrødmen) samt generel kløe eller hårtab. Ligeledes er savlen, forbigående nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, nervøse symptomer) opkastning og symptomer fra luftvejene observeret i meget sjældne* tilfælde.
Undgå overdosering.

* færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Hund og kat.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej

Spray til udvortes brug.

Dosering: 3-6 ml (7,5-15 mg aktivt stof)/kg legemsvægt, afhængig af pelsens længde; jo længere hår, jo højere dosering. Dette sv.t. hhv. 6-12 pumpeslag for 100 ml flasken og 2-4 pumpeslag for 250 og 500 ml flaskerne pr. kg legemsvægt.

Brugsanvisning: Spray hele dyrets pels fra 10-20 cm afstand. Spray imod hårretningen og vær opmærksom på, at hele pelsen bliver fugtig. Gnid dyrets pels så det sikres, at Frontline Vet. kommer i kontakt med huden. Lad pelsen tørre naturligt, brug ikke håndklæde.

Frontline Vet. beskytter effektivt imod lopper i 1-2 måneder afhængig af parasitbelastningen i miljøet.

Frontline Vet. beskytter effektivt mod flåter hos hund i op til 4 uger.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

10. TILBAGEHOLDESESTID

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

12. SÆRLIG ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Undgå sprayning i øjnene. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser for gentagen behandling af katte, bør katten behandles højst hver 4. uge ved flåtangreb.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

- Det er vigtigt at sikre sig, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen.
- Det anbefales ikke at bade dyret 48 timer før og efter behandling med Frontline Vet. Shampooade nedsætter præparatets virkningsvarighed.
- Hunde bør ikke svømme i vandløb i 2 dage efter behandlingen.
- Fasthæftning af enkelte flåter kan ses. Derfor kan overførsel af infektiøse lidelser ikke helt udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Generelt ved brug af alle insekticider og acaricider anbefales det:

- Brug handsker, specielt ved behandling af et større antal dyr.
- Spray dyret i et velventileret rum.
- Produktet kan forårsage irritation af slimhinder og øjne. Derfor bør kontakt med mund og øjne undgås.
- Dyr eller mennesker med en kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet.
- Undgå at få flaskens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand.
- Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med rent vand.
- Vask hænderne efter brug.
- Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil pelsen er tør (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn.
- Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

Drægtighed og diegivning:

Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr.

Overdosering:

Efter overdosering er set nervøse symptomer, nedstemthed og savlen. Kraftig overdosering kan være fatal. Behandling: Dyret vaskes grundigt med shampoo straks efter behandling.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. Fipronil kan have negativ effekt på organismer i vandet. Foruren ikke søer, vandløb eller grøfter med præparatet eller tomme pakninger.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

05/2023