INDLÆGSSEDDEL

Cartrophen Vet. 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Veterinærlægemidlets navn
Cartrophen Vet.
Lægemiddelform: injektionsvæske, opløsning
Styrke: 100 mg/ml

Sammensætning
1 ml indeholder:

Aktivt stof:
Pentosan natriumpolysulfat..... 100 mg/ml

Hjælpestoffer:

Kvalitativ sammensætning af hjælpestoffer og andre bestanddele	Kvantitativ sammensætning, hvis oplysningen er vigtig for korrekt administration af veterinærlægemidlet
Benzylalkohol, Ph.Eur.	0,01 ml/ml
Natriumfosfat, Ph.Eur.	2,2 mg/ml
Natrium dihydrogenfosfat, Ph.Eur.	6,84 mg/ml
Natrium dihydrogenfosfat, Ph.Eur.	q.s.
Saltsyre, Ph.Eur.	q.s.
Vand til injektionsvæsker	Ad 1 ml

Dyrearter
Til hund.

Indikation(er)
Til behandling af halthed og smerter, der skyldes osteoarthritis (ikke-infektiøs artrose) hos hunde. Behandling af patologiske processer der påvirker initiering, progression og sværhedsgrad af osteoartritis defekter i leddene.

Cartrophen Vet. er et semisyntetisk polysulfatholdigt polysaccharid med antiinflammatoriske og antiartristiske kondroprotektive egenskaber, der kan klassificere Cartrophen Vet. som et DMOAD (disease modifying osteoarthritis drug).
Cartrophen Vet virker på følgende måde:

a. Stimulerer kondrocytterne til at syntetisere bruskmatrix.
b. Stimulerer den synoviocytale biosyntese af hyaluronsyren.
c. Hæmmer de enzymer der indgår i nedbrydningen af komponenterne i bruskmatrix og frigivelsen af inflammatoriske mediatorer.
d. Antiinflammatorisk aktivitet ved hæmning af arachidonsyremetabolismen.
e. Mobiliserer trombo- og fibrinaflejringer i synovialvæv og subkondrale blodkar hvorved ledperfusionen øges og dermed forbedrer ernæringen i brusken.
f. Mobiliserer lipider og kolesterol i synoviale og subkondrale blodkar.

Cartrophen Vet har i en klinisk undersøgelse givet omtrent samme forbedring af de kliniske symptomer for osteoartritis som ved behandling med NSAID produktet carprofen.
Hos hunde opnås maksimal plasmakoncentration 15 min. efter den subkutane administration. Halveringstiden i serum er ca. 3 timer.

Kaninstudier har vist at terapeutiske koncentrationer af det aktive indholdsstof forbliver i ledbrusken i 4-5 dage efter indgiften.
Mens koncentrationen i blodet er forhøjet, udskilles stoffet uomdannet via urinen. Efter at koncentrationen i blodet er faldet, udskilles stoffet i omdannet form via urinen.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes til hunde med koaguleringsproblemer, blodbilledeforandringer, blødninger efter skader, infektioner eller mavekræft.
Behandlingen bør afbrydes ved blødning hos hunden.

Særlige advarsler
Særlige advarsler:
Se punkt "Kontraindikationer"

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:
Øgning af dosis udover den anbefalede kan resultere i forværring af stivhed og ubehag.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:
I tilfælde af utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed og diegivning:
Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Der er uforligelighed mellem veterinærlægemidlet og heparinoider samt antikoagulantia. NSAIDs bør ikke bruges sammen med veterinærlægemidlet da disse kan påvirke trombocytadhæsionen (blodpladerne klæber sig fast til en beskadiget blodåre for at hjælpe med at stoppe blødning) og potentiere (forstærke) veterinærlægemidlets antikoagu-

lerende (blodets evne til at størkne) effekt. Kortikosteorider er vist at være antagonistiske over for en række af veterinærlægemidlets virkninger.

Væsentlige uforligeligheder:
Produktet skal ikke indgives sammen med andre substanser i samme sprøjte.

Bivirkninger
Hund:

Meget sjælden (< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):	Opkastning [1] Mild depression [1,2] , sløvhed [3]

[1] Umiddelbart efter indgift af veterinærlægemidlet. Hunde vil ofte reagere på samme måde ved efterfølgende behandlinger. Yderligere behandling af disse hunde anbefales derfor ikke.
[2] Mild.
[3] Varer i op til 24 timer efter indgift af veterinærlægemidlet.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse eller den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
www.meldenbivirkning.dk

Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde
Subkutan administration af 3 mg/kg kropsvægt (1 ml pr. 33 kg), som administreres 4 gange med 5-7 dages interval. Det anbefales at anvende en 1 ml sprøjte for at dosere så nøjagtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt administration
Se pkt. 'Væsentlige uforligeligheder'.

Tilbageholdelsestid(er)
Ikke relevant.

Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.
Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre æske for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter udløbsdatoen Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

Klassificering af veterinærlægemidler
Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser
MTnr. 19588

10 ml hætteglas

Dato for seneste ændring af indlægssedlen
24. april 2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Kontaktoplysninger
Indehaver af markedsføringstilladelse:
Maperath Herbal Ltd.
Barronstown, Rathkenny
Navan
Co. Meath, C15 T638
Irland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531AE Bladel
Holland

Lokal repræsentant og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg
Tlf: 48 48 43 17
Mail: qa@scanvet.dk

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.