

<i>Aesica</i> Queenborough Limited, North Road, Queenborough, Kent ME11 5EL, UK.			
Product:	Norvir 100mg Soft Capsules Danish/Norwegian/Icelandic	Commodity No.:	100-862-401
Page No.:	2 of 2	DCMF No.:	55580
Proof No.:	2nd Proof	Core Spec. Ref.:	657x405 Folded
Colour:	Black	Date of Proof:	04-09-08
		Pharma-Code No.:	1842

Anbefalte doser med Norvir:

- Hvis Norvir er brukt for á hjelpe effekten av visse andre midler mot HIV er den vanlige dosen for voksne 1 til 2 kapsler en eller to ganger daglig. For ytterligere informasjon om dosering se pakningsvedlegget for de midlene mot HIV som Norvir tas sammen med, dette gjelder også dosering for barn.

- Hvis legen din har foreskrevet maksimal dose kan startdøse for voksne være 3 kapsler om morgenen og 3 kapsler 12 timer senere. Dosen økes så gradvis i løpet av 14 dager, inntil du skal ta 6 kapsler 2 ganger daglig (maksimal dose). Barn (2-12 år) starter med lavere doser enn nevnt over, og dosen økes opp til maksimaldose i forhold til deres størrelse.

Legen din vil veilede deg om hvilken dosering som er den riktige for deg.

Som for alle legemidler mot HIV-infeksjon, skal Norvir tas hver dag for å holde din HIV-infeksjon under kontroll, selv om du skulle føle deg mye bedre. Hvis en bivirkning hindrer deg i å ta Norvir som anbefalt, så gi straks beskjed til legen. I perioder med diaré vil din lege avgjøre om ekstra kontroll er nødvendig.

Sorg alltid for å ha tilstrekkelig Norvir på lager, så du ikke risikerer å gå tom. Når du er på reise eller er innlagt på sykehus, må du sørge for å ha tilstrekkelig Norvir, inntil du kan få en ny forsyning. Selv om du føler deg bedre ikke slutt med Norvir uten å ha snakket med din lege. Å ta Norvir slik legen har foreskrevet det bør gi deg den beste sjansen for å utsette resistens mot legemidlene.

Dersom du tar for mye Norvir:

Nummenhet, prikking eller en følelse av "pricking og stikking" kan oppstå dersom du tar for mye Norvir. Hvis du oppdager at du har tatt mer Norvir enn du skulle, så kontakt straks din lege. Hvis du ikke kan komme i kontakt med legen, så kontakt legevakten.

Dersom du har glemt å ta Norvir:

Hvis du har glemt å ta en dose, så ta den så snart du oppdager det. Hvis det er nær til neste dose så ta den isteden. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Norvir ha bivirkninger, men ikke alle får det. Når Norvir brukes sammen med andre antiretrovirale midler, vil bivirkningene av Norvir også være avhengig av disse legemidlene. Derfor er det veldig viktig at du leser bivirkningsavsnittet i pakningsvedlegget til disse legemidlene derfor.

Svært vanlige bivirkninger (påvirker mer enn 1 brukere blant 10):

- magesmarter
- oppkast
- diaré
- uvell (kvalme)
- hodepine
- følelse av prikking eller nummenhet i hendene, føttene eller rundt leppene og munnen
- føle seg svak eller trott
- dårlig smak i munnen

Vanlige bivirkninger (påvirker 1 til 10 brukere blant 100):

- allergiske reaksjoner inkludert hudutslett (kanskje rød, oppsvulmet, kloende), alvorlig hevelse i huden eller andre vev
- pustebesvær
- rodme (vasodilatasjon)
- endringer i fettfordeling (se **Bivirkninger assosiert med kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler** under)

- Bivirkninger assosiert med kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler** under)
 - svimmelhet
 - innsøvningsvansker (insomnia)
 - uro
 - sovnløshet
 - nummenhet
 - uvanlig følelse hud
 - halsbrann
- dehydrering (tørste)
- diabetes
- gulsoott (gulfarging av hud og det hvite i øye)
- muskelsmerter, omhet eller svakhet

Sjeldne bivirkninger (påvirker 1 til 10 brukere blant 10.000):

- alvorlig og livstruende hudreaksjoner inklusive blømmes (Steven Johnsonsyndrom)
- alvorlig allergisk reaksjon (anafylakse) hye blodskudd/revder

Andre bivirkninger som har vært rapportert sammen med Norvir: lave nivåer av blodlegemer, nyresvikt, anfall, besvimelse og følelse av svimmelhet når man reiser seg, unormale tunge perioder. Det er ikke visst hvor typisk skjer disse bivirkningene.

Snakk med legen din hvis du føler deg syk (kvalm), eller kaster opp eller har magesmerter for disse kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen. Snakk også med legen din hvis du opplever ledstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skuldre) og vanskelighet med å gå. Disse kan være symptomer på osteonekrose. Se også avsnitt 2 Hva du må ta hensyn til for du bruker Norvir.

Bivirkninger assosiert med kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler kan forårsake endringer i kroppsfasongen på grunn av endringer i fettfordelingen. Dette kan innebære tap av fett fra bein, armer og ansikt, mer telt i mageregionen og andre indre organer, brystforstørrelse og fettlidelser i nakken (tyrenakke). Årsaken til og langtids effektene av disse tilstandene er foreløpig ikke klarlagt.

Kombinasjonsbehandling med flere antiretrovirale legemidler kan også forårsake økt melkesyre og sukker i blodet, økt fettinnhold i blodet og insulinresistens (insulin vil ikke virke effektivt).

Hos mennesker med hemofili A og B er det meldt tilfeller av økt blodtingstendens under behandling med proteasehemmere. Skulle dette skje for deg, må du øyeblikkelig kontakte din lege.

Tilfeller av sukkersyke eller økt blodsukker er sett hos pasienter som får Norvir eller andre proteasehemmere.

Unormale leverfunksjoner, hepatitt (betennelse i lever) og i sjeldne tilfeller gulsoott har blitt rapportert hos pasienter som tar Norvir. Noen personer hadde også sykdommer eller tok andre medisiner.

Personer som allerede har en leversykdom eller hepatitt kan oppleve en forverring av tilstanden. Et er rapportert smerter eller omkøst i musklene, samt muskelsvakelese, især ved samtidig bruk av kolesterolsenkende medikamenter og antiretroviral kombinasjonsbehandling med proteasehemmere og nukleosidanaloger. Muskelslidesene har i sjeldne tilfeller vært alvorlige (rhabdomyolyse). Ved tilfeller av utforlaring eller vedvarende smerter eller omkøst i musklene, muskelsvakelese eller krampesult med legemiddel og kontakt din lege så snart som mulig eller kontakt Legevakten.

Informen legen din så snart som mulig hvis du opplever symptomer på allergisk reaksjon slik som utslett, elveblest eller pusteproblemer etter å ha brukt Norvir.

Kontakt lege, apotek, Legevakten eller sykehus dersom noen av bivirkningene blir plag-somme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. HVORDAN DU OPBEVARER NORVIR

Oppbevarer utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Norvir kapsler etter utlopsdatoen på etiketten. Bruk ikke Norvir kapsler som har vært oppbevart mer enn 30 dager i romtemperatur. Utlopsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Norvir nye kapsler skal oppbevares i kjøleskap (2 - 8 °C) inntil utlevering til pasient. Det er ikke nødvendig å oppbevare kapslene i kjøleskap, dersom de anvendes innen 30 dager og oppbevares under 25 °C. Utenfor frost og sterk varme (unngå oppbevaring i fryser, bil i meget kaldt vær eller meget varmt vær og direkte solskinn).

Oppbevar Norvir nye kapsler i originalemballasjen. Tom ikke over i annen beholder.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Norvir

- Virkestoff er ritonavir. Hver kapsel inneholder 100 mg ritonavir.
- Hjelpestoffer er alkohol, oljesyre, butylhydrokstylofen (E321) og polyoksyyl-35-ricinusolje.

Kapselkallet består av gelatin, "spesialsorbitol" (sorbitol, anhydrið sorbitøls og mannitol), glyserol, titanoksid (hvitt farge), medium chain triglycerider, lecithin og svart farge bestående av propylenglykol, svart jernoksid, polyvinylacetattattlat, polyetylenglykol 400 og ammoniumhydroksid.

Hvordan Norvir ser ut og innholdet i pakningen

Norvir nye kapsler er hvite med "C" og koden "D5100" printet på skalett med svart skrift.

To pakningsstørrelser med Norvir nye kapsler er tilgjengelige:

- 1 flaske med 84 kapsler (84 kapsler)
- 4 flasker med 84 kapsler (336 kapsler).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Norvir leveres også som mikstur oppløsning, med 80 mg/ml ritonavir.

Innehaver av markedsforingstillatelsen

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Storbritannia
Tilvirker
Aesica Queenborough Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Storbritannia
Abbott Laboratories S.A.
Avenida de Burgos, 91
E-28050 Madrid
Spania

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsforingstillatelsen:

Belgia/Belgique/Belgien: Abbott SA Parc Scientifique Rue du Bosquet, 2 B-1348 Louvain-la-Neuve Tèl/Tel: + 32 10 475311
Bългария: TLI Aton Farmaceutic CA, Baneac Tîpa Codru, op. 8C et 7 Codru 1769 Ban. + 359 2 489 1950
Česká republika: Abbott Laboratories s. r. o. Hradcok Office Park Evropská 259/039 CZ-160 00 Praha 6 Tèl. + 420 267 282 111
Danmark: Abbott Laboratories AS Smakledalen 6 DK-2820 Gentofte Tèl. + 45 39 77-40-00
Deutschland: Abbott GmbH & Co. KG Max-Planck-Str. 2 D-6320 Wiesbaden Tèl. + 49 (0) 6122 58-20
Eesti: Abbott Laboratories Baltics Venlas 87h Riiga, LV-1004 Tèl. +371 67605580
Ελλάδα: Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. Ανατολικός Βουλγαρινός ΣΤΙ 6R 174 56 Αιγάιο Αθήνα Τηλ. + 30 210 9985-222
España: Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos, 91 E-28050 Madrid Tèl. + 34 91 337-3200
France: Abbott France 10, rue d'Arcueil BP 90233 F-94528 Rungis Cedex Tèl. + 33 (0) 1 45 60 25 00
Ireland: Abbott Laboratories, Ireland, Ltd 4051 Kingswood Drive Cylvest Business Campus RL – Dublin 24, Tèl. + 353 (0) 1 469-1500
Island: Vættur hf. Hrógváta 2 D-510 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia: Abbott S.r.l. I-40410 Campeggio di Apulia (Latina) Tèl. + 39 06 928921
Kimpec: Uglepharma (Z.A.M.) Ltd Ay. Neuchâto 8 1055, Ascuato Tèl. +357 22 347440
Latvija: Abbott Laboratories Baltics Venlas 87h Riiga, LV-1004 Tèl. + 371 67605580
Lietuva: Abbott Laboratories Baltics Venlas 87h Riiga, LV-1004 Latvija Tèl. + 371 67605580
Luxembourg/Luxemburg: Abbott SA Parc Scientifique Rue du Bosquet, 2 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgique/Belgien Tèl/Tel: +32 10 475311
Magyarország: Abbott Laboratories (Magyarország) Kft. Terve u. 1/a-c H-1139 Budapest Tèl. +36 1 465 2100
Malta: V.J. Salomone Pharma Limited 79, Simpson Street, Marsa MHR 14, Malta. Tèl. + 356 2298201
Nederland: Abbott B.V. Sinsdied 51 NL-2152 WT Hoofddorp Tèl. +31 (0) 186 8222 688
Norge: Abbott Norge AS PO Box 1, N-1330 Fornebu, Martin Linges vei 25, N-1367 Søranya Tèl. +47 81 55 99 20
Osterreich: Abbott GmbH & Co. KG Max-Planck-Str. 2 D-6320 Wiesbaden Tèl. + 49 (0) 6122 58-20
Poland: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Pólskiego 18A PL-02-676 Warszawa Tèl. + 48 22 806-10-50
Portugal: Abbott Laboratories, Lda. Estrada de Alfragide, n.º 67 Alfragide, Edifício D, 2610-008 Amadora Tèl. + 351 (0) 21 472 7100
România: Abbott Laboratories S.A. Bucharest Business Park Ssc. Bucuresti-Phoenix 14 Corp B, etaj 3, sector 1 011081 Bucuresti Tèl. +40 21 529 30 00
Slovenija: Abbott Laboratories d.o.o. Dolenska cesta 24/2c SI-1000 Ljubljana Tèl. + 386 (1) 23 61 60
Slovenská republika: Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Karadžičova 10 SK-821 08 Bratislava Tèl. + 421 (0) 2 4445 4176
Suomi/Finland: Abbott Oy Platinium 150Gårdsgränd 15 FIN-02240 Espoo/Esko Pori Tèl. + 358 (0) 9 7518 4100
Sverige: Abbott Scandinavia AB Box 500Gårdsgränd 8 S-169 29 SolnaS-169 70 Solna Tèl. + 46 (0) 8 5465 67 00
United Kingdom: Abbott Laboratories Ltd Abbott House Vernal Business Park Maidenhead Berkshire SL6 4XE-UK Tèl. + 44 (0) 1628 703735

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 06/2008

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Norvir 100 mg mjúk hylki rítónavir

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

- Geymið fylgiseðilinn. Náðusniðgið getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafraðings ef þú ert á frekari upplýsingum um lyfið.
- Pessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Latið lækninn eða lyfjafraðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Í fylgiseðlinum:

- Hvað Norvir er og við hverju það er notað
- Áður en byrjað er að nota Norvir
- Hvernig nota á Norvir
- Hugsanlegar aukaverkanir
- Hvernig á að geyma Norvir
- Áðrar upplýsingar

1. HVAD NORVIR ER OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

Norvir inniheldur rítónavir sem er hemilí próteasásensims og er notað til að hafa hemilí á HIV'sýkingu. Norvir er ætlað til samhliða notkunar með öðrum lyfjum við HIV sýkingu (andretóveirulyfi) til að hafa hemilí á HIV sýkingunni. Læknirinn mun ræða við þig um hvaða samsetning þessara lyfja hentar þér best.

Nota má Norvir í fullum skómmttum eitt og sér eða í lægri skómmttum með öðrum lyfjum til að auka áhrifin.

2. ÁÐUR EN BYRJAD ER AÐ NOTA NORVIR

Ef Norvir er notað samhliða öðrum andretóveirulyfjum er mikilvægt að lesa einnig vel fylgiseðilinn sem fylgir þeim lyfjum. Viðbótarupplýsingar geta verið í þeim fylgiseðlum um tilvik þar sem forðast á notkun Norvir.Lætið til læknisins eða lyfjafraðings ef þú ert á frekan upplýsingum um Norvir (rítónavir) eða önnur lyf sem notuð eru.

Ekki má nota Norvir

- ef þú ert með ónæmi fyrir rítónaviri (notað þegar saman fara HIV- og berklásýking).
- ef þú ert með alvarlegan lífrásjúkdóm.
- ef þú notar einnig eitthvert eitritilinna lyfja:
 - Astemizol eða terfenadin (algeng ónæmislyf - vera má að þessi lyf séu fíánleg án lyfseðils).
 - Amiodaron, bepridil, encainid, flecaínid, propafenon eða kinidin (notuð við óreglulegum hjartslátt).
 - Dihydroergotamín eða ergotamín (notuð við migrenihúfuðverk).
 - Ergonovin, metylergonovin (notuð til að stöðva miklar blæðingar sem geta fylgt fæðingu eða föstrúti/föstræðingu).
 - Clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam og midazolam sem gefið er með inntöku (notuð við svefnleysi og/eða kvíða).
 - Clozapín eða pimozid (notuð við óeðlilegum hugsunum eða tilfímmingum).
 - Meperidin, piroxicam eða propoxyphen (notuð við verkjum).
 - Cisaprid (notuð til að síða á ákveðin magavandamál).
 - Fibefutín (notað lyfjagjagnid eða til meðferðar við ákveðnum sýkingum)*.
 - Voriconazol (lyf til svefnþýkingum)*.
 - Simvastatín, lovastatín (notuð til að draga úr kolestórliti í blóði).
 - Alfuzosín (notað til meðhöndlunar á göðkynja stækkingu á blóðruhátskirtli).
 - Fusidinsýra (notuð við bakteríusýkingum).
 - Rufinacín samhliða saquinaviri (notað þegar saman fara HIV- og berklásýking).
- Sídenafil, tadalafil, vardenafil er lyf sem notuð eru við ristruflunum. Minnka á skammta þessara lyfja til að skaða ekki getnaðarim. Ekki má taka norvir með sídenafil ef þú hefur lungnaháþrýsting sem veldur erfiðleikum við öndun. Sjúklingar sem ekki hafa þennan sjúkdóm mega nota sídenafil undir eftirliti læknis (sjá kaflann **Notkun annarra lyfja**).
- Lyf sem innihalda jónsænjarar (jónsænsurinna, St. John's wort, *Hypericum perforatum*) vegna þess að það getur valdið því að Norvir verki ekki skjóli. Jónsæmsurinn er oft notaður í náttúrulegum sm þú getur keypt.

* Læknirinn getur ákveðið að þú takir rifabutin og/eða voriconazol með öðrunarskammti (lágum skammti) af Norvir en ekki má taka fullan skammt af Norvir samhliða þessum tveimur lyfjum. Ef eitthvert þessara lyfja er notað skal leita ráða hjá lækninum um möguleika á að skipta yfir í annað lyf á meðan þú ert á Norvir. Öft eru til önnur lyf sem eru að nota í staðinn.

Lestu einnig lyfjalístaninn í „Notkun annarra lyfja“ ef nota á ákveðin önnur lyf sem þarf sér-starkar varðar við.

Gæta skal sérstarkar varðara við notkun Norvir

Mikilvægar upplýsingar

- Norvir læknar ekki HIV sýkingu eða náðmi
- Sjúklingar sem taka Norvir geta eftir sem áður fengið sýkingar eða aðra kvilla tengda HIV-sýkingu. Því er mikilvægt að þú sért undir eftirliti læknis með á löku Norvir stendur.
- Nýrkinir komið ekki heiltu á HIV smiti til annarra. Víðhafa skal víðeigandi varúðaraðstafanir til að koma í veg fyrir smit við kynmök (t.d. notkun verja) eða blóðblöndun (þú mætt ekki gefa blóð eða bláa nála nálm).

Latið lækninn vita ef eitthvert meðangreindra atíraða á við um þig eða hefur áður átt við um þig.

- Ef þú ert með sögu um lífrásjúkdóm.
- Sjúklingar sem eru með lífrabólgu **B eða C** og eru í samsettlí meðferð með andretóveirulyfjum eru í aukinni hættu hvað varðar alvarlegar og hugsanlega lífshættulegar aukaverkanir á líflur. Þórf getur verið á reglulegum blóðnáðnskóm til að fylgjast með lífrastærferminum.
- Ef þú ert með **dreyrasyki**. Greint hefur verið frá auknum blæðingum hjá sjúklingum með dreyrasyki sem nota proteasaheimil. Ástæða þessa er ekki þekkt. Náðusniðgið getur verið að geta útskiðanlegt á stöðugtíðni Vili til að hafa hemilí á blæðingunum.
- Ef þú ert með **sykursyki**. Greint hefur verið frá versnun eða myndun sykursyki hjá nokkrum sjúklingum sem nota proteasaemia.

Latið lækninn vita ef þú finnur fyrir einhverjum eitritílalína einkenna:

- Endurdreifing, uppöfðun eða rýmn líkamstífti** (sjá 4. Hugsanlegar aukaverkanir).
- Viðvarandi **niðurgangur** eða viðvarandi **uppköst** vegna þess að slíkt getur dregið úr verkun lyfjanna sem þú ert að nota.
- Ógleði, úppköst eða kvíðaverkir** því þetta geta verið einkenni brisbólgu. Hjá sumum sjúklingum geta einnig átt við í þessum fylgiseðli, hafið þá samband við lækninn eða lyfjafraðing vita eins fljótt og hægt er elgi þetta við um þig.
- Einkenni um sýkingu** - látið læknin vita strax. Hjá sumum sjúklingum með langt gengna HIV-sýkingu (ánæmi) geta einkenni vegna fyrir sýkinga jafnvel þó þeir viti ekki að þeir hafi haft sýkingu komið fram stutt eftir að HIV meðferðin hefur verið byrjað. Ekki má þessir sýkingum vegna þessrar ónæmisvörnir líkamans sem gerir honum kleift að vinna á þessum sýkingum.
- Stífleiki, verkir eða sársauki í lóðum** (einkni í möðum, hné og öxl) og erfiðleikar með hreyfingur. Ef þú færð eitthvað af þessum einkennum átt að segja lækninum frá því vegna þess að þetta getur verið einkenni um beindriss. Smurr sjúklingar sem taka mörg andretóveirulyf geta fengið þennan sjúkdóm.
- Vöðvaverkir, eymsli í vöðvum eða vöðvamtáleysi** sérstaklega þegar andretóveirumeðferð með proteasaheimil og nukleosíðhlöðseu er notuð. Í örfáum tilvikum eru vöðvaverkir þessir alvarlegir (sjá 4. **Hugsanlegar aukaverkanir**)
- Ef um önnur heilsufatir vandamál er að ræða skaltu ræða það við lækn.
- Ekki á að gefa börnum yngri en 2 ára Norvir.

Notkun annarra lyfja

Sum lyf má alls ekki nota samhliða Norvir. Þau eru talin upp hér framar í kafla 2, undir liðnum „Ekki má nota Norvir“. Nokkur lyf má aðens nota við sérstakrar áðstæður eins og lýst er hér að neðan. Latið lækninn vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Eftirlitarráð varnaðoró eiga við þegar notaður er fullur skammtur af Norvir. Þessi varnaðoró geta einnig átt við í þessum fylgiseðli.

Latið lækninn vita notir þú eitthvert lyfjanna í listanum hér fyrir neðan því gæta þarf sér-starkar varðara.

- Sídenafil, tadalafil, vardenafil** eru lyf sem notuð eru við ristruflunum. Minnka á skammta þessara lyfja til að skaða ekki getnaðarim. Ekki má taka norvir með sídenafil ef þú hefur lungnaháþrýsting (sjá 2. **Áður en byrjað er að nota Norvir**).
- Digoxín** (hjartalyfi). Læknirinn getur þurft að eiga skammta digoxíns og á að hafa eftirlit með þeim þessu digoxín og Norvir til að koma í veg fyrir vandamál frá hjarta.
- Getnaðarvarnarlyfi** sem innihalda etýníní estradoll þar sem Norvir getur dregið úr verkun þessara lyfja. Mælt er með notkun verju eða annara getnaðarvarna á hornöna í staðinn. Við notkun getnaðarvarnarlyfa af þessu tagi ásamt Norvir geta komið óreglulegar blæðingar.
- Atovastatín eða rosuvastatín** (kolestórolækkandi lyf) því Norvir getur hækkað styrk þessara lyfja í blóði. Ræða skal við lækn áður en byrjað er að nota eitthvert kolestórolækkandi lyf með Norvir (sjá einnig **Ekki má nota Norvir**).
- Sterar** (t.d. dexametason, fluticason propíonat, prednisolon) því Norvir getur hækkað styrk þessara lyfja í blóði sem getur valdið Cushing heitðinni (andlit verður krínguleitt) og minnkað framiðleiki hormónsins kortísól. Lækninn geti viljað minnka skammta eða fylgjast nánar með aukaverkunum hjá þér.
- Trazodon** (lyf gegn þunglyndi) getur valdið aukaverkunum eins og ógleði, sundli, lágrýstingi og yfirlið sé það notað samhliða Norvir.
- Rífampicín og saquinavir (lyf gegn berklum og HIV, talið í sömu röð) því alvarlegar lífrastærmdir geta oróð við samhliða notkun Norvir.

Nokkur lyf má ekki nota samhliða Norvir því áhrif þeirra geta þá aukist eða minnkad. Í einhverjum tilvikum getur verið að læknirinn þurfi að framkvæma ákveðnar prófanir, brýta skammta eða fylgjast reglulega með þér. Latið því lækninn vita ef önnur lyf eru notuð einnig þau sem fengin eru án lyfseðils, þó þú þalt náttúrlíftu í sérstaklega mikilvægt er að láta vita ef þú notar eftirlitn lyf.

- Amfetamín og aðeifar amfetamins.
- Skýklyf (t.d. erytromycin og claritromycin).
- Krabbanesilyf (t.d. vincistín, vinblastín).
- Þunglyndislyf (t.d. amitriptylín, desipramín, fluoxetín, imipramín, nortriptylín, paroxetín, sertralín, trazodon).
- Sveppalyf (t.d. ketoconazol og itraconazol).
- Andastíamínlýf (t.d. loratadin, fexofenadin).
- Önnur andretóveirulyf, þar með talið aðrir HIV próteasaheimlar og bakritahemlar sem ekki eru núklósíð.
- Kvíðastíðandi lyf, buspíron.
- Astmalyf, teofylín.
- Atovaqueon, lyf til meðhöndlunar á ákveðnum tegundum lungnabólgu og malaríu.
- Buprenorfin, verkjalyf við langvarandi verkjum.
- Bupropíon, lyf til að hætta reykningum.
- Lyf við fogaveiki (t.d. carbamazepín, divalproex, lamotrigín, fenýtoín).
- Hjartalyf (t.d. digoxín, disipramín, mexiletín og kalsíumgangelakor eins og amlodipín, diltiazem og nifedipín).
- Lyf sem hafa áhrif á ónæmskerfið (t.d. ciclosporín, tacrolímús, everolímús).
- Morfín og morfínílyf (lyf t.d. metadón og fentanyl).
- Svefnlyf (t.d. alprazolam, zolpidem) og einnig midazolam sem gefið er með inndægingu.
- Stærk göblýngi (sefandi lyf) (t.d. haloperídol,