

INDLÆGSSEDDEL
Tylan Vet. pulver til opløsning i drikkevand, til svin og
fjerkræ

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

**1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF
VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR
BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Tyskland

Lokal repræsentant:

Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1. th
2750 Ballerup

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Frankrig

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tylan Vet.

3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 g indeholder 1 g tylosintartrat.

4. INDIKATIONER

Infektioner forårsaget af tylosinfølsomme bakterier.

Se afsnit 12 vedrørende svinedysenteri.

5. KONTRAINDIKATIONER

Tylan Vet. pulver til opløsning i drikkevand bør ikke anvendes i besætninger, der leverer æg til konsum.

6. BIVIRKNINGER

Hos svin er observeret diarré, kløe, rødmen af huden, hævelse i endetarmen og prolaps.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Til svin og fjerkræ.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ

Til opløsning i drikkevand.

Kyllinger og kalkuner: Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5 g/l.

Grise: 5-10 mg/kg legemsvægt. Gives i drikkevandet i en koncentration på 0,5-1 g/8l.

Anvend ikke den færdigblandede opløsning i mere end 3 dage.

Behandlingsvarigheden må ikke være over 3 uger.

Vand, der indeholder tylosintartrat, må ikke efterlades eller bortskaffes, således at dyr, som ikke er i behandling eller vilde dyr har adgang hertil. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Pulver til opløsning i drikkevand.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: Svin: 1 døgn.

Fjerkræ: 2 døgn.

Æg: 30 dage.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Anv. før.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug: Skal omgås med forsigtighed pga. risiko for allergi.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Der er påvist høj andel af *in vitro*-resistens i europæiske stammer af *Brachyspira hyodysenteriae*, hvilket er tegn på, at produktet ikke vil være tilstrækkelig effektivt mod svinedysenteri.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af kontakt med huden, vask grundigt med sæbe og vand. Hovedpine, astma, hoste, kløe i/omkring øjne, mavepine og irriterede luftveje kan ses efter kontakt med produktet.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OMNØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

September 2020