

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, tabletter 20 mg/12,5 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver værre, bliver ved og er generende.

1. Virkning og anvendelse

Virkning:

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma er sammensat af to forskellige lægemiddelstoffer. Enalapril er en såkaldt ACE-hæmmer. Hydrochlortiazid er vanddrivende medicin.

Anvendelse:

Du kan tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma mod for højt blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma

Tag ikke Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma hvis du:

- Er overfølsom over for enalapril, hydrochlortiazid, eller nogen af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma.
- Er overfølsom over for anden medicin, der tilhører gruppen af ACE-hæmmere.
- Er overfølsom over for medicin mod betændelse (sulfamethizol, sulfamethoxazol).
- Tidligere har fået hævet tunge, mund, hals, læber eller hiven efter vejret efter indtagelse af Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma eller andre ACE-hæmmere.
- Har haft arveligt betingede eller uforklarlige hævelser på grund af allergi.
- Har alvorligt nedsat nyrefunktion.
- Har alvorligt nedsat leverfunktion.
- Er gravid.

Særlige forholdsregler

Tal med din læge hvis du:

- Tager vanddrivende medicin (diuretika).
- Er på saltfattig diæt.
- Har lever- og/eller nyreproblemer, er i dialyse eller er nyretransplanteret.
- Har diaré eller opkastninger.
- Har hjerteproblemer.
- Lider af en bindevævssygdom (kollagen vaskulær sygdom).
- Får medicin, der hæmmer immunforsvaret.
- Tager medicin mod gigt (allopurinol).
- Har for højt blodtryk på grund af en sygdom i binyrerne (primær hyperaldosteronisme, Conns sygdom).

- Er i behandling for overfølsomhed over for insektstik.
- Får rensed blodet for kolesterol.
- Tager medicin mod diabetes. Du skal følge din blodglukose nøje, især i starten af behandlingen.
- Får en vedvarende hoste.
- Skal bedøves (også hos tandlægen).
- Lider af astma og/eller allergi.
- Hvis du har urinsur gigt (arthritis urica, podagra).

Du bør ikke tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, hvis du får medicin mod depression og mani (lithium).

Hvis du har hjertesvigt, kan dit blodtryk falde voldsomt (du føler dig træt og svimmel, evt. besvimer du). Læg dig ned og kontakt lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma. Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma kan påvirke dine prøveresultater.

Lægen vil muligvis tage blodprøver, mens du er i behandling for at sikre, at dine nyrer fungerer normalt og for at kontrollere indholdet af salte i dit blod.

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma virker mindre godt hos sorte.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Vanddrivende medicin (thiazid- eller loop-diuretika samt kaliumbesparende diuretika).
- Blodtryksnedsættende medicin (f.eks. betablokkere, methyldopa, calciumantagonister).
- Medicin mod smerter i hjertet, angina pectoris (nitroglycerin, glycerylnitrat).
- Medicin mod mani og depression (lithium).
- Medicin mod depression (tricycliske antidepressiva).
- Medicin mod sindssygdhed (psykoser).
- Medicin mod voldsomme allergiske reaktioner (Epi-pen med adrenalin).
- Insulin eller tabletter mod diabetes.
- Medicin til efterbehandling ved transplantation (ciclosporin).
- Medicin der hæmmer immunforsvaret.
- Medicin mod svamp (amphotericin B).
- Binyrebarkhormoner (kortikosteroider).
- Kalktilskud og vitamin D.
- Hjertemedicin (digoxin).
- Medicin som hæmmer optagelse af fedt og/eller kolesterol (cholestyramin og colestipolresiner). Du bør ikke indtage denne medicin samtidig med

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma. Din læge vil oplyse dig om, hvornår på dagen du skal tage de to slags medicin.

- Kræftmedicin.
- Medicin mod urinsur gigt (allopurinol).
- Medicin der kan give forstyrrelser i hjerterytmen.
- Afføringsmidler.
- Medicin mod muskel- og gigtsmerter (NSAID, f.eks. ibuprofen).
- Morfin og morfinlignende medicin mod stærke smerter.
- Medicin mod epilepsi (fenemal, primidon).

Fortæl lægen, at du tager Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, hvis du skal have lavet en røntgenundersøgelse med kontrast.

Brug af Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma sammen med mad og drikkevarer

Alkohol kan forstærke virkningen af Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma og give for lavt blodtryk.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, hvis du er gravid.

Ved graviditet eller ønske herom bør du have behandlingen ændret eller afbrudt efter aftale med din læge.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, da Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma kan måske give svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af øvrige indholdsstoffer i Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma

Drik et glas vand sammen med medicinen med eller uden føde.

Dosering

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet 1 gang daglig.

Hvis du får vanddrivende medicin, skal du holde op med at tage den to dage, før du begynder at tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma. Tal med lægen.

Børn:

Du må kun bruge Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma til børn under 18 år efter lægens anvisning.

Ældre:

Samme dosis som for voksne.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Din læge vil holde øje med din nyrefunktion, når du tager Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering: Træthed og svimmelhed (tegn på for lavt blodtryk), hurtig overfladisk vejrtrækning, hurtig eller langsom puls, hjertebanken, angst og hoste. Tørst på grund af store vandladninger og væsketab.

Har du glemt at tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma?

Hvis du har glemt at tage Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma, skal du tage den næste tablet som planlagt. Du skal ikke tage ekstra som erstatning for den manglende tablet.

4. Mulige bivirkninger

Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet eller er alvorlig hjertesyg, kan du risikere at få en blodprop i hjertet (stærke brystmerter). Ring 112.
- Hvis du tidligere har haft blodprop eller hjerneblødning, kan du risikere at få en ny blodprop i hjernen eller hjerneblødning med halvsidig lammelse, tale- og føleforstyrrelser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertekramper, brystmerter (angina pectoris). Kontakt lægen.
- Overfølsomhedsreaktion med hævelser i ansigt, læber, tunge, stemmebånd og/eller svælg, som giver synke- og vejrtrækningsbesvær og kan føre til kvælning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Depression. Kontakt lægen.

- Forhøjet salt (kalium) i blodet: Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær, lammelser. Forstyrrelser i hjertets rytme og funktion. Hjertestop. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Tarmslyng med voldsomme, turevise mavesmerter. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter og feber). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Nedsat nyrefunktion med nedsat eller ophørt urinproduktion, skummende urin, nyresvigt. Kontakt lægen.
- Alvorlig blodmangel. Søg straks læge.
- Astmaanfald. Kontakt lægen.
- Mavesår med smerter, evt. blodig opkastning eller afføring. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner, feber, blødning fra hud og slimhinder samt blå mærker. Søg straks læge.
- Alvorlig nedsat leverfunktion, leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)
- Alvorlig betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Alvorligt udslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Kraftig afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Bindevævssygdomme med feber, ledsmerter, udslæt. Kontakt lægen.
- Allergisk lungesygdom. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Mavesmerter, evt. kvalme og opkastning på grund af allergiske hævelser i og omkring tarmene. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke kendt:

- Lungebetændelse, vand i lungerne. Kontakt lægen.
- Betændelse i blodkar. Feber, træthed, sløjhed. Kontakt lægen.
- Udslæt med feber og sløjhed (Lupus erythematosus). Kontakt lægen.
- Overfølsomhedsreaktioner f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Sløret syn. Svimmelhed.
- Hoste. Kvalme.
- Kraftesløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Depression.
- Hovedpine, træthed.
- Lavt blodtryk (svimmelhed ved ændring fra liggende til stående stilling), besvimelse.
- Diaré, mavesmerter, smagsændringer.

- Udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- For lavt blodglukose (hos diabetespatienter).
- Forvirring, voldsom træthed evt. bevidstheds-svækkelse, nervøsitet, søvnløshed.
- Muskelkramper.
- Tinnitus.
- Løbende næse, øm hals, hæshed.
- Opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, appetitløshed, gener i mellemgulvet, mundtørhed.
- Øget sved, kløe, nældefeber, hårtab.
- Impotens.
- Nedsat smagssans, kvalme, utilpashed, ubehag i mave og tarm på grund af for lavt indhold af natrium i blodet.
- Mundtørhed.
- Føleforstyrrelser (snurren og prikken i huden).
- Rødmen, ubehag, feber.

Hyppigheden ikke kendt:

- Betændelse i spytkirtel.
- For højt blodglukose.
- Gullig synsopfattelse alting er omgivet af et gulligt skær.
- Lavt blodtryk, svimmelhed og evt. besvimelse, når du rejser dig op.
- Øget følsomhed af huden for lys.
- Almen svækkelse.
- Rastløshed.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkninger kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Enalapril/Hydrochlortiazid 1A Farma ved over 30° C.
- Tag ikke Enalapril/hydrochlortiazid 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

1 tablet indeholder

Virksomme indholdsstoffer:

Enalaprilmaleat 20,00 mg og hydrochlorthiazid 12,50 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumhydrogencarbonat, lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphat dihydrat, majsstivelse, talkum, magnesiumstearat.

Udseende:

Enalapril/hydrochlorthiazid 1A Farma 20 mg/12,5 mg er en hvid, oval tablet med delekærv på den ene side og mærket "EH" på den anden side.

Pakningsstørrelser:

30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføres i Danmark af:

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

e-mail: 1a.info@1apharma.com

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret 08/2007